



Govern de les Illes Balears
 Conselleria de Salut
 Direcció General de Salut Pública i Participació

CALENDARI DE VACUNACIONS INFANTILS DE LES ILLES BALEARS (setembre 2016)							
Edat	Vacunes						
2 mesos	DTPa	HB	Hib	IPV I,II,III	PnC13		
4 mesos	DTPa	HB	Hib	IPV I,II,III	MC	PnC13	
6 mesos	DTPa	HB	Hib	IPV I,II,III			
11 mesos	PnC13						
12 mesos					MC	XRP	
15 mesos	V I						
18 mesos	DTPa		Hib	IPV I,II,III			
3 anys	V II					XRP	
6 anys	DTPa						
12 anys	VPH(nines)				MC		Var (susceptibles)
14 anys	Td (adults)						

DTPa: diftèria, tètan, tos ferina acel·lular; HB: hepatitis B; Hib: Haemophilus influenzae tipus b; IPV I,II,III: poliomièlitis inactivada tipus 1, 2 i 3; MC: meningococ C, conjugada; XRP: xarampió, rubèola, parotiditis; V: varicel·la; VPH: papil·lomavirus humà PnC13: pneumocòccica conjugada

Notes sobre l'administració de les vacunes amb esquema modificat

Nota general referida a cursos escolars i edats dels infants

Per a una operativitat més bona, s'organitzen les vacunacions per cursos escolars, tant si es fa la vacunació en els centres com si únicament col·laboren a distribuir els recordatoris a les famílies, encara que els cursos no es corresponguin exactament amb les edats, de la manera següent:

- **3 anys:** nins que comencen **4t d'educació infantil** al setembre de l'any en qüestió.
- **6 anys:** nins que comencen **1r de primària** al setembre de l'any en qüestió.
- **12 anys:** nins que comencen **6è de primària** al setembre de l'any en qüestió.
- **14 anys:** nins que comencen **2n d'ESO** al setembre de l'any en qüestió.



1. Vacuna contra el xarampió, la rubèola i la parotiditis

OBJECTIUS:

- Augmentar la protecció individual a partir de l'edat de 3 anys.
- Augmentar la protecció col·lectiva en tenir un nombre d'infants petits immunitzats amb 2 dosis molt més elevat.

PAUTA:

- Primovacunació:
 - 1 dosi als 12 mesos.
- Reforç:
 - 1 dosi a tots els nins que compleixin 3 anys dins l'any en curs.

CONSIDERACIONS ESPECIALS:

- Durant tres anys, per no deixar cap cohort sense vacunar, s'ha d'administrar també la segona dosi als infants que compleixen 6 anys, segons l'esquema següent:
 - **vacunació 2014:** nascuts el 2011 i el 2008
 - **vacunació 2015:** nascuts el 2012 i el 2009
 - **vacunació 2016:** nascuts el 2013 i el 2010

2. Vacuna contra el virus de la varicel·la

OBJECTIUS:

- Assolir la protecció individual a partir dels 15 mesos d'edat.
- Augmentar la protecció col·lectiva amb la vacunació de cohorts completes.

PAUTA:

- Vacunació infantil universal: 2 dosis, la primera als 15 mesos i la segona a l'edat de 3 anys.
- Vacunació de susceptibles en l'adolescència:
 - Vacunació a 12 anys: 2 dosis amb interval d'1 mes.
 - Vacunació de reescat en la darrera revisió pediàtrica (14 anys): 2 dosis amb interval d'1 mes.



3. Vacuna contra el meningococ C

OBJECTIU: assegurar la protecció fins a la joventut vacunant en tres moments clau en què s'ha demostrat que disminueix la immunitat dels nins vacunats amb les pautes recomanades fins ara.

PAUTA:

- Primovacunació (dosis abans dels 12 mesos): 1 dosi als 4 mesos amb NeisVac-C®
 - Infants que en el moment de la implantació de la nova pauta ja hagin iniciat la pauta anterior amb una dosi als 2 mesos: completar-la amb una als 4 (es considera que fins abans dels 4 mesos una sola dosi no és suficient per adquirir protecció).
- Vacunació als 12 mesos: 1 única dosi, independentment de les dosis rebudes anteriorment.
 - Majors de 12 mesos que encara no han rebut la dosi dels 18 mesos: vacunar-los en la primera visita.
- Vacunació a l'edat de 12 anys: 1 dosi independentment de les dosis rebudes abans de l'edat de 10 anys. Si ha rebut alguna dosi a partir d'aquesta edat no és necessària la revacunació.
- Nins no vacunats correctament:
 - Menors d'1 any: 1a dosi ara i continuar normalment amb una dosi als 12 mesos (sempre que hagi passat un mes des de la primera) i la següent a l'edat de 12 anys.
 - 1-9 anys: una dosi ara i administrar la de 12 anys normalment.
 - Nins de 10 i 11 anys que no duen cap dosi anterior: una sola dosi ara. Ja no farà falta administrar la dosi de reforç de 12 anys perquè a partir de l'edat de 10 la immunitat ja és de llarga durada.
 - Revisió de 14 anys dels nascuts abans de 2002: una sola dosi als nins que no hagin rebut cap dosi partir de l'edat de 10 anys.

CONSIDERACIONS ESPECIALS:

- No es tracta de dur un total de tres dosis al llarg de la vida, sinó d'una **pauta que asseguri protecció en cada època de la vida**. Per adaptar pautes distintes de la recomanada, s'ha de tenir en compte el següent:
 - Vacunació abans de l'any: protegeix durant el període de lactància. Sia la que sia la vacuna utilitzada, s'ha d'administrar una dosi a partir dels 4 mesos, ja que abans no s'assegura la resposta immune.
 - Vacunació a partir de 12 mesos: protegeix durant la infància. És necessària una dosi independentment de les dosis administrades abans dels 12 mesos.
 - Vacunació a partir de 10 anys: protecció durant l'adolescència i la joventut. Si un nin de 10-11 anys no du cap dosi a partir dels 12 mesos, la que se li administri ara ja li dona protecció de llarga durada i es considera acabada la vacunació contra el meningococ C.
- NeisVac-C® té una pauta autoritzada amb una sola dosi als 4 mesos de vida, mentre que la pauta autoritzada de Menjugate® és de 2 dosis als 2 i 4 mesos. Per això:
 - No s'ha d'utilitzar Menjugate® a la primovacunació dels menors d'un any.



- S'ha d'utilitzar Menjugate® per a la vacunació de rescat de l'edat de 14 anys o, en tot cas, per als nins més grans.

4. Vacuna contra el virus del papil·loma humà (VPH)

OBJECTIU: assegurar la protecció de totes les adolescents enfront del VPH.

PAUTA:

La pauta és diferent segons la vacuna que s'utilitzi. A les Illes Balears, la Conselleria de Salut utilitza Cervarix® per a la vacunació sistemàtica. Les pautes són diferents segons l'edat d'inici:

- Inici de la vacunació a l'edat de 14 anys o abans: dues dosis amb un interval de 6 mesos (flexibilitat entre 5 i 7 mesos).
- Inici de la vacunació a partir de 15 anys: tres dosis als 0, 1 i 6 mesos (flexibilitat: entre la primera i la segona, 1-2,5 mesos; entre la 1a i la 3a, 5-12 mesos).

CONSIDERACIONS ESPECIALS:

El factor determinant de l'eficàcia de la vacuna amb dues dosis és l'interval d'administració que hi ha entre si; per això, en relació amb les nines que han iniciat la vacunació en la campanya 2013-2014 (amb administració de la primera dosi dins el darrer trimestre de 2013):

- Si només s'han posat una dosi, se'ls ha d'administrar únicament una dosi als 5-7 mesos de la primera i s'han de considerar correctament vacunades.
- Si han rebut dues dosis de vacuna amb un interval menor a 5 mesos (situació de la majoria de les vacunades en aquesta campanya), necessiten completar la pauta amb la tercera dosi.