CUIDADOS PALIATIVOS EN NEUMOLOGIA

Ana Rodrigo Troyano, MD, PhD.
Máster en atención paliativa integral
a personas con enfermedades avanzadas (UAB)
FEA Neumología HUSE

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

- PATOLOGÍA RESPIRATORIA CRÓNICA AVANZADA.
- CUIDADOS PALIATIVOS EN LA ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL DIFUSA (EPID).

ESTUDIO: Impacto de la derivación precoz a cuidados paliativos en pacientes con EPID.

- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS
- MÉTODOS
- RESULTADOS

CONCLUSIONES

LÍNEAS DE FUTURO

INTRODUCCIÓN
PATOLOGIA RESPIRATORIA
CRÓNICA AVANZADA

INTRODUCCIÓN

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AVANZADAS

CRÓNICAS

PROGRESIVAS

SINTOMÁTICAS

¿PRONÓSTICO?

TRATAMIENTOS DIRIGIDOS AL AUMENTO DE
ESPERANZA DE VIDA

¿AUMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA?

INTRODUCCIÓN

SÍNTOMAS MÁS HABITUALES:

- DISNEA
- TOS
- ANSIEDAD
- DEPRESIÓN

PEOR CALIDAD DE VIDA

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO/
NO FARMACOLÓGICO

EPID

- Las EPID comprenden un grupo de patologías diversas con manifestaciones clínicas y radiológicas similares.
- En España la incidencia de EPID 7,6 casos/100.000 siendo la Fibrosis Pulmonar Idiopática (FPI) la más frecuente.
- La FPI es progresiva e irreversible por naturaleza, con una supervivencia media estimada de 4-5 años desde el diagnóstico.
- Otras EPID desarrollan fibrosis pulmonar, lo cual ocurre en una proporción variable en función de la entidad. Este componente fibrótico puede progresar a pesar de las medidas terapéuticas adoptadas, lo que se conoce como fibrosis pulmonar progresiva (FPP).

INTRODUCCIÓN
CUIDADOS PALIATIVOS EN LA EPID

INTRODUCCIÓN

ESCASA DERIVACIÓN A CUIDADOS PALIATIVOS

EN FASE MUY AVANZADA DE LA ENFERMEDAD

*Rajala K et al. BMC Palliat Care. 2016;15(1):1-6.
Lindell KO et al. Chest 2015; 147(2):423-9.*

INTRODUCCIÓN

ARCHIVOS DE
Bronconeumología

www.archbronconeumol.org

Original

Cuidados paliativos en la enfermedad pulmonar intersticial difusa: resultados de una encuesta de ámbito nacional

Silvia Barril^{a,b}, Ana Alonso^b, José Antonio Rodríguez-Portal^{c,h}, Margarita Viladot^d, Jordi Giner^{b,e}, Francisco Aparicio^e, Ana Romero-Ortiz^f, Orlando Acosta^g y Diego Castillo^{b,e,*}

164 PROFESIONALES

- 98% interés en cuidados paliativos.
- 46% habían recibido alguna formación específica.
- 44% refirió ser el responsable de los CP.
- 78% refirió consensuar con los pacientes AET.
- 35% realizar un documento de VA.
- 71% no hablaba sobre el lugar de fallecimiento.

32% disponían de un protocolo sobre el manejo de los CP en el paciente el respiratorio crónico.

23% en coordinación CP

Review

Barriers to specialist palliative care in interstitial lung disease: a systematic review

Jee Whang Kim,¹ Chris Atkins,² Andrew M Wilson²

Kim JW, et al. *BMJ Supportive & Palliative Care* 2018;**0**:1–9. doi:10.1136/bmjspcare-2018-001575

10 estudios con un total 4073 pacientes con EPID.

- La frecuencia en la derivación a CP 0% al 38%

El retraso en la derivación a CP y en la toma de decisiones.

Miedo de los pacientes a hablar sobre el futuro.

Incertidumbre sobre el pronóstico.

Confusión de los roles de los profesionales en CP.

Health professionals' perceptions of palliative care for end-stage cardiac and respiratory conditions: a qualitative interview study

Hannah J. Fairlamb^{1*} and Fliss E. M. Murtagh²

16 PROFESIONALES:

- 5 Cardiología
- 5 Neumología
- 6 Cuidados Paliativos

Variabilidad en la evolución

Derivación a CP difícil

Falta de conversaciones sobre planificación final de vida

Falta de comunicación y habilidades comunicativas.

Falta de tiempo y confianza de los profesionales.

End-of-life care of patients with idiopathic pulmonary fibrosis

Kaisa Rajala^{1,6*}, Juho T. Lehto², M. Saarinen^{3,4}, E. Sutinen^{3,4}, T. Saarto¹ and M. Myllärniemi⁵

59 pacientes

- 80% falleció en el hospital
- 93% hospitalizados >30d en los últimos 6m
- 57% decisiones sobre ONIR (42% 3d antes muerte)

Table 3 Life prolonging treatments and diagnostic tests during the last week of life

	Place of death			Total
	Tertiary hospital	Community hospital	Home, nursing home or hospice	
Number of patients	26	21	12	59
Life prolonging treatments (last 7 days)				
NIV	13 (50 %)	4 (19 %)*	0	17 (29 %)
Parenteral fluids	16 (62 %)	11 (52 %)	2 (16 %)	29 (49 %)
Antibiotics	24 (92 %)	13 (62 %)*	2 (16 %)	39 (66 %)
Diagnostic tests (last 24 h)				
X-rays	8 (31 %)	1 (5 %)*	0	9 (15 %)
Laboratory tests	18 (69 %)	7 (33 %)*	0	25 (42 %)

NIV non-invasive ventilation

* $p < 0.05$ for tertiary vs. community hospital

Palliative Care and Location of Death in Decedents With Idiopathic Pulmonary Fibrosis

Kathleen O. Lindell, PhD, RN; Zhan Liang, MSN, RN; Leslie A. Hoffman, PhD, RN; Margaret Q. Rosenzweig, PhD, FNP-BC, AOCNP; Melissa I. Saul, MS; Joseph M. Pilewski, MD; Kevin F. Gibson, MD; and Naftali Kaminski, MD

404 pacientes

- 57% falleció en el hospital.
- 13,7% derivado a CP (71% en el último mes de vida)

INTRODUCCIÓN

MEJORAR **CALIDAD** DE VIDA DE LOS PACIENTES Y SUS FAMILIAS

MEJOR CONTROL DE SÍNTOMAS

INGRESOS HOSPITALARIOS

CONSULTAS URGENCIAS

PROCEDIMIENTOS AGRESIVOS

PLANIFICACIÓN FINAL DE VIDA

INTRODUCCIÓN

MEJOR CONTROL DE SÍNTOMAS

PLANIFICACIÓN FINAL DE VIDA

Respiratory Medicine 219 (2023) 107411

Contents lists available at [ScienceDirect](#)

Respiratory Medicine

journal homepage: www.elsevier.com/locate/rmed

Palliative care interventions in chronic respiratory diseases: A systematic review

Marta Fé Santos^a, Paulo Reis-Pina^{a,b,*}

8 ensayos clínicos comparando intervención de cuidados paliativos vs atención habitual

Mejor control de la disnea

Mejor planificación del final de vida

INTRODUCCIÓN

INGRESOS HOSPITALARIOS

CONSULTAS URGENCIAS

PLANIFICACIÓN FINAL DE VIDA

Brief Report

Beyond Idiopathic Pulmonary Fibrosis Diagnosis: Multidisciplinary Care With an Early Integrated Palliative Approach Is Associated With a Decrease in Acute Care Utilization and Hospital Deaths

Meena Kalluri, MD, FCCP, Francisca Claveria, BSc, Emily Ainsley, BSc, Maged Haggag, MBBS,

Susan Armijo-Olivo, BSc, MSc PT, PhD, and Janice Richman-Eisenstat, MD, FRCPC

Division of Pulmonary Medicine (M.K.), Department of Medicine, University of Alberta, Edmonton, Alberta; Department of Physiology (F.C., E.A.), University of Alberta, Edmonton, Alberta; Department of Medicine (M.H., J.R.-E.), University of Alberta, Edmonton, Alberta; and University of Alberta (S.A.-O.), Institute of Health Economics, Edmonton, Alberta, Canada

Journal of Pain and Symptom Management

Vol. 55 No. 2 February 2018

Table 3
Preferred Place of Care and Death vs. Actual Place of Death in MDC Care and Non-MDC Care IPF Patients

Characteristic	MDC Care (n = 22)	Non-MDC Care (n = 10)
Preferred place of care		
Home	21 (95%)	3 (30%)
Hospice	1 (5%)	0 (0%)
Hospital/ICU	0 (0%)	1 (10%)
Not documented	0 (0%)	6 (60%)
Preferred place of death		
Home	17 (77%)	0 (0%)
Hospice	3 (14%)	0 (0%)
Hospital/ICU	2 (9%)	1 (10%)
Not documented	0 (0%)	9 (90%)
Actual place of death		
Home	12 (55%)	0 (0%)
Hospice	5 (23%)	4 (40%)
Hospital/ICU	5 (23%)	6 (60%)
Not documented	0 (0%)	0 (0%)

ICU = intensive care unit.

European Respiratory Society clinical practice guideline: palliative care for people with COPD or interstitial lung disease

Daisy J.A. Janssen ^{1,2}, Sabrina Bajwah ³, Michele Hilton Boon⁴, Courtney Coleman⁵, David C. Currow⁶, Albert Devillers⁷, Chantal Vandendungen⁷, Magnus Ekström ⁸, Ron Flewett⁹, Sarah Greenley¹⁰, Mai-Britt Guldin¹¹, Cristina Jácome ¹², Miriam J. Johnson¹³, Geana Paula Kurita^{14,15}, Matthew Maddocks³, Alda Marques¹⁶, Hilary Pinnock ¹⁷, Steffen T. Simon¹⁸, Thomy Tonia¹⁹ and Kristoffer Marsaa ²⁰

Pregunta 2: ¿Cuándo iniciar un enfoque de cuidados paliativos en la EPOC y la EPID?

Cuando los pacientes tengan necesidades físicas, psicológicas, sociales o espirituales/existenciales insatisfechas.

- Interrogatorio dirigido.
- Marcadores sustitutos de la gravedad de la enfermedad.
- El uso de los servicios de salud.

(Recomendación condicional: baja calidad de la evidencia.)

ESTUDIO

IMPACTO DE LA DERIVACIÓN PRECOZ
A CUIDADOS PALIATIVOS

ESTUDIO: IMPACTO DE LA DERIVACIÓN PRECOZ A CUIDADOS PALIATIVOS EN LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD PULMONAR INTERSTICIAL DIFUSA

JOURNAL OF
Palliative Medicine

Journal of Palliative Medicine: <http://mc.manuscriptcentral.com/palliative>

**IMPACT OF EARLY REFERRAL TO PALLIATIVE CARE IN
PATIENTS WITH INTERSTITIAL LUNG DISEASE**

Ana Rodrigo-Troyano, Ana Alonso, Silvia Barril, Oscar Fariñas, Ernest Güell , Antonio Pascual, Diego Castillo.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS

HIPÓTESIS:

Los pacientes que son derivados precozmente a CP tienen menos ingresos hospitalarios y consultas a urgencias en el último año de vida y fallecen con más frecuencia en su domicilio, con un menor uso de medidas agresivas.

OBJETIVO PRINCIPAL:

- Cuantificar y comparar los ingresos hospitalarios en el último año de vida de pacientes con EPID en función de si habían sido derivados precozmente a un servicio de Cuidados Paliativos (CP) domiciliarios

OBJETIVOS SECUNDARIOS:

- Cuantificar y comparar las consultas a urgencias en el último año de vida de pacientes con EPID en función de si habían sido derivados precozmente a un servicio de CP domiciliarios.
- Valorar la influencia de la derivación a CP sobre la utilización de medidas agresivas en los últimos días de vida.
- Valorar la influencia de la derivación a CP sobre el lugar de fallecimiento de los pacientes.

MÉTODOS

ESTUDIO COHORTES RETROSPECTIVO
Hospital Sant Pau- Neumología-
Unidad de Cuidados Paliativos

2011

2016

2019

GRUPO **NO** DERIVACIÓN PRECOZ
A CUIDADOS PALIATIVOS

GRUPO DERIVACIÓN PRECOZ
A CUIDADOS PALIATIVOS

DERIVACIÓN PRECOZ: El paciente no se encontraba en situación de últimos días y su esperanza de vida estimada era mayor de 6 meses.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:

- Diagnóstico de EPID.
- Sin opciones a tratamiento curativo.
- En fase final de su enfermedad.
- Fallecido durante el periodo establecido.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:

- Recibiendo tratamiento activo para frenar la enfermedad.

MÉTODOS

VARIABLES

- VARIABLES DEMOGRÁFICAS.
- VARIABLES CLÍNICAS.
- VARIABLES FUNCIONALES
- VARIABLE A ESTUDIO: **Derivación precoz a cuidados paliativos.**

VARIABLES RESULTADO

12 meses

Número de ingresos hospitalarios en los últimos 12 meses de vida

Número de consultas a urgencias en los últimos 12 meses de vida

Fecha éxitus

Lugar de fallecimiento

Medidas agresivas

RESULTADOS

VARIABLES	MUESTRA TOTAL n= 51	DERIVACIÓN PRECOZ A CP n=23	NO DERIVACIÓN PRECOZ A CP n=28	p
Sexo, hombres	31 (60.8)	11 (47.8)	20 (71.4)	0.086
Edad (años)	79.6 (7.4)	80.1 (7.6)	79.2 (7.4)	0.68
IMC	26.5 (4.5)	26.4 (4.9)	26.6 (4.2)	0.8
Tabaco	29 (56)	13 (56.5)	16 (57)	0.65
Barthel	72.5 (25)	68 (30)	76.2 (22.5)	0.04
Charlson	5.7 (3)	6.1 (2)	5.3 (4.5)	0.1
FEV1	67.5 (19)	61.36 (29)	72.9 (18)	0.06
FVC	61.9 (17.4)	55.2 (14.6)	67.3 (17.9)	0.01
DLCO	35.7 (16)	35.2 (20)	36.2 (16)	0.5

Media de días desde la derivación a CP hasta éxitus **175 días**.

RESULTADOS

RESULTADOS	MUESTRA TOTAL N=51	DERIVACIÓN PRECOZ A CP N=23	NO DERIVACIÓN PRECOZ A CP N=28	P
Número de ingresos hospitalarios	1.4 (2)	0.5 (1)	2.1 (2)	<0.001
Número consultas a urgencias	1.3 (2)	1 (1)	1.6 (1)	0.03
Éxito en hospital	21 (41%)	4 (17.4)	17 (60.7)	0.002
Medidas agresivas	7 (13.7)	1 (4.35)	6 (21.4)	0.08

Regresión logística ajustada a un score de propensión (sexo, edad, FPI, FVC, Barthel, Charlson).

Pertenecer al grupo derivación precoz a CP se asocia de forma independiente:

- **Menor riesgo de ingresos hospitalarios (OR 0.16, 95% CI 0.03-0.75, p=0.02).**
- **Menor riesgo de fallecer ingreso hospitalario (OR 0.11, 95% CI 0.02-0.5, p=0.009).**
- No se evidenciaron diferencias significativas en las consultas a urgencias (OR 0.26, 95% CI 0.05-1.3, p=0.1)

PLANIFICACIÓN FINAL DE VIDA

INGRESOS HOSPITALARIOS

La derivación precoz a CP en pacientes con EPID se asocia a un **menor riesgo de ingresos hospitalarios en el último año de vida**, y a una mejor planificación del final de la vida como así indica el **menor porcentaje de muerte durante un ingreso hospitalario**.

CONCLUSIONES

- No existen claros criterios de derivación a CP en pacientes con patología respiratoria crónica avanzada.
- Existe evidencia suficiente para recomendar una intervención precoz en estos pacientes.
- Es necesario continuar trabajando de forma conjunta para mejorar la atención en el final de vida de estos pacientes.

LÍNEAS DE FUTURO

LÍNEAS DE FUTURO

- ❖ Experiencia en HUSE sobre el impacto de la intervención ESHPAL en los pacientes con enfermedades respiratorias avanzadas.
- ❖ Evaluación de los conocimientos en el final de vida y cuidados paliativos de los profesionales sanitarios y valorar el impacto de formaciones específicas.

- ¡Muchas gracias!

*Ana Rodrigo, MD, PhD.
Servicio de Neumología HUSE
anamaria.rodrigo@ssib.es*