

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA ANAFILAXIA EN CENTROS EDUCATIVOS

1.er PASO: EVALUAR Y TRATAR

Afecta a un solo órgano.		VIGILAR	➤ Ronchas o habones en la cara, enrojecimiento, picor en boca o en labios. Administrar la medicación pautada por el equipo sanitario
			➤ Hinchazón de: labios, párpados, manos u otra parte del cuerpo. Administrar la medicación pautada por el equipo sanitario
			➤ Dolor abdominal, náuseas, vómitos o diarreas. Administrar la medicación pautada por el equipo sanitario
			➤ Picor de ojos o de nariz, estornudos frecuentes, mucosidad abundante, ojos rojos o lagrimeo. Administrar la medicación pautada por el equipo sanitario
Afecta a 2 o más órganos.		EMERGENCIA	➤ Opresión en garganta, voz ronca o afónica, tos repetitiva. ADMINISTRAR ADRENALINA AUTOINYECTABLE: 0,15/150-030/300
			➤ Respiración dificultosa, voz entrecortada, tos seca repetitiva, ahogo, pitos, piel o labios azulados. ADMINISTRAR ADRENALINA AUTOINYECTABLE: 0,15/150-030/300
			➤ Palidez, pulso débil, pérdida de conocimiento, mareo, sensación de muerte inminente. ADMINISTRAR ADRENALINA AUTOINYECTABLE: 0,15/150-030/300


2.º PASO: SI SOSPECHA DE ANAFILAXIA, AVISE AL 061 Y SIGA INSTRUCCIONES

1. NO DEJE NUNCA SOLO AL NIÑO/ADOLESCENTE.
2. Llame a Urgencias (Tel.: 061) y comunique que se trata de una anafilaxia.
3. Llame a los padres o a los tutores legales.
4. Aunque no pueda contactar con los padres o con el representante legal, no dude en administrarle la medicación (deber de socorro) siguiendo instrucciones del 061.

1. Coja la pluma autoinyectable de adrenalina con la mano dominante (la que usa para escribir), con el dedo gordo al lado del tapón de seguridad.



2. Con la otra mano, quite el tapón de seguridad (amarillo o azul según la adrenalina).



3. Coloque el extremo negro o naranja del inyector en la parte externa del muslo y sujételo en ángulo recto.



4. Presione el extremo negro o naranja del inyector energicamente hasta que note el clic que confirma que ha empezado la inyección. Manténgalo presionado 10 segundos.



5. Masajee la zona de inyección durante 10 segundos.



6. Llame al 061, diga "anafilaxia" i solicite atención médica inmediata.

