

Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
-	-	-	-
Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)			
Malaltia / Etiologia	Territori / Àmbit		Nre. casos
Parotiditis	Eivissa / Poblacional		106
Parotiditis	Sóller / Poblacional		18
Escarlatina	Eivissa / Escolar		2
Tuberculosi	Palma / Familiar		3
-	-		-
Novetats a www.epidemiologia.caib.es : No s'ha afegit cap document			

Nota: Se recuerda que la Enfermedad por virus Zika debe notificarse de forma urgente ante cualquiera de las siguientes circunstancias:

- Solicitud de prueba de laboratorio para investigación de virus Zika.
- Cumplimiento de criterio de caso sospechoso.
- Cumplimiento de criterio de caso probable.
- Cumplimiento de criterio de caso confirmado.

Definiciones de caso, Protocolos de Notificación y otros documentos disponibles en:
www.epidemiologia.caib.es / Protocolos y otros documentos/ Zika

Resumen del documento del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias:
"Evaluación Rápida del Riesgo de transmisión de la infección del virus Zika en España"
8ª actualización. 21 de marzo 2017.

- Documento completo disponible en:
www.epidemiologia.caib.es / documentos técnicos / virus Zika

Riesgo de transmisión del virus Zika en España

La probabilidad de que exista transmisión del virus Zika en España depende de: 1) la presencia del vector competente en el entorno, 2) la introducción del virus por un viajero infectado procedente de áreas endémicas, 3) la presencia de población susceptible a la infección, 4) la coincidencia en el espacio y en el tiempo de un caso importado virémico con el vector y 5) la posibilidad de que el virus encuentre las condiciones favorables para su transmisión.

En España no se ha identificado la presencia de *Ae. aegypti*, vector considerado competente para la transmisión del virus. Aunque existe una zona de España con presencia de *Ae. albopictus*, este es un vector considerado de muy baja competencia para la transmisión de la enfermedad. A nivel global, no se ha identificado ninguna zona con transmisión vectorial en la que el único vector presente fuera el *Ae. albopictus*.

A pesar de ello, existe un importante intercambio de mercancías y viajeros con los países de riesgo, y la población española se considera susceptible a la infección, por lo que no se puede descartar la detección de casos importados y algún caso esporádico de transmisión no vectorial.

Atendiendo a estos factores, el riesgo de transmisión autóctona del virus Zika en España se considera muy bajo.

Impacto potencial de la infección por virus Zika en España

Dado el carácter leve de la enfermedad y la baja probabilidad de introducción y transmisión del virus en nuestro país, el potencial impacto en la población sería en general muy bajo. La principal preocupación en términos de impacto grave sobre la salud de la población es la asociación entre la infección por virus Zika y los casos de microcefalia en fetos y recién nacidos, así como la aparición de complicaciones neurológicas. No

obstante, nuestro país tiene la capacidad necesaria para realizar una detección precoz de estos casos e implementar las medidas adecuadas para reducir el posible impacto.

Conclusiones

La enfermedad por virus Zika en general es asintomática o presenta una sintomatología leve. No obstante, se ha asociado a la posibilidad de desarrollar microcefalias o malformaciones neurológicas en recién nacidos de mujeres infectadas durante el embarazo, así como a síndromes neurológicos tipo Guillain-Barré.

La población española es mayoritariamente susceptible y por tanto vulnerable a la infección por el virus Zika.

Aunque existe el riesgo de introducción y transmisión autóctona del virus Zika en nuestro país, considerando su rápida expansión por la región de las Américas y la frecuente comunicación de España con estos países.

Las embarazadas constituyen el grupo de interés prioritario, al que deben ir dirigidas las recomendaciones y acciones de promoción y prevención, basándose en la evidencia disponible que relaciona la infección por virus Zika con la aparición de anomalías congénitas.

Existe riesgo de transmisión por vía sexual tanto en mujeres como en hombres. Ocurre sobre todo a partir de personas que tienen o han tenido síntomas de la enfermedad, pero puede producirse incluso a partir de portadores asintomáticos y durante periodos prolongados tras los síntomas.

El Centro Nacional de Microbiología es el laboratorio nacional de referencia de arbovirosis y tiene capacidad para el diagnóstico de la infección del virus de Zika. Varias comunidades autónomas también tienen actualmente capacidad de diagnóstico.

Recomendaciones

- Mantener la vigilancia frente a la enfermedad por virus Zika y difundir información entre los profesionales sanitarios, de forma que los casos importados se detecten y notifiquen lo antes posible.
- Informar a los viajeros sobre las recomendaciones en relación a las medidas de protección individual en las zonas de riesgo y la importancia de consultar a su médico a la vuelta de su viaje si presentan síntomas compatibles con la enfermedad. Las recomendaciones para viajeros se pueden consultar en este enlace: http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/zika/recomendaciones/MedidasProteccion_Zika.htm.
- Las mujeres embarazadas o que están tratando de quedarse embarazadas y que planean viajar a las zonas afectadas por la transmisión del virus Zika deben considerar posponer el viaje si no es imprescindible hasta finalizar su embarazo. En caso de que no sea posible retrasar el viaje, deben extremar las medidas de precaución necesarias.
- Las parejas sexuales de mujeres embarazadas que regresen de áreas con transmisión local de virus Zika deben mantener sexo con protección de barrera durante todo el embarazo.
- Las parejas que quieran concebir deberían considerar retrasar el embarazo para minimizar el riesgo de transmisión congénita, si uno o ambos miembros han estado expuestos (ej.: regresar/proceder de áreas con transmisión local del virus Zika o haber tenido relaciones sexuales no protegidas con una pareja potencialmente infectada): al menos 8 semanas después de la aparición de los síntomas o de la última posible exposición al virus Zika para mujeres (sintomáticas o no) o al menos 6 meses después de la aparición de los síntomas o de la última posible exposición al virus Zika para hombres (sintomáticos o no).
- Las personas que regresen de áreas con transmisión local de virus Zika, para evitar la transmisión sexual a sus parejas, deben mantener sexo con protección de barrera al menos 8 semanas si quien regresa es una mujer y 6 meses si es un hombre.
- Retrasar las donaciones de sangre durante 28 días en caso de haber viajado a áreas de riesgo o 28 días después de la finalización de los síntomas. También se han elaborado recomendaciones específicas para las donaciones de semen, órganos y tejidos.

La eficacia de la respuesta frente a las enfermedades transmitidas por vectores se consigue con un abordaje integral, por lo que es importante la coordinación con los sectores implicados a nivel local. En este abordaje debe contemplarse la implementación de medidas de control vectorial orientadas a la reducción de su densidad en las zonas donde *Ae. albopictus* está presente.

Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta	
Botulisme	Bot
Brucel·losi	Bru
Carboncle	Carb
Diarrea infec.aguda	Dia
Disenteria bacil·lar	Dis
Febre exantemàtica mediterrània	FEM
Febre recurrent paparres	FRP
FebreTifoide i paratifoide	Ftif
Grip	Grip
Hepatitis A	HepA
Hepatitis B	HepB
Hepatitis C	HepC
Hepatitis víriques altres	HepAl
Herpes Zoster	Hzos
Infecció gonocòccica	Gon
Legionel·losi	Leg
Leishmaniasi	Leish
Lepra	Lep
Malaltia de Creutzfeld-Jakob	MCJ
Malaltia meningocòccica	MM
Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae	MHI
Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae	Mpneu
Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes	MPyog
Paludisme	Pal
Paràlisi flàccida aguda	PFA
Parotiditis	Paro
Polio	Polio
Rubèola	Rub
Rubèola Congènita	Rubcg
Sífilis	Sif
Sífilis Cong.	Sifcg
Tètan	Tet
Tos ferina	Tfer
Triquinosi	Triq
Tuberculosi altres formes	Tba
Tuberculosi pulmonar	Tbp
Varicel·la	Var
Xarampió	Xar

	Dia	FEM	Grip	Hzos	Paro	Mpneu	Var
A. Bennàssar	26	0	11	3	0	0	10
Alcúdia	9	0	3	0	0	0	2
Andratx	5	0	0	0	0	0	0
Binissalem	11	0	5	1	0	0	2
C.Mar Ponent	17	0	4	1	0	0	10
Calvià	22	0	6	4	0	1	2
Camp Rodó	7	0	1	4	0	0	1
Can Pastilla	9	0	0	1	0	0	0
Capdepera	12	0	8	1	0	0	1
Coll d'en Rabassa	18	0	3	2	0	0	9
Emili Darder	22	0	2	1	0	0	3
Es Pla Sineu	10	0	4	1	0	0	0
Es Trencadors	26	0	3	1	0	1	1
Escola Graduada	18	0	2	1	0	0	8
Felanitx	11	0	5	2	0	0	4
Inca	35	0	6	3	0	0	0
Llevant	35	0	2	1	0	0	4
Llucmajor	29	0	5	2	0	0	2
Manacor	35	0	0	0	0	0	3
Marines Muro	31	0	0	0	0	0	0
Martí Serra	10	0	10	1	0	0	4
Muntanya	8	0	1	1	0	0	3
Nuredunna Artà	4	0	1	0	0	0	0
Palmanova	11	0	2	2	0	0	9
Pere Garau	21	1	4	1	0	0	13
Pollença	10	0	3	0	0	0	7
Porto Cristo	11	0	0	0	0	0	3
Rafal Nou	19	0	4	2	0	0	5
S'Escorxador	6	0	2	0	0	0	3
Sant Agustí	8	0	0	0	0	0	0
Santanyí	26	0	10	1	0	0	1
Serra Nord	25	0	11	0	0	0	17
Son Cladera	6	0	0	0	0	0	1
Son Ferriol	10	0	3	1	0	0	0
Son Goteu	26	0	8	1	0	0	16
Son Pisà	21	0	4	3	0	0	3
Son Rutlan	13	0	3	0	0	0	1
Son Serra	5	0	2	4	0	0	10
Sta. Catalina	7	0	3	0	0	0	3
Sta. Maria	12	0	5	1	0	0	0
T. S. Miquel	13	0	14	1	0	0	0
Tramuntana	8	0	1	0	0	0	0
Valldargent	3	0	0	0	0	0	0
Vilafranca	13	0	1	1	0	0	1
Xaloc Campos	1	0	2	1	0	0	2
Ciutadella	15	0	8	2	0	0	10
D.S.Joan. Maó	15	0	25	1	0	0	17
Es Banyer Alaïor	6	0	3	1	0	0	7
Ferrerries	2	0	1	0	0	0	0
Verge del Toro	4	0	19	4	0	0	0
Can Misses	17	0	5	2	0	1	6
Es Viver	23	0	1	1	1	0	19
Formentera	1	0	0	0	0	0	0
Sant Antoni	21	0	5	3	0	0	1
Sant Jordi	3	0	0	0	0	0	10
Sant Josep	21	0	3	0	0	0	0
Sta. Eulària	28	0	4	2	0	0	3
Vila	17	0	3	0	0	0	6
desconeiguda	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	858	1	241	66	1	3	243

Abreviatures de malaltia emprades a taula adjunta	
Botulisme	Bot
Brucel·losi	Bru
Carboncle	Carb
Diarrea infec.aguda	Dia
Disenteria bacil·lar	Dis
Febre exantemàtica mediterrània	FEM
Febre recurrent paparres	FRP
FebreTifoide i paratifoide	Ftif
Grip	Grip
Hepatitis A	HepA
Hepatitis B	HepB
Hepatitis C	HepC
Hepatitis víriques altres	HepAl
Herpes Zoster	Hzos
Infecció gonocòccica	Gon
Legionel·losi	Leg
Leishmaniasi	Leish
Lepra	Lep
Malaltia de Creutzfeld-Jakob	MCJ
Malaltia meningocòccica	MM
Malaltia invasiva per Haemophilus influenzae	MHI
Malaltia invasora per Streptococcus pneumoniae	Mpneu
Malaltia invasora per Streptococcus pyogenes	MPyog
Paludisme	Pal
Paràlisi flàccida aguda	PFA
Parotiditis	Paro
Polio	Polio
Rubèola	Rub
Rubèola Congènita	Rubcg
Sífilis	Sif
Sífilis Cong.	Sifcg
Tètan	Tet
Tos ferina	Tfer
Triquinosi	Triq
Tuberculosi altres formes	Tba
Tuberculosi pulmonar	Tbp
Varicel·la	Var
Xarampió	Xar

	Dia	MHI	FEM	Grip	HepC	Hzos	Gon	Paro	Sif	Mpneu	Tfer	Tbp	Var
A. Bennàssar	16	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Alcúdia	8	0	1	5	0	3	0	0	0	0	0	0	1
Andratx	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Binissalem	9	0	0	9	0	1	0	0	0	0	0	0	1
C.Mar Ponent	5	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Calvià	15	0	0	11	0	2	0	0	0	0	0	0	6
Camp Rodó	12	0	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	4
Can Pastilla	8	0	0	3	0	1	0	0	0	0	1	0	1
Capdepera	7	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	5
Coll d'en Rabassa	10	0	0	7	0	1	0	1	0	0	0	0	0
Emili Darder	8	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Es Pla Sineu	12	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Es Trencadors	16	0	0	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Escola Graduada	9	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	2
Felanitx	12	0	0	15	0	1	0	0	0	0	0	0	6
Inca	20	0	0	17	0	1	0	0	0	0	0	0	13
Llevant	7	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Llucmajor	6	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Manacor	20	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Marines Muro	13	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	8
Martí Serra	13	0	1	9	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Muntanya	6	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2
Nuredunna Artà	4	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	6
Palmanova	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Pere Garau	7	0	0	7	0	4	0	0	1	0	0	0	1
Pollença	12	0	0	4	0	3	0	0	0	0	0	0	5
Porto Cristo	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Rafal Nou	7	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
S'Escorxador	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sant Agustí	10	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	2
Santanyí	11	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Serra Nord	28	0	0	11	0	7	0	0	1	0	0	0	4
Son Cladera	11	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Son Ferriol	11	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Son Gotleu	16	0	0	8	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Son Pisà	13	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Son Rutlan	7	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Son Serra	17	0	0	5	0	6	0	0	0	0	0	0	4
Sta. Catalina	11	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Sta. Maria	8	1	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	5
T. S. Miquel	13	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Tramuntana	2	0	0	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Valldargent	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Vilafranca	8	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Xaloc Campos	8	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ciutadella	11	0	0	10	1	4	0	0	0	0	0	0	3
D.S.Joan. Maó	21	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Es Banyer Alaior	7	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Ferrerries	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verge del Toro	7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Can Misses	8	0	0	13	0	3	0	0	0	1	0	0	0
Es Viver	16	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Formentera	1	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Sant Antoni	17	0	0	10	0	3	1	0	0	0	0	0	12
Sant Jordi	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sant Josep	11	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Sta. Eulària	7	0	0	5	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Vila	11	0	0	8	0	4	0	0	0	0	0	0	1
desconeiguda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	591	1	2	314	2	79	1	1	2	1	1	1	157