



- CAP= "Contactes d'alta prioritat"  
 CAP1=Nins<5 anys; pacients immunodeprimits i/o VIH (+); en context de microepidèmia incloure nins fins a l'adolescència o adults joves.  
 CAP2= Convivents; parella sexual; contacte continuat i estret >6h/dia (exemple: mateixa aula a l'àmbit docent, determinats àmbits laborals, etc.)  
 -CMP= "Contactes de mitjana prioritat" (companys de treball, àmbit docent, amics, parents etc.. amb relació habitual de <6h./dia i no catalogable com CAP)  
 -PT= Prova tuberculina; TITL= Tractament de la Infecció Tuberculosa Latent; QPP= Quimioprofilaxi primària; QT=Quimioteràpia de tractament de malaltia.

- Prioritzar estudi de CAP i en cas bacil·lífer. Estudi de la resta de contactes només si hi ha evidència de transmissió a l'àmbit CAP.  
 - PT(\*):Contactes amb antecedents de TBC o amb PT prèvia positiva o que han completat un cicle de TITL amb anterioritat, no és necessari PT: descartar TBC  
 Contactes amb símptomes compatibles amb TBC: PT i descartar TBC  
 Contactes vacunats o >55 anys: amb una primera PT negativa, s'ha repetit als 7 dies i aquest és el resultat vàlid a efectes de decisió d'actuació.

(1) Enviar "Protocol de notificació de contacte" (Primera notificació)  
 (2) Enviar "Protocol de notificació de contacte" (Ampliació)  
 (3) Enviar protocol de notificació de cas