



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B SALUT PÚBLICA
/ I PARTICIPACIÓ



El tabac és la principal causa de càncer i de mort per càncer.

Fumar és la forma més nociva de consum de tabac, ja que el major risc de càncer procedeix de la combustió o del fum del tabac (la majoria de substàncies tòxiques, incloses les que causen càncer –carcinògens–, es generen durant la combustió).

El tabac produeix diferents tipus de càncer, especialment si es fuma però el fum del tabac també produeix càncer a les persones no fumadores que lo inhalen.

Segons els tumors definits per l'Agència Internacional d'Investigació sobre el Càncer (IARC), els tumors relacionats amb el tabac representen el 58% dels casos en homes i el 43% en les dones. El tabac està relacionat amb el 76% de les morts per càncer en els homes i el 57% en les dones. (Registre de càncer de Mallorca).

Els primers llocs, tant en incidència com en mortalitat, l'ocupen els tumors digestius i de pulmó.

El percentatge de tumors relacionats o atribuïts al tabac varia segons el tipus de càncer: 84% de laringe, el 82% de pulmó, 50% bufeta urinària, 49% orofaringe, 35% esòfag, 33% cavitat oral, 25% fetge i vies biliars, el 21% estómac, el 17% nasofaringe, 14% colorectal, 14% ovari, 14% cèrvix, el 13% leucèmia, 13% pàncrees, 11% cavitat nasal i sins, 8% ronyó i vies urinàries.

El risc de desenvolupar càncer augmenta en proporció a la quantitat que es fuma i des de quant.

El risc de patir càncer baixa ràpidament quan deixes de fumar i continua baixant al llarg dels anys.