



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B SALUT PÚBLICA
/ PARTICIPACIÓ



somriures
sense fum

El tabaco es la principal causa de cáncer y de muerte por cáncer.

Fumar es la forma más nociva de consumo de tabaco, ya que el mayor riesgo de cáncer procede de la combustión o del humo del tabaco (la mayoría de sustancias tóxicas, incluidas las que causen cáncer - carcinógenas-, se generan durante la combustión.

El tabaco produce diferentes tipos de cáncer, especialmente si se fuma pero el humo del tabaco también produce cáncer a las personas no fumadoras que lo inhalan.

Según los tumores definidos por la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC), los tumores relacionados con el tabaco representan el 58% de los casos en hombres y el 43% en las mujeres. El tabaco está relacionado con el 76% de las muertes por cáncer en los hombres y el 57% en las mujeres. (Registro de cáncer de Mallorca).

Los primeros puestos, tanto en incidencia como en mortalidad, lo ocupan los tumores digestivos y de pulmón.

El porcentaje de tumores relacionados o atribuibles al tabaco varía según el tipo de cáncer: 84% de laringe, el 82% de pulmón, 50% vejiga urinaria, 49% orofaringe, 35% esófago, 33% cavidad oral, 25% hígado y vías biliares, el 21% estómago, el 17% nasofaringe, 14% colorectal, 14% ovario, 14% cérvix, el 13% leucemia, 13% páncreas, 11% cavidad nasal y senos, 8% riñón y vías urinarias.

El riesgo de desarrollar cáncer aumenta en proporción a la cantidad que es fuma y desde cuando se inició el consumo.

El riesgo de padecer cáncer disminuye rápidamente cuando se deja de fumar y continúa bajando a lo largo de los años.