



Indicador d'admissió a tractament per consum de substàncies psicoactives. Resultats de 2020.

1. Introducció

L'indicador d'admissió a tractament per consum de substàncies psicoactives es defineix com el nombre de persones admeses a tractament ambulatori per abús o dependència en un any. En el cas que una mateixa persona faci més d'un tractament, només es considera la primera admissió.

S'entén per tractament qualsevol intervenció realitzada per professionals qualificats per eliminar l'abús o la dependència de substàncies psicoactives o reduir-ne la intensitat.

2. Objectius específics

Entre els principals objectius de l'indicador hi ha:

1. Descriure la situació i la tendència temporal de les característiques sociodemogràfiques, els patrons de consum i els problemes associats de les persones admeses a tractament per cada substància psicoactiva en els centres notificadors.
2. Contribuir, juntament amb la resta de la informació disponible a l'Observatori Espanyol sobre Drogues (indicador d'urgències, indicador de mortalitat i altres indicadors), a entendre millor la situació del consum de substàncies psicoactives a Espanya amb la finalitat d'aportar informació útil per iniciar estudis nous, així com per dissenyar i implementar polítiques.

3. Metodologia

Per elaborar aquest indicador es recull la informació a través d'un qüestionari comú per a totes les comunitats i ciutats autònomes elaborat pel Pla Nacional sobre Drogues.

La font de dades de les Illes Balears són els centres que ofereixen tractaments d'abús o dependència de qualsevol substància psicoactiva, seleccionats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, seguint els criteris que es recullen en el protocol del Pla Nacional sobre Drogues.

Pel que fa als centres notificadors que participen en l'elaboració d'aquest indicador, trobam una part de centres d'atenció pública i una part concertada.

Les unitats de conductes additives (UCA) conformen els recursos assistencials de caràcter públic. Es tracta de les UCA 1, 2, 3, 4 i la Jove. Són centres ambulatoris que atenen de manera integral les persones que presenten problemes d'addicció a substàncies diverses (alcohol, cànnabis, cocaïna, heroïna, etc.) o conductes addictives (ludopatia, tecnologies digitals, compres compulsives, etc.), i també les seves famílies.

Hi ha cinc centres que depenen organitzativament de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i cobreixen la ciutat de Palma: quatre que atenen població de més de 21 anys i tenen un centre de salut assignat, i un cinquè (l'UCA Jove) que atén joves menors de 21 anys residents a Mallorca.

L'atenció a la població de més de 21 anys de fora de Palma correspon a les UCA que depenen de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS); aquestes estan organitzades territorialment a fi d'acostar els ciutadans amb aquesta problemàtica al recurs més pròxim al seu poble. Es tracta de les UCA de Calvià, Inca, Manacor, Migjorn i Palma (perifèria). Cobreixen tots els municipis de Mallorca, a excepció de la ciutat de Palma.

També amb l'objectiu d'acostar l'accés als recursos públics a tots els ciutadans, a Eivissa hi ha l'UCA d'Eivissa i Formentera, i a Menorca hi ha dues UCA: una a Ciutadella i una altra a Maó. Aquestes depenen dels consells insulars respectius.

Recentment s'han incorporat dos centres més a la xarxa: un centre hospitalari de dia a Eivissa i una consulta a Formentera; aquests serveis són de titularitat del Govern de les Illes Balears.


El centre penitenciari de Palma també facilita notificacions d'inici de tractament.

La part concertada la conforma Projecte Home, associació declarada d'utilitat pública pel Consell de Ministres el 29 de desembre de 1993. Aborda les addiccions a través d'un model biopsicosocial. Aquesta associació té delegacions a Mallorca, Menorca i Eivissa.

S'ha de fer constar que el 2020 ha estat un any especial a causa de la pandèmia de COVID-19. Si bé totes les unitats i centres han estat oberts a les persones que els necessitaven, s'ha hagut de canviar la forma de fer feina, de presencial a telefònica o virtual, però sense deixar en cap moment d'atendre ningú, i sobretot aquelles persones que en un moment determinat han demanat ajuda per iniciar un tractament.

A pesar d'això, s'ha notificat un nombre menor d'inicis, en comparació amb altres anys.

GRÀFIC 1. Admissions a tractament per centre notificador




Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

4. Resultats

El nombre total de persones que es van admetre a tractament el 2020 va ser de 1.781, dels quals 1.311 eren homes i 470 eren dones.

GRÀFIC 2. Admissions a tractament per sexe



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020


GRÀFIC 3. Evolució de les notificacions d'inici de tractament per drogodependències 2016-2020



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020


Com ja s'ha comentat, s'observa un nombre menor de notificacions d'inici de tractament. Fins al 2019 teníem una tendència estable, i a partir d'aquest any s'observa una lleugera disminució, fet atribuïble als mesos de confinament i a les restriccions, que poden haver donat lloc que les persones no cercassin ajuda o que desconeguessin que els centres seguien a ple rendiment.

GRÀFIC 4. Nombre d'admissions per illes



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

GRÀFIC 5. Nombre d'admissions per illes i per notificacions d'UCA i Projecte Home



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2022

4.1 Distribució per grups d'edat i sexe i per substància consumida

El grup d'edat majoritari que accedeix al tractament és el de 36 a 45 anys, amb un 31,56 %, seguit dels intervals de 26 a 35, amb un 25,21 %, i el de 46 fins 65 anys, amb un 28,02 %. De menors de 25 anys hi ha un 13,25 % del total.


La raó de masculinitat és de 2,79. Un 73,61 % del total que van iniciar tractament eren homes i un 26,39 % eren dones.

TAULA 1. Distribució d'inicis de tractament per grups d'edat i sexe

Grup d'edat	Homes		Dones		Total	
	Freq.	%	Freq.	%	Freq.	%
Anys						
< 15 anys	1	0,06	1	0,06	2	0,11
15 - 20 anys	81	4,55	29	1,63	110	6,18
21 - 25 anys	89	5	35	1,97	124	6,96
26 - 35 anys	337	18,92	112	6,29	449	25,21
36 - 45 anys	422	23,69	140	7,86	562	31,56
46 - 65 anys	356	19,99	143	8,03	499	28,02
> 65 anys	25	1,4	10	0,56	35	1,97
Total	1.311	73,61	470	26,39	1.781	100,00

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

GRÀFIC 6. Percentatge d'inicis de tractament per sexe i grups d'edat



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

Si analitzam com es distribueixen els homes i les dones en els grups d'edat, observarem que en l'interval entre 26 i 45 anys el percentatge d'homes és superior al de les dones, mentre que en la resta d'interval el percentatge de dones és superior, i en el de 15 a 20 anys és pràcticament igual.

TAULA 2. Distribució d'inicis de tractament per substància principal consumida

Droga principal	Freq.	%
Alcohol	767	43,07 %
Cocaïna	442	24,82 %
Cànnabis	314	17,63 %
Heroïna	143	8,03 %
Alcohol + cocaïna	44	2,47 %
Amfetamines i èxtasi	21	1,18 %
Hipnòtics i sedants	19	1,07 %
Heroïna + cocaïna	12	0,67 %
Altres opiacis	10	0,56 %
Al·lucinògens	9	0,51 %
Total	1.781	100 %

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

Respecte de la substància consumida, i per al total d'inicis de tractament, la substància principal ha estat l'alcohol, amb un 43,07 %, seguit de la cocaïna, amb



GOIB

un 24,82 %, i del cànnabis, amb un 17,63 %. L'heroïna tota sola representa un 8,03 % del total.

Aquestes quatre drogues concentren gairebé la totalitat de les drogues principals, amb un 93,54 % de tots els admesos a tractament.

Quant als altres opiacis, aquests fan referència a tres casos de metadona, tres casos de fentanil i quatre casos que no n'especifiquen el tipus.

TAULA 3. Distribució d'inicis de tractament per substància principal consumida i intervals d'edat

Edat	Total	Heroïna	Heroïna + cocaïna	Metadona	Altres opiacis	Cocaïna	Amfetamines i èxtasi	Hipnòtics i sedants	Al·lucinògens	Cànnabis	Alcohol	Alcohol + cocaïna
< 15 anys	2									2		
15 - 20 anys	110					6	3	3		83	14	1
21 - 25 anys	124	5				31	3	1	3	50	27	4
26 - 35 anys	449	23	3	2	0	163	4	5	4	100	135	10
36 - 45 anys	562	61	6		4	173	10	4	2	59	225	18
46 - 65 anys	499	54	3	1	2	68	1	6		20	333	11
> 65 anys	35				1	1					33	
Total	1.781	143	12	3	7	442	21	19	9	314	767	44

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

En la taula 3 podem veure les substàncies per les quals s'inicia tractament per intervals d'edat dels pacient.

La substància per la qual s'inicia tractament varia en funció de l'edat. Així, s'observa que el 100 % (2) dels joves menors de 15 anys inicien tractament per cànnabis. De 15 a 20 anys aquest suposa un 75,45 % (83). Aquest percentatge va disminuint a mesura que augmenta l'edat.

Però si observam els percentatges segons les persones que iniciaren tractament per cànnabis (% per columna), el 74,20 % (233) de les persones se situa al tram de 15 a 35 anys d'edat.

El 94,29 % (33) de les persones majors de 65 anys iniciaren tractament per alcohol.

Si analitzam els percentatge per columna amb l'alcohol observam que el 72,75 % (558) es concentra en el tram de 36 a 65 anys.

En el tram d'edat de 26 a 35 anys s'observa que inicien tractament en un percentatge similar tant per alcohol com per cocaïna: un 30 % (135) per alcohol i un 30 % (163) per cocaïna.


Tenint en compte el percentatge per columna, i analitzant la cocaïna com a droga principal, el 76 % dels pacients que han iniciat tractament per aquesta droga estan concentrats en el tram de 26 a 45 anys (336).

Analitzant la heroïna, el 80,42 % (115) dels que han iniciat tractament per aquesta droga està concentrat en el tram de 36 a 65 anys.

Pel que fa a l'anàlisi segons l'edat (% per fila), trobam que un 10,8 % se situa tant en el tram de 36 a 45 anys com de en el de 46 a 65 anys. En el primer cas, aquest 10,8 % representen 61 persones i en l'altre, 54 persones.


Per tot plegat, s'observen tres patrons d'admissions a tractament segons la droga: en el tram de les persones més joves, és el cànnabis el principal responsable de les admissions a tractament; en el tram intermedi d'edat, la cocaïna i l'alcohol s'erigeixen com els causants de la problemàtica, i aquesta darrera droga és la que origina el tractament en persones d'edat més avançada.

GRÀFIC 7. Inicis de tractament segons substància consumida i grup d'edat



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

GRÀFIC 8. Evolució de les admissions a tractament per droga principal. 2014-2020



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

En general, no s'observen canvis significatius en les admissions a tractament segons droga en aquest període de temps.


Pel que fa a l'alcohol, s'observa una lleugera disminució de la representativitat d'aquest el 2017, quan es va retallar 3,1 punts, fins a situar-se en el 43,1 % del total en el darrer any.

De manera anàloga es pot apreciar una tendència similar en el cànnabis. Aquest disminueix en 4,1 punts el 2017 respecte del 2014, i torna a augmentar de forma similar els darrers anys fins a situar-se el 2020 en un 17,6 %.

Per contra, la representativitat de la cocaïna mostra un increment respecte del 2014.

L'heroïna disminueix des del 2014 i el 2020 se situa en un 8 %.

GRÀFIC 9. Percentatge d'inicis de tractament per substància consumida i sexe



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

Aquest gràfic reflecteix que hi ha un percentatge més alt de dones que han iniciat tractament per alcohol.

De la mateixa manera, el percentatge d'inicis de tractament per cànnabis és superior en dones que no en homes.

Aquest fet podria explicar-se per la connotació social que té el cànnabis entre els seus consumidors. Així doncs, el cànnabis és percebut com una substància «natural» i sense percepció de risc.

TAULA 4. Estadístics descriptius d'edat d'inici en el consum per droga principal


<i>Droga principal</i>	<i>Mitjana</i>	<i>Desviació típica</i>	<i>Mediana</i>	<i>Mínim</i>	<i>Màxim</i>
Opiacis	23	8,9	20	13	78
Cocaïna	20,9	6,5	19	9	54
Cànnabis	16,1	5	15	9	50
Alcohol	20,6	9,7	17	6	62

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

L'edat mitjana d'inici del consum d'opiacis és de 23 anys, amb una mediana de 20 anys ($\pm 8,9$ anys).


S'observa que l'edat mitjana d'inici és molt més baixa en les admissions per cànnabis que per les altres drogues, ja que és de 16 anys. La mediana d'edat d'inici en el consum de cànnabis és de 15 anys (± 5 anys).

GRÀFIC 10. Mitjana d'edat d'inici en el consum per droga principal i sexe



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

GRÀFIC 11. Mitjana d'edat d'admissions a tractament per droga principal



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

4.2 Distribució per província de residència, lloc de residència i procedència de tractament i convivència

La província de residència d'inicis de tractament mostra que el 98,48 % del total dels casos pertanyen a les Illes Balears.

TAULA 5. Distribució d'inicis de tractament per lloc de residència

Lloc de residència	Freq.	%
Casa, pis, apartament	1.596	89,61
Allotjament inestable o precari	70	3,93
Centre penitenciari	70	3,93
Altra institució	37	2,08
Pensió, hostal, hotel	8	0,45
Total	1.781	100 %

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

El 89,6 % dels pacients van respondre a aquesta pregunta que havien viscut a una casa, pis o apartament els trenta dies abans d'iniciar el tractament.

Un 3,9 % va contestar que procedia d'un allotjament inestable o precari, el mateix percentatge dels que manifesten procedir d'una presó o centre de reforma de menors.

Dels pacients que van iniciar el tractament, hi acudeixen en la majoria de les ocasions per iniciativa pròpia, un 37,23 % del total. Un 14,21 % és derivat per un metge d'atenció primària i un 12,30 %, derivats per familiars o amistats. Aquestes tres procedències de derivació suposen un 63,74 % del total de casos.

Per altra part, els derivats des de l'empresa o per l'ocupador representen un 0,22 % del total dels casos, un percentatge similar al que correspon dels serveis d'educació, 0,39 %.

TAULA 6. Distribució d'inicis de tractament per procedència de la derivació.

<i>Procedència</i>	<i>Freq.</i>	<i>%</i>
Iniciativa pròpia	663	37,23
Metge d'atenció primària	253	14,21
Familiars o amistats	219	12,30
Hospital o altres serveis de salut	177	9,94
Serveis legals o policials	141	7,92
Serveis socials	122	6,85
Altres serveis de tractament	109	6,12
Presó, centre de reforma	86	4,83
Serveis d'educació	7	0,39
Empresa o ocupador	4	0,22
Total	1.781	100 %

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

Taula 7. Distribució d'inicis de tractament per convivència els 30 dies previs a l'admissió

Convivència	Frec.	%
Família d'origen	520	29,20
Tot sol	346	19,43
Parella i fills	339	19,03
Amb parella	263	14,77
Amics	113	6,34
Només amb fills	70	3,93
Detingut	66	3,71
Alberg	55	3,09
Altres	6	0,34
Desconegut	3	0,17
Total	1781	100 %

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

Dels pacients d'admissions a tractament, el 29,20 % convivia els 30 dies previs a l'admissió amb la família d'origen. Un 19,43 % vivia tot sol, un percentatge similar als que conviven amb parella i fills. Un 14,77 % convivia amb la parella.

4.3 Distribució per nivell d'estudis i situació laboral

Taula 8. Distribució d'inicis de tractament per nivell d'estudis.

Nivell d'estudis	Freq.	%
Primària completa	690	38,74
ESO	530	29,76
Batxillerat o cicle formatiu de grau mitjà	256	14,37
Primària incompleta	197	11,06
Estudis universitaris	90	5,05
No sap llegir ni escriure	11	0,62
Desconegut	7	0,39
Total	1.781	100 %

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

El 38,74 % dels pacients d'inicis de tractament tenen estudis de primària. El 44,13 % tenen estudis secundaris o cicles formatius. El baix nivell cultural que suposa no haver finalitzat els estudis d'educació primària o no saber llegir ni escriure suposa un 11,68 % del total.

Taula 9. Distribució d'inicis de tractament per situació laboral

<i>Situació Laboral</i>	<i>Freq.</i>	<i>%</i>
Aturat, ha treballat abans	713	40,03
Contracte indefinit o autònom	516	28,97
Contracte temporal	208	11,68
Pensionista i incapacitat permanent	138	7,75
Aturat, no ha treballat abans	126	7,07
Estudiant	58	3,26
Tasques llar	11	0,62
Treballador sense sou per a la família	5	0,28
Desconegut	5	0,28
Altra situació	1	0,06
Total	1781	100 %

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

El 47,11 % del total estava aturat a l'inici de tractament, el 28,97 % tenia contracte indefinit o autònom. Un 11,68 % tenia un contracte temporal. Un 3,26 % del total eren estudiants i un 7,75 % eren pensionistes o tenien una incapacitat permanent.

4.4 Distribució per tractaments previs i via d'administració

Taula 10. Distribució d'inicis de tractament per tractament previ

<i>Tractament previ</i>	<i>Freq.</i>	<i>%</i>
No, mai	855	48,01
Sí, per la mateixa droga	805	45,20
Sí, per la mateixa droga i per una altra de diferent	70	3,93
Sí, per una droga diferent	51	2,86
Total	1.781	100 %

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

El 48,01 % declara no haver fet cap tractament previ. Un 51,99 % declara haver realitzat un tractament previ: un 45,20 % per la mateixa droga, un 2,86 % per una altra droga diferent i un 3,93 % per la mateixa droga i una de diferent.

TAULA 11. Distribució d'inicis de tractament segons substància i tractament previ (%)

Substàncies	Sí, per la mateixa droga	Sí, per a una droga diferent	Sí, per la mateixa droga i una diferent	No, mai
Alcohol	46,02	2,74	3,65	47,59
Cocaïna	43,67	2,49	5,43	48,42
Heroïna	83,92	3,50	3,50	9,09
Cànnabis	28,98	1,91	1,59	67,52
Alcohol + cocaïna	50,00	0,00	4,55	45,45
Heroïna + cocaïna	91,67	0,00	8,33	0,00
Amfetamines i èxtasi	33,33	9,52	4,76	52,38
Hipnòtic i sedant	26,32	10,53	10,53	52,63
Altres opiacis	20,00	10,00	10,00	60,00
Al·lucinògens	11,11	33,33	11,11	44,44
Total (%)	45,20	2,86	3,93	48,01

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

Si analitzam els pacients que han realitzat un tractament previ, s'observa que el 67,52 % dels consumidors de cànnabis és la primera vegada que realitzen un tractament en un centre d'atenció a drogodependències, mentre que el 28,98 % ja havia fet anteriorment un tractament per aquesta substància.

En el cas de l'alcohol, ha estat el primer tractament per al 47,59 % dels pacients i en un 46,02 % ja havien estat tractats en un centre especialitzat per aquest consum.

Els majors percentatges de tractament previ per la mateixa substància els trobam en els inicis per consum d'heroïna: el 83,92 % d'heroïna i un 91,67 % en pacients que consumien heroïna i cocaïna.

Convé destacar el 50 % de pacients que consumien alcohol més cocaïna.

GRÀFIC 12. Inicis de tractament segons substància i tractament previ (%)



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

TAULA 12. Percentatge d'inicis de tractament per via d'administració

<i>Via</i>	<i>Alcohol</i>	<i>Alcohol + cocaïna</i>	<i>Altres opiacis</i>	<i>Al·lucinògens</i>	<i>Amfetamines i èxtasi</i>	<i>Cànnabis</i>	<i>Cocaïna</i>	<i>Heroïna</i>	<i>Heroïna + cocaïna</i>	<i>Hipnòtics i sedants</i>
Oral	100,00 %	0,00 %	70,00 %	33,33 %	42,86 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
Pulmonar o fumada	0,00 %	0,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	99,68 %	10,41 %	62,94 %	41,67 %	0,00 %
Intranasal o esnifada	0,00 %	97,73 %	10,00 %	66,67 %	57,14 %	0,00 %	86,88 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Parental o injectada	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	2,71 %	25,87 %	58,33 %	0,00 %
Altra	0,00 %	0,00 %	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Desconegut	0,00 %	2,27 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,32 %	0,00 %	11,19 %	0,00 %	0,00 %

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020


Quant a la via d'administració de la substància per la qual acudeixen a tractament, destaca que la via més freqüent per al consum d'heroïna era la pulmonar o fumada, amb un 62,94 %, seguida de la via parental o injectada, amb un 25,87 %.

Pel que fa al consum de cocaïna, el 86,88 % van utilitzar la via intranasal o esnifada.

Respecte de les amfetamines i l'èxtasi, el 42,86 % utilitzen la via oral. Un 99,68 % utilitza la via pulmonar o fumada per al cànnabis.

4.5 Altres drogues consumides pels pacients d'admissions a tractament

GRÀFIC 13. Nombre de substàncies consumides pels pacients d'admissions a tractament




Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

Les persones que iniciaren un tractament majoritàriament havien consumit dues substàncies, només un 32,4 % n'havien consumit només una.


El consum de diverses substàncies és usual en les persones que sol·liciten tractament.

GRÀFIC 14. Nombre de substàncies consumides per sexe



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

GRÀFIC 15. Mitjana d'edat per substància consumida



Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

S'observa una disminució del policonsum a mesura que augmenta l'edat mitjana d'admissió a tractament.

4.6 Distribució segons estat serològic de VIH/sida, hepatitis C

Si analitzam els resultats de les serologies del VIH, s'observa que hi ha 397 casos que mai s'han fet un test (VIH).

1.033 casos es van fer el test (menys de 12 mesos i més de 12 mesos); d'aquests, 38 casos (2,13 %) van donar positiu, 993 negatiu (55,76 %) i 2 estaven pendent del resultat (0,11 %).

Els altres 748 casos (42 %) tenen resultat desconegut, bé perquè manifesten que mai s'han fet el test (397: 22,29 %) o bé perquè no saben si se l'han fet (351: 19,71 %).

TAULA 13. Situació del test de VIH. Freqüència i percentatge per sexes

VIH	Home		Dona		Total
Situació	Freq.	%	Freq.	%	Freq.
Mai s'ha realitzat el test	309	23,57	88	18,72	397
Test realitzat fa menys de 12 mesos	342	26,09	149	31,70	491
Test realitzat fa més de 12 mesos	401	30,59	141	30,00	542
Desconegut	259	19,76	92	19,57	351
Total	1.311	100 %	470	100 %	1.781

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

TAULA 14. Serologia VIH. Freqüència i percentatge per sexes

VIH	Home		Dona		Total
Resultat test	Freq.	%	Freq.	%	Freq.
Positiu	29	2,21	9	1,91	38
Negatiu	713	54,39	280	59,57	993
Pendent de resultat	1	0,08	1	0,21	2
Desconegut	568	43,33	180	38,30	748
Total	1.311	100 %	470	100 %	1.781

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

TAULA 15. Situació del test d'hepatitis C. Freqüència i percentatge per sexes

<i>Hepatitis C</i>	<i>Home</i>		<i>Dona</i>		<i>Total</i>
Situació	Freq.	%	Freq.	%	Freq.
Mai se ha realitzat el test	342	26,09	107	22,77	449
Test realitzat fa menys 12 mesos	327	24,94	143	30,43	470
Test realitzat fa més de 12 mesos	355	27,08	122	25,96	477
Desconegut	287	21,89	98	20,85	385
Total	1.311	100 %	470	100 %	1.781

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

Si analitzam els resultats de les serologies d'hepatitis C, hi ha 449 casos que mai s'han fet el test.

TAULA 16. Serologia VHC. Freqüència i percentatge per sexes

<i>Hepatitis C</i>	<i>Home</i>		<i>Dona</i>		<i>Total</i>
Resultat test	Freq.	%	Freq.	%	Freq.
Positiu	64	4,88	18	3,83	82
Negatiu	616	46,99	245	52,13	861
Pendent de resultat	2	0,15	2	0,43	4
Desconegut	629	47,98	205	43,62	834
Total	1.311	100 %	470	100 %	1.781

Font: Indicador d'admissions a tractament, 2020

Dels 947 casos que es van fer el test (menys de 12 mesos i més de 12 mesos), hi ha 82 casos (4,60 %) que van donar positiu, 861 casos (48,34 %) que van ser negatius, 4 pendents del resultat (0,22 %).

449 casos (25,21 %) han manifestat que mai s'han fet el test i 385 (21,62 %) no saben si se l'han fet.

4.6 Compartició de xeringues

Taula 17. Compartició de xeringues pels usuaris que utilitzen la via injectada. Percentatges per sexe

Compartició de xeringues	Home		Dona		Total
Via d'administració (injectada)	Freq.	%	Freq.	%	Freq.
Mai	21	45,65	3	30,00	24
N'ha compartit (però no el darrer any)	20	43,48	5	50,00	25
N'ha compartit el darrer any	1	2,17	1	10,00	2
N'ha compartit al darrer mes	3	6,52	1	10,00	4
Desconegut	1	2,17	0	0,00	1
total	46	100 %	10	100 %	56

56 persones utilitzen la via injectada per administrar-se la droga objecte de tractament: 12 casos que tenien com a droga principal la cocaïna, 37 casos d'heroïna i 7 casos heroïna i cocaïna (*rebujito* o *speedball*).

Un 42,86 % (24 persones) mai han compartit xeringues. Un 44,64 % (25 persones) n'han compartit però no el darrer any. Un 10,71 % (6 casos) n'han compartit el darrer any (2) i el darrer mes (4).

TAULA 18. Compartició de xeringues. Percentatges de l'estat serològic (VIH)

Estat serològic VIH (%)	Positiu	Negatiu	Total
Mai n'ha compartit	2,69	41,98	44,67
Ha compartit alguna vegada a la vida (però no el darrer any)	19,28	31,54	50,82
Ha compartit al darrer any (però no el darrer mes)	0,00	1,82	1,82
Ha compartit al darrer mes	0,00	2,69	2,69
Total	21,97	78,03	100,00

En la taula següent s'analitzen els casos que han compartit xeringues amb el resultat del test de VIH. La mostra és de 123 persones (100 %).

Hi ha un 2,69 % (4 casos) de persones que mai han compartit xeringues i ha donat positiu al test del VIH, per tant el fet de compartir xeringues no ha estat la causa de contagi.

Dels que han compartit xeringues alguna vegada a la vida, però no el darrer any, hi han donat positiu un **19,28 %** (23 casos).

Els que han compartit xeringues el darrer any, però no el darrer mes, i els que ho han fet el darrer mes, han obtingut resultat negatiu de VIH.

Per tant, 27 casos (21,97 %) han donat resultat positiu en el test. Els altres 96 casos (78,03 %) han obtingut resultat negatiu.

4.7 Perfil d'admesos a tractament 2020

El 73,6 % dels usuaris que accedeix a tractament per addicció són homes i un 26,4 % són dones.

L'edat mitjana d'inici de consum per a totes les drogues ha estat de 20,23 anys d'edat, amb un mínim d'edat de 6 anys i un màxim de 78 anys.

Encara que cada substància, com s'ha vist a la taula 4, tenen uns estadístics descriptius característics. No és el mateix l'edat d'inici de consum per cànnabis que per cocaïna, per exemple.

L'edat mitjana d'admissió a tractament per a totes les drogues ha estat de 39,4 anys d'edat.

Un 89,61 % de les admissions a tractament habitaven trenta dies abans de l'admissió a una casa, pis o apartament.

Les procedències majoritàries que donen informació de com arriben els usuaris a tractament són: per iniciativa pròpia (37,23 %) per derivació del metge d'atenció primària (14,21 %) i per recomanacions de família i amics (12,30 %).

Un 37,23 % ha iniciat tractament per iniciativa pròpia, un 14,21 % han estat derivats pel metge d'atenció primària i un 12,30 % per familiars i amics.

Un 38,7 % que accedeix a tractament, té un nivell d'estudis fins a educació primària.

Un 40,03 % estava aturat (havent treballat abans) en el moment de l'admissió a tractament.

Quant a la convivència, el 29,20 % vivia amb la família d'origen, i un 19,43 % tot sol o sola. Un percentatge similar (19,03 %) convivia amb parella i fills.

De la població que accedeix a tractament per addicció, un 52 % havia realitzat un tractament previ.

El motiu principal de l'admissió a tractament és per consum d'alcohol, el qual representa un 43,07 % del total d'admissions per drogues.