

## *Anas angustirostris* (Mentries, 1832)

Nom comú: *Roseta*

Classe: **Aves**

Ordre: **Anseriformes**

Família: **Anatidae**

### **BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ**

La rosseta és una anàtida, família d'aus aquàtiques molt extensa i àmpliament distribuïda per tot el món. Es troba dintre del grup d'ànecs de superfície, que es caracteritzen per obtenir el menjar en la zona superficial de l'aigua, la qual cosa els diferencia dels ànecs cabussadors. L'àrea de distribució d'aquesta espècie es troba molt fragmentada a la regió mediterrània, Àfrica occidental i Àsia central i sud occidental, arribant fins a l'extrem oest de la Xina. Les rossetes realitzen moviments dispersius i parcialment migratoris entre zones de reproducció i cap a zones d'hivernada més meridionals. Es sap que existeix connexió entre la població espanyola i la nord africana. Ocupa zones humides d'aigües dolces o salabroses amb abundant vegetació i és molt exigent en quant a la qualitat de l'hàbitat. S'alimenta de vegetals i invertebrats.

La població mundial es va estimar en unes 20.000 parelles reproductores, de les quals 2.500 es trobaven al paleàrtic occidental. Una població residual es troba al sud i sud-est d'Espanya i una altra mica més gran, però en forta disminució, al Marroc, Algèria i Tunísia. L'espècie va patir a Espanya una recessió poblacional molt important entre els anys 1950 i 1990, recuperant-se lleugerament en anys posteriors. La població espanyola actual és molt petita i localitzada en uns pocs aiguamolls del sud i sud-est i llevant, amb nuclis menors a la Mancha, Múrcia, Fuerteventura i Mallorca. La dessecació o degradació de zones humides i la pressió cinegètica són les causes històriques de la seva rarefacció. L'actual protecció d'espais naturals i la protecció específica de que gaudeix l'espècie són claus per a la seva recuperació.

A les Balears, la rosseta és estival rara a Mallorca, migrant rar a Mallorca i Menorca i accidental a les Pitiüses. Una petita població va començar a criar a s'Albufera de Mallorca el 1997, on nidifiquen una o dues parelles des d'aquell any. Una colla va criar al Salobrar de Campos el 1967. A partir de 2002 s'observa amb més freqüència, amb els següents màxims d'exemplars: 21 el març de 2004, 20 el febrer de 2003 i 16 l'octubre de 2005.

---

**Autor text: Muntaner, J. (Servei de Protecció d'Espècies)**

Corologia: **Canàries i Mediterrània occidental**

Tendència: **Regressió**

Nivell d'amenaça: **En perill crític**

Categoria de protecció: **En perill d'extinció (RD 139/2011)**