

*Convolvulus valentinus subsp. suffruticosus* ((Desfontaines)  
Maire, 1934)

Nom comú: *Corretjola blava*

Classe: **Magnoliopsida**      Ordre: **Convolvulales**      Família: **Convolvulaceae**

### **BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ**

És una corretjola perenne, de fins a 50 cm, amb les tiges primes, ajagudes. Les fulles són alternes, peciolades, piloses, amb el marge enter i forma linear. Les flors són de color cel, hermafrodites, en forma d'embut, d'uns 3 cm d'amplada. El fruit és una càpsula, amb 1-4 llavors. Viu en talussos àrids, arenosos o una mica pedregosos, prop de la mar.

És una espècie microareal de distribució mediterrània-sudoccidental, és present al llevant de la Península Ibèrica (*C. valentinus subsp. valentinus*), al nord d'Àfrica, a Mallorca i a Eivissa (*C. valentinus subsp. suffruticosus*), si bé a Eivissa no s'ha retrobada des de la citació de 1976, feta per Heinrich Kuhbier i Günter Finschow, a l'illot de S'Espartar.

L'única població actual de Balears es localitza als talussos de la Marina de Lluçmajor (sud de Mallorca), en una població d'uns 180 individus (50% de reproductius), segons un cens fet l'any 2001.

La seva biologia és poc coneguda, floreix entre els mesos d'abril i juny i la seva pol·linització és estrictament entomòfila. L'absència d'autopol·linització explica l'escàs nombre de fruits, i de llavors per fruit, que es desenvolupen.

L'espècie no figura a cap catàleg de protecció d'espècies, si bé se l'ha qualificada en perill crític als llibres vermells de la flora balear i de l'espanyola, en base als criteris de mida de població petita i de suposat declivi.

Pareix que entre el 1997 i 2001 s'ha incrementat el nombre d'individus censats, si bé és possible que la metodologia del primer recompte realitzat no fos tan rigorosa com la del segon. Per tant, la tendència és desconeguda en tant no es realitzin ulteriors estudis. La població es localitza en una zona prop d'un antic camí de pescadors, per tant és una zona relativament transitada. No s'han trobat noves poblacions en zones properes de característiques semblants. Tot i que la zona on es localitza la població gaudeix de protecció a nivell de LIC, seria convenient incloure el tàxon en algun llistat més estricte

---

**Autor text: Gil, Ll. (Universitat de les Illes Balears)**

Corologia: **Mediterrània sudoccidental**

Tendència: **Dades insuficients**

Nivell d'amenaça: **En perill crític (segons el Llibre Vermell)**

Categoria de protecció: **No catalogat**