

Emberiza schoeniclus ssp. witherbyi (Byers, Olsson & Curson, 1995)

Nom comú: Hortolà de canyet

Classe: **Aves**

Ordre: **Passeriformes**

Família: **Emberizidae**

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ

L'hortolà de canyet és una espècie d'àmplia distribució per tot el Paleàrtic. A Balears, la població hivernant procedent del centre i nord Europa es pot considerar abundant i ben distribuïda per totes les illes majors, gairebé sempre a zones humides o camps de cultiu amb síquies o torrents de certa entitat.

No obstant això, aquesta espècie, de mida similar a un teulader, presenta durant la primavera una subespècie sedentària pròpia de petites àrees de la Mediterrània (zones humides amb canyet del centre i est de la Península Ibèrica, sud-est de França i Illes Balears). Aquesta subespècie, *Emberiza schoeniclus witherbyi* (en honor al naturalista que la va descriure) és de bec més gruixut i de colors més foscs que els seus congèneres europeus.

S'alimenta principalment de larves de papallones durant la primavera i llavors durant l'hivern (encara que s'han observat exemplars capturant insectes en vol en ambdues èpoques). Inicia la reproducció a principis d'abril, col·locant el niu entre el canyet i la cesquera a no més de 1,5 metres d'altura, arribant algunes parelles a realitzar segones postes.

No obstant això, es desconeix gairebé tota la biologia i ecologia d'aquesta subespècie, realitzant-se actualment diversos estudis de camp encaminats a conèixer les raons del fort declivi de l'espècie en els últims 20 anys, que es xifra entorn al 85% dels seus efectius (l'estima era de 250-1000 parelles nidificants l'any 1990, 400 el 1992 i 250 el 2000). La regressió és evident.

A Balears, únicament cria en les zones de canyet del Parc Natural de S'Albufera de Mallorca, on es realitza un seguiment exhaustiu de les parelles reproductores xifrades en no més de 20-35 parelles segons els censos realitzats entre els anys 2007 i 2009.

En el Catàleg Balear es classifica com a Vulnerable mentre que a l'estatal figura com En perill d'extinció. En Llibre Vermell dels Vertebrats de Balears apareix com En perill crític.

Autor text: Martínez, J. L. (GOB Mallorca)

Corologia: **Península Ibèrica, sud de França i Illes Balears**

Tendència: **Regressió**

Nivell d'amenaça: **En perill crític (segons el Llibre vermell)**

Categoria de protecció: **En perill d'extinció (RD 139/2011) i Vulnerable (BOIB 66, 15/05/2008)**