

*Gymnadenia conopsea* ((Linnaeus) Robert Browne 1813)

Nom comú: *Caputxina olorosa*

Classe: **Liliopsida**      Ordre: **Orchidales**      Família: **Orchidaceae**

### **BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ**

Aquesta és una orquídia que té una distribució Euro-siberiana fins a la Xina. A Mallorca viu a uns pocs prats humits i fonts de la serra de Tramuntana, entre els 600 i els 1.450 m.

Les primeres cites de la caputxina olorosa són del Dr. Paul Marès a 1865.

És una planta vivaç. Fulles basals reduïdes a 2-3 beines. Té dues bràctees verdes, trinervades, més llargues que l'ovari; amb tija de 15 fins a 40 cm. La inflorescència, de 3-16 cm, és densa, cilíndrica i prima, de flors petites, oloroses, de color blanc a rosades, amb l'esperó arquejat, filiforme d'11-18 mm, més llarg que l'ovari. Els segments externs del periant són corbats i formen un casc. El label és ròmbic de 2-3'5 x 6 mm més ample que llarg, trilobat amb lòbuls arrodonits.

La floració es produeix a finals de maig fins a mitjans de juny.

Està inclosa dins de la categoria de Vulnerable al Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears.

Els principals perills d'aquesta escassa orquídia són l'abundància de cabres i la crema de pastures a les cotes més altes. La construcció d'una pista forestal damunt l'antic camí de nevaters de Comafreda va afectar molt greument aquesta espècie i altres que vivien als voltants del camí.

---

**Autor text: Alomar, G. i Hoffmann, V.**

Corologia: **Europa i Àsia**

Tendència: **Regressió (segons els autors)**

Nivell d'amenaça: **Vulnerable (segons el Llibre Vermell)**

Categoria de protecció: **Vulnerable (Decret 75/2005)**