

*Hyla meridionalis* (Böettger, 1874)

Nom comú: *Granota (a Menorca). Reineta meridional*

Classe: **Amfibia**

Ordre: **Anura**

Família: **Hylidae**

### **BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ**

La granota és un amfibi petit d'uns 4-5 cm i d'aspecte gràcil. Presenta unes llargues extremitats posteriors que li permeten realitzar grans salts quan es troba a l'ambient terrestre i amagar-se ràpidament al fons quan es troba a l'aigua. En l'aspecte anatòmic el que més destaca, però, és l'eixamplament dels extrems dels dits, els quals actuen com a ventoses. Mentre el ventre es blanc, el color dorsal és en general d'un verd clar prou vistós, encara que alguns exemplars poden tenir-ne d'altres: to verd fosc, marró, gris, etc. En tot cas, és un animal difícil de trobar pels depredadors (mostels, agrons, serps, mussols, etc.) i també per les seves preses, els insectes, als quals espera pacientment fins que els té a l'abast.

Viu la major part del temps a les zones altes de la vegetació on passa desapercebuda, però aquesta discreció es transforma en descarada activitat a l'època de reproducció. Als mesos de març-abril els mascles arriben als llocs de cria, com basses, torrents, safarejos o altres punts d'aigua adequats. Aquí començaran a atreure a les femelles emetent el seu cant característic, sorprenentment potent venint d'un animal tan petit, i que emeten gràcies a un gros sac vocal. Un cor important de granotes es pot arribar a sentir des de dos o tres km.

Es distribueix pel sud de França, nord-est d'Itàlia, part de la Península Ibèrica (exceptuant el centre i el nord-oest) i el nord-oest africà. A les Balears està present a Menorca, on va arribar de la mà de l'home ja d'antic, i és abundant i present a qualsevol biòtop, sempre i quan hi hagi punts d'aigua pròxims adequats per al desenvolupament dels cabots. Aquests necessiten uns tres mesos per completar la metamorfosi i abandonar l'aigua. Hi ha indicis de què hi podria haver una població consolidada als Jardins d'Alfàbia (Mallorca).

No se la considera amenaçada tècnicament, però essent un animal que depèn totalment de les zones humides per a criar, està sotmès a les amenaces que recauen sobre aquests fràgils hàbitats, com dessecacions incontrolades, urbanitzacions, o l'ús de pesticides.

---

**Autor text: Carrera-Bonet, D. i Pons Sabater, P.**

Corologia: **Oest d'Europa i nord d'Àfrica**

Tendència: **Estable**

Nivell d'amenaça: **Preocupació menor** (segons Llibre Vermell)

Categoria de protecció: **Llistat d'Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (RD 139/2011)**