

Puffinus mauretanicus (Lowe, 1921)

Nom comú: *Virots petit*

Classe: **Aves**

Ordre: **Procellariiformes**

Família: **Procellariidae**

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ

El virot petit és una au marina d'un gènere constituït per 14 espècies, pròximament emparentades. L'espècie *mauretanicus* és endèmica de les Balears, i se separa del virot de llevant, *Puffinus yelkouan*, per diferències morfològiques i genètiques. La recent descoberta de virots assimilables a la forma oriental, nidificants a Menorca ha reobert la qüestió de la separació específica, que no es pot donar com a definitivament resolta.

El virot petit nidifica a illots i penya-segats, sempre dins escletxes i coves. La posta té lloc en el mes de març i és d'un sol ou. És una espècie ictiòfaga, parcialment adaptada a aprofitar el rebuig de les barques de pesca. Té una gran mobilitat: durant l'època de cria arriba fins a les costes continentals properes (Delta de l'Ebre, Castelló, Algèria, etc.), a la recerca d'aliment. Durant els mesos de juliol a setembre, la major part abandonen la Mediterrània i se n'observen esbarts importants des de les rieres gallegues fins a les costes de Bretanya i el Canal de la Mànega. Algunes migren cap a l'Atlàntic tropical.

Els efectius calculats en els darrers recomptes (any 2004) estan entorn de 2.225 parelles reproductores (225 a Menorca, 800 a Mallorca i Cabrera i 1.200 a les Pitiüses) i una població total d'aproximadament 10.000 aus. L'espècie s'ha beneficiat d'un projecte LIFE de la UE, i segueix essent objecte d'un pla de recuperació.

Els principals problemes de conservació de l'espècie són les rates (que disminueixen considerablement la productivitat) i els carnívors introduïts (els moixos, fonamentalment). Avui, els seus hàbitats de cria estan protegits, emparats sota la figura de ZEPA i inclosos, per tant, a Natura 2000. També és afectada per la contaminació marina (hidrocarburs) i probablement per la captura accidental amb arts de pesca, tot i que aquest factor sembla ser poc important en aigües balears (però pot ser present a la zona de distribució postnupcial, o en àrees d'alimentació). Està tècnicament i oficialment qualificada En perill.

Autor text: Mayol, J. (Servei de Protecció d'Espècies) i SKUA SL.

Corologia: **Illes Balears**

Tendència: **Regressió**

Nivell d'amenaça: **En perill crític (segons el Llibre Vermell)**

Categoria de protecció: **En perill d'extinció (RD 139/2011)**