

Els dies 18 i 20 de juny, dins el seguiment anual de les parelles reproductores de *Pandion haliaetus*, Àguila Peixetera, que duu a terme la Conselleria de Medi Ambient, s'han marcat 4 polls amb anelles metàl·liques i plàstiques de color.

La població balear de l'Àguila Peixetera és de 15-16 parelles (2002) distribuïdes entre Mallorca, Menorca i Cabrera (a Eivissa i Formentera s'extingeix com a reproductor als anys 70)

Aquesta singular espècie nidifica a penya-segats marins i requereix d'un hàbitat poc humanitzat i tranquil durant la reproducció. La posta és de 1 a 3 ous amb una incubació de 37 dies. Els polls necessiten 53 dies per fer el primer vol.

Personal especialitzat de la Conselleria ha accedit a dos nius, un localitzat a la costa nord de Mallorca i l'altre a la illa Gran de Cabrera. Els nius tenien 2 polls d'unes 5 setmanes, el de Mallorca la posta es va produir el 26 de març i el naixement dels polls el 3 de maig i el niu de Cabrera, un poc més tardà, la posta el dia 1 d'abril i el naixement el 9 de maig. Se'ls va marcar amb una anella metàl·lica del Ministeri de Medi Ambient a la cama dreta i una de color blau amb codi alfa-numèric a l'esquerra (A2, A3, H2 i H3), es van prendre mesures biomètriques i es tragué una mostra de sang per poder determinar el sexe.

L'objectiu de les anelles plàstiques és la facilitat de poder-les llegir a distància i obtenir informació dels exemplars individualitzats. Si no es pot llegir el codi, simplement el color ja ens aporta informació de l'edat de l'individu (cada any es canvia el color de l'anella) L'Àguila Peixetera sol utilitzar posadors visibles a zones humides com el Salobrar de Campos, s'Albufera de Muro o s'Albufereta, així com penyals del litoral marí, llocs on es poden fer lectures amb facilitat.

Tenir els exemplars individualitzats ens aportarà nova informació de la seva biologia, de la seva dinàmica poblacional (dispersió juvenil, intercanvi entre illes, nivell de reclutament de joves...) i dels perills que afecten a aquesta espècie protegida. És un projecte a llarg termini que requereix un seguiment i evolució dels individus marcats i de l'espècie en general.

fotos: jaume bonnin





