

Vicia bifoliolata (Rodríguez, 1878)

Classe: **Magnoliopsida**

Ordre: **Fabales**

Família: **Fabaceae**

BIOLOGIA DE LA CONSERVACIÓ

Planta anual enfiladissa amb cicle de creixement hivernal. Està formada per una tija principal, molt prima, poc ramificada i sempre a la part superior. Les fulles estan formades per un sol parell de folíols linears, de color verd fosc, i al mig un circell amb el qual la planta s'enfila per la vegetació que l'envolta. Les flors són petites, de color blavós i estan disposades en inflorescències pedunculades d'una o dues flors a l'axil·la de les fulles. La floració es produeix ben entrada la primavera i es pot allargar fins a començaments d'estiu.

Aquest endemisme menorquí només es coneix actualment de l'extrem oriental de l'illa. Per la seva morfologia i ecologia és de difícil observació, i possiblement aquesta va ser la causa perquè durant uns anys es considerés com a desaparegut. Creix en els marges de zones humides o de les marines de prop del litoral, quasi sempre associada a *Cistus monspeliensis* per la que s'enfila, més rarament ho fa en altres plantes com els joncs.

En el Llibre Vermell de la Flora Vascular de les Illes Balears està classificat com "en perill" segons els criteris UICN (2001), en canvi en el pla de gestió elaborat en el marc del projecte LIFE "Conservació d'àrees amb flora amenaçada a l'illa de Menorca" es proposa una revisió amb la classificació de En perill crític. Legalment està protegida pel Catàleg Espanyol d'Espècies Amenacades, el Conveni de Berna i la Directiva Hàbitats. A més, en aquest darrer instrument legal, està considerat com a espècie prioritària per a la conservació del seu hàbitat.

Les principals amenaces que afecten aquesta espècie són els canvis en els usos del sòl, la presència d'espècies competidores com *Carpobrotus*, la sobrefreqüentació humana o la depredació per la fauna. S'ha de destacar que les poblacions més importants conegudes actualment es troben totes en una zona on la pressió antròpica, especialment durant l'estiu, és elevada. Per altra banda aquesta espècie mostra anualment fluctuacions molt importants en el nombre d'individus.

Autor text: Fraga, P. (Institut Menorquí d'Estudis)

Corologia: **Menorca**

Tendència: **Regressió**

Nivell d'amenaça: **En perill crític (segons el Llibre Vermell)**

Categoria de protecció: **Vulnerable (RD 139/2011)**