



INFORME DE LA REPRODUCCIÓ DEL VOLTOR LLEONAT, ANY 2012

Introducció.

Un grup molt nombrós de voltors lleonats varen arribar a les quatre illes Balears entre el 31 d'octubre i l'1 de novembre de 2008 transportats des del sud-est de la península Ibèrica per una forta tempesta de vent. Un grup important ses va quedar a Mallorca, ocupant, principalment, la serra de Tramuntana. Durant la tardor de 2010 aquesta població va ser censada en un cens organitzat per aquesta Conselleria, obtenint-se una xifra d'uns cinquanta exemplars. El voltor lleonat havia estat citat en algunes ocasions a Mallorca i a Eivissa, però mai a Menorca, a on varen arribar fins a seixanta exemplars que varen desaparèixer el 12 de novembre.

Realització del seguiment de la reproducció.

Degut a que aquests voltors s'havien establert a la serra de Tramuntana, amb diferents observacions puntuals per altres punts de Mallorca, era de suposar que en qualsevol moment començarien a reproduir-se. L'any 2012 els agents de Medi Ambient de l'Unitat de Flora i Fauna varen realitzar un seguiment d'aquesta espècies. Es varen veure clars indicis de reproducció a un penya-segat de Mossa i una àmplia zona de penya-segats del Puig Roig d'Escorca, a les finques de Can Pontico i Cosconar. Tots aquest penya-segats estan orientats a migjorn. El 12 de març es localitzaren i fotografiaren les primeres colles covant, trobant-se una altra colla a un penya-segat situat a la finca de Mossa. El 28 de març, fent un seguiment de reproducció de voltor negre a la zona dels Corralles d'en Figuera, es va localitzar a un exemplar aïllat covant a un penya-segat marí a la finca de Femenies. Posteriorment, durant el mes de juny, al penya-segat de Mossa a on ja s'havia trobat una parella que tenia un poll, es va localitzar a altres dues colles instal·lades, però que semblava no es reproduïen.

En total s'han localitzat 4 colles covant al Puig Roig. Posteriorment, el 18 de juny es fa un control al Puig Roig i s'observa que una de les colles que covava, la situada més cap a l'est, havia abandonat la reproducció i les altres 3 tenien polls el. El 30 de maig s'observà que la colla que covava a Mossa tenia un poll i es pogué localitzar una altra colla amb poll bastant a prop de la primera. El dia 21 de juny es va realitzar un darrer control del niu dels corralles d'en Figuera comprovant-se que el poll del niu que s'havia localitzat estava bastant crescut.

Per tant, han nascut un mínim de 6 polls: 3 als penya-segats del Puig Roig, 2 al de Mossa 1 al dels Corralles d'en Figuera.

Amés, al Puig Roig es localitzen nombrosos llocs ocupats per voltors lleonats a on han pogut haver-hi colles intentant la reproducció així com plataformes i coves amb



abundats excrements que poden ser llocs de concentració o de colgada. Per altre banda, a Mallorca existeixen una gran quantitat de penya-segats, tant interiors com marins, òptims per la reproducció d'aquest voltor per la qual cosa no es pot descartar que hagin més parelles reproductores i que hagi pogut néixer algun poll més. Malgrat que s'han revisat nombrosos penya-segats interiors i qualque de marí i que s'ha demanat informació a pagesos, caçadors i ornitòlegs locals, no s'ha rebut cap altre notícia de voltors establerts a la serra de Tramuntana.

Possiblement el número de colles reproductores augmentarà el proper any, la qual cosa es pot deduir de l'activitat observada tant al Puig Roig com a Mossa i del fet de que, per l'informació de que es disposa, el contingent que va arribar a Mallorca estava format, principalment, per juvenils i sub adults que, ja estaran en condicions d'iniciar la reproducció.



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Secretaria General
Servei d'Agents de Medi Ambient



Penya-segats de Mossa (Escorca) fotografiats des de l'entrada a la finca a la carretera de Pollença a LLuc. Els cercles blancs indiquen situació de les dues colles que han tret poll i el quadrat l'ubicació d'una altra colla que no s'ha reproduït.




Dues imatges del niu més a l'est de Mossa (Escorca) fotografiats des del camí poc abans d'arribar a les cases. Foto Miquel Àngel Reus.



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Secretaria General
Servei d'Agents de Medi Ambient



Situació del niu més a l'est de Mossa (Escorca) fotografiat des del camí poc abans d'arribar a les cases.
Foto Miquel Àngel Reus (Esquerra) i Juan Carlos Malmierca (dreta)





**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Secretaria General
Servei d'Agents de Medi Ambient



Panoràmica del Puig Roig (Escorca) a on s'ha vist la major activitat reproductiva dels voltors lleonats el 2012.



Tres imatges consecutives, d'esquerra a dreta, del Puig Roig amb nius ocupats que han tret poll (cercles blancs), que han fracassat (triangle) o punts ocupats per colles o exemplars sense reproduir-se.(quadrats).




**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Secretaria General
Servei d'Agents de Medi Ambient



Panoràmica del Puig Roig (Escorca) a on s'ha vist la major activitat reproductiva dels voltors lleonats el 2012.




Quarta i quinta imatge consecutiva, d'esquerra a dreta, del Puig Roig amb nius ocupats que han tret poll (cercles blancs), que han fracassat (triangle) o punts ocupats per colles o exemplars sense reproduir-se (cuadrats).



**Govern
de les Illes Balears**

Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori
Secretaria General
Servei d'Agents de Medi Ambient



Vista general del penya-segat al nord-est dels Corral·ls d'en Figuera a on s'ha marcat l'ubicació del niu de voltor lleonat que ha tingut èxit el 2012, vista de detall del lloc a on es troba i fotografia de l'adult covant feta el 28 de març del 2012 per Juan Carlos Malmierca.