



## Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut  
Direcció General de Salut Pública  
i Participació

### Recomanacions de vacunació davant de varicel·la en grups de risc

Ponència de Programes i Registre de Vacunacions. març 2015

**Es recomana la vacunació enfront de varicel·la a les persones susceptibles a partir de 12 mesos (9 mesos d'edat sota circumstàncies especials) que figuren en els següents grups de població:**

#### 1. Persones susceptibles amb les següents immunodeficiències:

##### 1.1. Inmundeficiències primàries:

Agammaglobulinèmia lligada al sexe i immunodeficiència variable comuna (en ambdues patologies sempre que no es trobin en tractament regular de reemplaçament amb immunoglobulines), déficit aïllat d'IgA i hiper IgM aïllat, déficit aïllat de subclasses d'IgG, trastorns de la fagocitosi, trastorns del complement i de neutròfils (excepte trastorns de l'adhesió leucocitària i malaltia de Chediak-Higashi).

##### 1.2. Immunodeficiències secundàries:

- Els nens amb infecció per VIH han de rebre la vacuna sempre que tenguin percentatges de limfòcits T CD4 ≥15%, igual que els majors de 8 anys amb recompte de limfòcits T CD4 ≥200 cèl·lules / ml. En tots dos casos s'han incloure per a la vacunació dels que estiguin en tractament amb teràpia antiretroviral antiretroviral altament activa -HAART-.
- Persones susceptibles amb antecedent de leucèmia limfoblàstica aguda (LLA) en teràpia de manteniment (s'ha de suprimir aquesta una setmana abans i una altra després de la vacunació) o amb tumors sòlids que han completat tractament amb quimioteràpia (s'ha de vacunar 3 mesos després d'haver completat el tractament).
- Persones que reben tractaments que poden induir immunosupressió, inclosa la teràpia oral o parenteral amb corticoides a altes dosis.
- S'ha de considerar el moment més apropiat per a la vacunació en funció del tipus de tractament, la dosificació i la durada de la teràpia i l'edat. Tot i que els intervals són variables, en general s'haurà de suprimir la teràpia de manteniment almenys dues setmanes abans i dues després de la vacunació. Quan les dosis de corticoides siguin elevades, s'hauran de retirar 4 setmanes abans de la vacunació i reprendre'ls a les 2 setmanes.
- Els pacients sotmesos a radioteràpia normalment no s'haurien de vacunar durant la fase de tractament.
- A les persones en tractament amb agents biològics l'interval entre cessament del mateix i la vacunació ha de ser almenys de 3 mesos.
- Pacients en espera de trasplantament d'òrgan (p.e. trasplantament renal). S'han de vacunar almenys 4-6 setmanes abans de l'administració del tractament immunsupressor.

#### 2. Persones susceptibles no immunodeprimides amb malalties cròniques, entre les quals s'inclouen les següents:

- Mucoviscidosi o fibrosi quística.
- Malaltia cutània disseminada greu.

#### 3. Persones susceptibles incloses en els següents grups:

- Contactes estrets de pacients d'alt risc en els quals la vacuna està contraindicada o d'embarassades susceptibles.
- Menors de 18 anys en tractament crònic amb àcid acetilsalicílic.
- Dones en edat fèrtil
- Ocupació laboral: Personal sanitari (assistencial i de laboratori) i personal d'educació infantil.

Document complet:

<http://vacunes.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1311130843011632458172&lang=CA&cont=78938>



## Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut  
Direcció General de Salut Pública  
i Participació

### Recomendaciones de vacunación frente a varicela en grupos de riesgo

*Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Marzo 2015*

**Se recomienda la vacunación frente a varicela a las personas susceptibles a partir de 12 meses (9 meses de edad bajo circunstancias especiales) que figuran en los siguientes grupos de población:**

**1. Personas susceptibles con las siguientes inmunodeficiencias:**

**1.1. Inmundeficiencias primarias:**

Agammaglobulinemia ligada al sexo e inmunodeficiencia variable común (en ambas patologías siempre que no se encuentren en tratamiento regular de reemplazo con inmunoglobulinas), déficit aislado de IgA e hiper IgM aislado, déficit aislado de subclases de IgG, trastornos de la fagocitosis, trastornos del complemento y de neutrófilos (excepto trastornos de la adhesión leucocitaria y enfermedad de Chediak-Higashi).

**1.2. Inmunodeficiencias secundarias:**

- Los niños con infección por VIH recibirán la vacuna siempre que tengan porcentajes de linfocitos T CD4 ≥15%, al igual que los mayores de 8 años con recuento de linfocitos T CD4 ≥200 células/µl. En ambos casos se incluirán para la vacunación los que estén en tratamiento con terapia antiretroviral antirretroviral altamente activa –HAART–.
- Personas susceptibles con antecedente de leucemia linfoblástica aguda (LLA) en terapia de mantenimiento (se suprimirá ésta una semana antes y otra después de la vacunación) o con tumores sólidos que han completado tratamiento con quimioterapia (se vacunará 3 meses después de haber completado el tratamiento).
- Personas que reciben tratamientos que pueden inducir inmunosupresión, incluida la terapia oral o parenteral con corticoides a altas dosis.
- Se debe considerar el momento más apropiado para la vacunación en función del tipo de tratamiento, la dosificación y la duración de la terapia y la edad. Aunque los intervalos son variables, en general deberá suprimirse la terapia de mantenimiento al menos dos semanas antes y otras dos después de la vacunación. Cuando las dosis de corticoides sean elevadas, se deberán retirar 4 semanas antes de la vacunación y reanudarlos a las 2 semanas.
- Los pacientes sometidos a radioterapia normalmente no deberían vacunarse durante la fase de tratamiento.
- En las personas en tratamiento con agentes biológicos el intervalo entre cese del mismo y la vacunación será al menos de 3 meses.
- Pacientes en espera de trasplante de órgano (p.e. trasplante renal). Se vacunará al menos 4-6 semanas antes de la administración del tratamiento inmunosupresor.

**2. Personas susceptibles no inmunodeprimidas con enfermedades crónicas, entre las que se incluyen las siguientes:**

- Mucoviscidosis o fibrosis quística.
- Enfermedad cutánea diseminada grave.

**3. Personas susceptibles incluidas en los siguientes grupos:**

- Contactos estrechos de pacientes de alto riesgo en los que la vacuna está contraindicada o de embarazadas susceptibles.
- Menores de 18 años en tratamiento crónico con ácido acetil salicílico.
- Mujeres en edad fértil
- Ocupación laboral: Personal sanitario (asistencial y de laboratorio) y personal de educación infantil.

Document complet:

<http://vacunes.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?mkey=M1311130843011632458172&lang=CA&cont=78938>