

Calendari d'aplicació a infants nascuts abans de juliol 2016. Darrera revisió gener 2018

PAUTES DE VACUNACIÓ ADAPTADES PER A INFANTS NO VACUNATS O AMB VACUNACIÓ INCOMPLETA

A. Indicacions generals

- No s'han de reiniciar els calendaris, sinó que s'han de comptar totes les dosis rebudes. Hi ha algunes excepcions en les quals NO COMPTEN les dosis:
 - Triple vírica i varicel·la administrades abans de l'edat de 12 mesos.
 - Hepatitis B administrades en néixer a infants prematurs o de baix pes.
 - Vacunes administrades abans del temps mínim indicat des de la dosi anterior.
- S'ha d'intentar accelerar l'administració de les vacunes, escurçant els intervals al mínim.
- S'ha d'intentar administrar el màxim d'antígens possibles en cada visita.

Vacunes utilitzades en el calendari oficial de vacunació sistemàtica infantil										
Diftèria, tètan i tos ferina acel·lular (DTPa)										
Diftèria de baixa càrrega antigènica, tètan i tos ferina acel·lular (dTpa)										
Diftèria de baixa càrrega antigènica i tètan (dT)										
Poliomielitis inactivada (PI)										
<i>Haemophilus influenzae</i> tipus b (Hib)										
Hepatitis B pediàtrica (HB)										
Hexavalent (DTPa+PI+Hib+HB)										
Pentavalent (DTPa+PI+Hib)										
Xarampió, rubèola i parotiditis (XRP)										
Meningitis C (MC)										
Varicel·la (V)										
Virus del papil·loma humà (VPH)										
Antipneumocòccica 13v (PnC13)										
Dosis mínimes per considerar que una vacunació és correcta										
EDAT	XRP	HB	PI	dT	Tos fer	Hib	MC	V	VPH	PnC13
≤ 2 anys	1	3	4	4	4	1 - 4 ¹	1 - 2 ¹	1 ⁴	-	2-3 ²
3 - 6 anys	2	3	4	4 - 5 ³	4 - 5	1	1	2 ⁴	-	1
7 - 11 anys	2	3	3	3	-	-	1 ⁵	-	-	-
12-14 anys	2	3	3	3	-	-	1	2 ⁶	2 ^{7,8}	-

(1) Almenys 1 dosi administrada a partir de 12 mesos d'edat.

(2) La vacuna està finançada per a infants nascuts a partir de gener de 2016 i per a infants fins a 14 anys amb factors de risc.

(3) Si la 4a dosi de DTPa s'administra després de l'edat de 4 anys, no fa falta una 5a dosi.

(4) Pauta vàlida per a infants nascuts a partir de gener de 2015.

(5) Almenys 1 dosi administrada a partir de l'edat de 10 anys, i en aquest cas no serà necessària la dosi dels 12 anys.

(6) A susceptibles (no estan vacunats ni han patit la malaltia).

(7) La vacunació VPH només està finançada a nines nascudes a partir de dia 1 de gener de 1994 i fins els 25 anys d'edat.

(8) Inici < 15 anys: 2 dosis (0-6 mesos); Inici ≥ 15 anys: 3 dosis (0-1-6 mesos).

Rang d'edat en què és possible administrar cada vacuna (L'edat d'inici condiona la pauta que s'ha de seguir tant en nombre de dosis com en interval entre dosis)		
Vacuna	Edat mínima	Edat màxima
Hexavalent (DTPa+PI+Hib+HB)	6 setmanes	36 mesos ⁽¹⁾
Pentavalent (DTPa+PI+Hib)	6 setmanes	5 anys
Diftèria, tètan i tos ferina acel·lular (DTPa)	6 setmanes	6 anys
Diftèria de baixa càrrega antigènica, tètan i tos ferina acel·lular (dTpa)	4 anys	No n'hi ha
Diftèria de baixa càrrega antigènica i tètan (dT)	7 anys	No n'hi ha
Poliomielitis inactivada (PI)	6 setmanes	No n'hi ha
Hepatitis B pediàtrica (HB)	Naixement	15 anys
Xarampió, rubèola i parotiditis (XRP)	6 mesos	No n'hi ha
Meningitis C (MC)	6 setmanes	No n'hi ha
<i>Haemophilus influenzae</i> tipus b (Hib)	6 setmanes	No n'hi ha
Varicel·la (V)	9 mesos	No n'hi ha
Virus del papil·loma humà (VPH)	9 anys	No n'hi ha
Antipneumocòccica 13v (PnC13)	6 setmanes	No n'hi ha

(1) 24 mesos si la vacuna utilitzada es Hexyon^R

B. Calendaris adaptats

Probablement la situació més freqüent sigui la d'un infant que no inicia la vacunació des de zero, sinó que du part de les del calendari, algunes administrades en l'edat correcta i d'altres amb retard. Per això, aquestes pautes constitueixen una guia, però sempre s'han de tenir en compte les indicacions de l'apartat anterior.

Temps des de la 1a visita	Edat d'inici de la vacunació		
	3-6 mesos	6 - 11 mesos	12 - 36 mesos
1a visita	DTPa-PI-Hib-HB-MC ¹ -PnC13 ⁶	DTPa-PI-Hib-HB-MC-PnC13 ⁶	DTPa-PI-Hib-HB-MC-XRP-PnC13 ⁵⁶
1 mes	DTPa-PI-Hib-HB	DTPa-PI-Hib-HB- PnC13	DTPa-PI-HB
2 mesos	DTPa-PI-Hib-PnC13	DTPa-PI	DTPa-PI-Hib ³ -V ^{7,8} -PnC13
6 mesos	HB	HB- PnC13- MC	HB
12 mesos			DTPa-PI
Continuació	Seguir el calendari normalment	Seguir el calendari normalment ²	Seguir el calendari normalment ⁴

(1) MC: administrar-la a l'edat de 4 mesos.

(2) 2a dosi MC: a l'edat de 12 mesos, sempre amb un mes d'interval entre aquesta i la primera.

(3) 2a dosis Hib, segons edat de la 1a: <15 mesos, sí; ≥15 mesos, no.

(4) 2a dosi XRP: a l'edat de 3 anys, sempre amb un mes d'interval entre aquesta i la primera.

(5) >24 mesos, 1 dosi

(6) La vacuna PnC13 està finançada per a infants nascuts a partir de gener de 2016. També a qualsevol infant, independentment de l'edat, en condicions de risc fins els 14 anys

(7) Als 15 mesos i 3 anys. Pauta vàlida per a infants nascuts a partir de gener de 2015 i per a infants fins a 14 anys amb factors de risc.

(8) En menors de 12 anys, interval de 8-12 setmanes entre dosis.

Temps des de la 1a visita	Edat d'inici de la vacunació		
	3 - 6 anys	7 - 12 anys	>12 anys
1a visita	DTPa-PI-Hib ¹ -HB-MC- XRP - V ⁶ -PnC13 ⁵	dTpa-PI- HB-MC ³ - XRP-V ^{2,7}	Td-PI-HB-MC-XRP-VPH ⁴ -V ²
1 mes	DTPa-PI-HB -XRP	Td-PI-HB-XRP	Td-PI-HB-XRP- V ²
2 mesos	DTPa-PI- V	V	
6 mesos	HB	HB	HB- VPH
12 mesos	DTPa-PI	Td-PI	Td-PI
Continuació	Seguir el calendari normalment	Seguir el calendari normalment	Seguir el calendari normalment ⁷

(1) Si té 3 anys, hexa; entre 4 i 5 anys, penta+HB; 6 anys, dTpa/Td+P+HB.

(2) V: a l'edat de 12 anys als que són susceptibles (no estan vacunats ni han patit la malaltia)

(3) Si la dosi MC s'administra abans de l'edat de 10 anys, se n'ha d'administrar una altra a la de 12; si s'administra a partir falta una 2a dosi.

(4) La vacunació VPH només està finançada a nines nascudes a partir de dia 1 de gener de 1994.

(5) La vacuna PnC13 està finançada per a infants nascuts a partir de gener de 2016 i per a infants fins a 14 anys amb factors de risc.

(6) V: Només per a infants nascuts a partir de gener de 2015 i per a infants fins a 14 anys amb factors de risc.

(7) En menors de 12 anys, interval de 8-12 setmanes entre dosis.