



G CONSELLERIA
O SALUT
I DIRECCIÓ GENERAL
B SALUT PÚBLICA
/

Manual bàsic de la campanya de vacunació de la grip 2023-2024

Protocol d'actuació

Versió	Data	Autoria	Aprovació
5	06/10/2023	Direcció General de Salut Pública	09/10/23

A aquest manual s'inclouen les consideracions bàsiques de salut pública d'aplicació a la campanya de vacunació de la grip 2023-2024.

Contingut

1. Introducció	3
2. Població diana	3
3. Objectiu.....	5
4. Dates de la campanya	5
5.Vaccins	6
5.1 Tipus de vaccins	6
5.2 Composició de la vacuna	6
5.3 Dosificació i vies d'administració	7
5.4 Contraindicacions, efectes adversos i precaucions	7
6.Registre	10
7.Gestió dels vaccins.....	11
7.1 Distribució.....	11
7,2 Conservació i transport	11
7.3 Indicadors	12
7.4 Aspecte de les vacunes.....	13
7.5 Sol·licitud de vaccins suplementaris.....	14
7.6 Albarans	16
7.7 Centres amb visita de la Intervenció de la Conselleria d'Hisenda.....	17
7.8 Notificació d'incidències	18
8. Indicadors	18



1 Introducció

La vacunació antigripal és l'eina més potent per minimitzar l'impacte de la grip en morbiditat i va dirigida als grups de població amb major risc de patir formes greus de la malaltia.

La campanya es dirigeix a totes les persones a partir dels 60 anys i les menors de 60 anys que compleixen algun dels criteris d'inclusió del programa, és a dir, que tenen alguna de les condicions de risc establertes.

Durant la campanya s'ha previst dur a terme una vacunació conjunta de COVID amb grip amb l'objectiu principal d'assolir un elevat nivell de cobertura en tots els col·lectius de risc d'ambdues vacunes tenint en compte les exclusions de vacunació de COVID-19 i els grups de vacunació conjunta definits.

Enguany la vacunació antigripal incorpora algunes novetats importants, com són la vacunació universal dels infants de 6 a 59 mesos i les persones fumadores.

2. Població diana

Els grups inclosos per a la campanya actual a les Illes Balears són els que es detallen a continuació.

Els grups A i B han de rebre la doble vacunació GRIP-COVID, mentre que el grup C ha de rebre exclusivament GRIP.

A. Població de major risc de complicacions o malaltia greu:

1. Persones de 60 anys d'edat o més.
2. Persones de 5 anys o més institucionalitzades: residències geriàtriques, centres de discapacitats o qualsevol altre centre residencial i institució tancada.
3. Persones de menys de 60 anys amb les condicions clíniques següents:
 - Diabetis *mellitus* i síndrome Cushing?
 - Obesitat mòrbida (índex de massa corporal ≥ 40 en adults, ≥ 35 en adolescents, ≥ 3 desviacions estàndard en la infància).
 - Malalties cròniques cardiovasculars, neurològiques o respiratòries, incloses la displàsia broncopulmonar, la fibrosi quística i l'asma.
 - Malaltia renal crònica i síndrome nefròtica.
 - Hemoglobinopaties i anèmies.
 - Hemofília, altres trastorns de la coagulació i trastorns hemorràgics crònics. Receptors d'hemoderivats i transfusions múltiples.
 - Asplènia o disfunció esplènica greu.
 - Malaltia hepàtica crònica. Inclou alcoholisme crònic.

- Malalties neuromusculars greus.
 - Immunosupressió. Inclou immunodeficiències primàries i la immunosupressió originada per infecció del VIH o per fàrmacs, les receptores de trasplantaments i les que presenten dèficit de complement.

En pacients amb antecedent de trasplantament de progenitors hematopoètics, si s'administra una dosi abans del sisè mes posttrasplantament es recomana administrar-ne una segona a les 4 setmanes. En pacients amb antecedent de trasplantament d'òrgan sòlid, es recomana només una dosi anualment.
 - Càncer i hemopaties malignes.
 - Implant coclear (realitzat o en espera).
 - Fístula de líquid cefaloraquidi.
 - Malaltia celíaca.
 - Malaltia inflamatòria crònica (inclou malalties reumàtiques i autoimmunes).
 - Trastorns o malalties que comporten disfunció cognitiva (síndrome de Down, demències i d'altres).

En aquest grup cal posar esment especial en les persones que necessitin un seguiment mèdic periòdic o que hagin estat hospitalitzades durant l'any anterior.

4. Embarassades en qualsevol moment de gestació. Les no vacunades durant l'embaràs s'han de vacunar en el puerperi fins als 6 mesos.
5. Persones convivents amb aquelles que tenen alt grau d'immunosupressió: en general es refereix a trasplantades de progenitors hematopoètics, trasplantades d'òrgan sòlid, insuficiència renal crònica, infecció pel VIH amb recompte baix de CD4 (<200 cel/ml), algunes immunodeficiències primàries i aquelles sotmesos a certes teràpies immunosupressores. També es podran incloure convivents de persones amb altres malalties de major risc i majors, definits als subapartats 1 i 3.

B. Per reduir l'impacte i el manteniment de serveis crítics i essencials a la comunitat:

6. Personal de centres sanitaris i sociosanitaris públics i privats (tant sanitaris com no sanitaris, excepte estudiants en què només es recomana vacunació davant de la grip).
7. Persones que treballen en serveis públics essencials, amb especial èmfasi en els subgrups següents:
 - Forces i cossos de seguretat de l'Estat, amb dependència nacional, autonòmica o local.
 - Bombers.
 - Serveis de protecció civil.

C. Grups als quals es recomana únicament la vacunació antigripal:

8. -Població infantil entre 6 i 59 mesos d'edat.

9. -Persones de 5 a 59 anys que presenten un risc més gran de complicacions derivades de la grip:
 - Persones de 5-18 anys que reben tractament prolongat amb àcid acetilsalicílic, per la possibilitat de desenvolupar una síndrome de Reye després de la grip.
 - Persones_fumadores.
10. Estudiants en pràctiques a centres sanitaris i sociosanitaris.
11. Persones amb exposició laboral directa a animals o a les seves secrecions en granges o explotacions avícoles, porcines o de visons o fauna silvestre (aus, senglars o mustèlids), com ara ramaders, veterinaris, treballadors de granges, caçadors, ornitòlegs, agents de medi ambient, personal de zoològics, etc. La finalitat és reduir l'oportunitat d'una infecció concomitant de virus humà i aviari o porcí, disminuint la possibilitat de recombinació o intercanvi genètic entre tots dos virus.
12. Treballadors de les escoles de zero a cinc anys, tant docents com cuidadors.

3. Objectiu

S'han de vacunar totes les persones de 60 anys i més i les menors de 60 anys que compleixen els criteris d'inclusió establerts en el programa.

Objectius de cobertura:

- Majors de 60 anys (posant especial atenció a persones que viuen a residències) i personal sanitari i sociosanitari: **75%**
- Resta de col·lectius: **60%**

4. Dates de la campanya

- Dia 16 d'octubre: Residències geriàtriques.
- Dia 23 d'octubre: Població general de més de 60 anys i més, població de risc de més de 5 anys i professionals.
- Dia 3 de novembre: Població de 6 a 59 mesos.
- Es podran vacunar **de forma oportunista** tan aviat com estigui disponible la vacuna tetravalent inactivada :
 - Infants de 6 a 24 mesos
 - Infants de 25 a 59 mesos que hagin de rebre la vacuna inactivada per contraindicació de l'atenuada intranasal.



5. Vaccins

5.1 Tipus de vaccins

Enguany la compra de dosis suplementàries pel Ministeri possibilitarà una millor cobertura i, en el cas de persones majors institucionalitzades, una millor protecció.

Marca i laboratori	Tipus de vacuna	Població a qui va destinada
Efluelda (Sanofi Aventis)	Inactivada tetravalent d'alta càrrega antigènica	Persones institucionalitzades de 60 anys i més.
Fluad Tetra® (Seqirus)	Inactivada tetravalent adjuvada.	Persones no institucionalitzades de 65 anys i més.
Fluenz Tetra® (Astra Zeneca)	Atenuada tetravalent, administració intranasal.	Infants de 25 a 59 mesos.
Vaxigrip Tetra® (Sanofi Aventis)	Inactivada tetravalent	Resta població objecte de vacunació

5.2 Composició de la vacuna

Composició antigènica de la vacuna antigripal recomanada per l'Organització Mundial de la Salut per a la temporada de les vacunes tetravalents cultivades en ou embrionat emprades a les Illes Balears.

Component	Soques temporada [soca]
A(H1N1)	A/Victoria/4897/2022; [A/Victoria/2570/2019]
A(H3N2)	A/Darwin/9/2021 (H3N2); [No hi ha canvis]
B Victoria	B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria); [No hi ha canvis]
B Yamagata	B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata); [No hi ha canvis]

5.3 Dosificació i vies d'administració

Vaxigrip Tetra® ▼

Es pot administrar per les vies intramuscular i subcutània.

Edat	Dosi	Nombre de dosis ¹	Via i lloc d'injecció
6 mesos – 8 anys	0,5 ml	- Població general: 1 dosi. - Grups de risc: 2 dosis separades per quatre setmanes si és la primera vegada.	Intramuscular, a la cara anterolateral de la cuixa o al deltoïdes segons la massa muscular-
8 anys i més	0,5 ml	- 1 sola dosi.	Intramuscular Zona deltoïde

Efluelda®

Edat	Dosi	Nombre de dosis	Via i lloc d'injecció
60 o més anys	0,7 ml	- 1 dosi	Intramuscular. Zona deltoïde.

Fluad Tetra®

Edat	Dosi	Nombre de dosis	Via i lloc d'injecció
65 o més anys	0,5 ml	- 1 dosi	Intramuscular. Zona deltoïde.

Fluenz Tetra®

Edat	Dosi	Nombre de dosis ¹	Via i lloc d'injecció
25 – 59 mesos	0,2 ml	- Població general: 1 dosi. - Grups de risc: 2 dosis separades per quatre setmanes si és la primera vegada.	Polvorització intranasal, 0,1 ml a cada nariu.

- **Cap de les vacunes** s'ha d'administrar per la via intravascular, en cap circumstància.
- **Persones amb alteracions de la coagulació:** vegeu les indicacions a l'apartat "Precaucions".

5.4 Contraindicacions, efectes adversos i precaucions

- **Efluelda®**
 - No indicada a menors de 60 anys.

- Hipersensibilitat a qualsevol principi actiu o excipient de la vacuna. Podeu consultar la fitxa tècnica de la vacuna al següent enllaç: <https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=85068>

- **Vaxigrip Tetra® :**

- No indicada a menors de sis mesos.
- Hipersensibilitat a qualsevol principi actiu o excipient de la vacuna. Podeu consultar la fitxa tècnica de la vacuna al següent enllaç: <https://cima.aemps.es/cima/publico/detalle.html?nregistro=81098>

- **Fluad Tetra ®**

- No indicada a menors de 18 anys
- No indicada a embarassades.
- Hipersensibilitat a qualsevol principi actiu o excipient de la vacuna. Podeu consultar la fitxa tècnica de la vacuna al següent enllaç: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/1201433001/FT_1201433001.html.pdf

- **Fluenz Tetra®**

- Està contraindicada a:
 - Immunodeficiència greu primària o secundària a tractament. Inclou leucèmies agudes i cròniques, limfomes, immunodeficiències cel·lulars, infecció simptomàtica per VIH i tractament amb corticoides (2 mg/kg/dia de prednisona durant una setmana, 1 mg/kg/dia de prednisona durant 1 mes, o dosis equivalents).
 - Tractament crònic amb salicilats tant per via sistèmica com tòpica, per l'associació de la síndrome de Reye amb els salicilats i la infecció per soques salvatges de virus gripal.
 - Antecedents de reacció al·lèrgica greu (anafilaxi) a qualsevol dels components de la vacuna, inclòs l'ou i les seves proteïnes. La reacció al·lèrgica no anafilàctica no constitueix una contraindicació.
 - Contacte amb persones amb immunodepressió greu, si no es pot garantir evitar-hi el contacte durant 2 setmanes.
 - Síntomes aguts d'exacerbació asmàtica les 72 hores anteriors a la vacunació. L'asma controlada no constitueix una contraindicació.
 - Implant coclear, la setmana anterior i les dues posteriors a la intervenció quirúrgica.
 - Fístula de líquid cefalorraquidi en curs.
- Podeu consultar la fitxa tècnica de la vacuna al següent enllaç: https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/113887004/FT_113887004.html.pdf



Precaucions (aplicables a totes les vacunes)

- Infants de 6 a 35 mesos amb antecedents de convulsions febrils: consulteu amb l'equip de pediatria.
- La vacuna antigripal es pot administrar de manera concomitant amb altres vacunes, tot i que les reaccions adverses es poden intensificar. Cada vacuna s'ha d'aplicar en una extremitat diferent o a una distància mínima entre elles de 3 cm.
- En pacients febrils o amb infecció aguda s'ha d'ajornar l'administració de la vacuna.
- S'ha de posposar la vacunació amb **Fluez Tetra** si hi ha deteriorament neurològic en el moment de la vacunació
- En el cas de **Fluez Tetra** una congestió nasal molt important pot impedir la distribució de la vacuna en la mucosa nasofaríngia. Per això es recomana posposar l'administració de la vacuna intranasal o considerar la vacunació amb la intramuscular
- Una reacció anafilàctica a una dosi prèvia d'una vacuna o a algun component d'aquesta és una contraindicació permanent per tornar a administrar aquesta vacuna o qualsevol altra vacuna que contengui el component en qüestió.
- Les persones amb història d'al·lèrgia a l'ou es poden vacunar normalment, tot i que convé vigilar el període posterior a l'administració de la vacuna.
- Embaràs i lactància: Vaxigrip Tetra es pot administrar en totes les fases de l'embaràs i durant la lactància.
- Pacients immunodeprimits: l'administració de la vacuna no hi està contraindicada.
- No cal determinació de l'INR a les persones en **tractament amb anticoagulants o amb trastorns de la coagulació** ni fer un control especial posterior. La via recomanada és la intramuscular, ja que la subcutània no s'acompanya d'una resposta immune adequada i sí de major reactogenicitat. En canvi, la intramuscular és segura i mostra eficàcia. Seguint el procediment adequat minva el risc de sagnar :
- S'ha d'emprar una agulla de calibre 23 G com a màxim. El risc de sagnar s'associa més amb el gruix de l'agulla que amb la longitud d'aquesta. Es poden fer servir agulles de calibre 25 G (0,5 mm, de 16 o 25 mm de longitud) o de 23 G (0,6 mm, de 25 mm de longitud), d'acord amb l'edat i lloc anatòmic on calgui administrar la vacuna. En cap cas no farem servir agulles de calibre 21 G (0,8 mm, de 16 o 40 mm de longitud).
- Després de l'administració s'ha de fer una pressió ferma sobre la zona de punció (NO fregar, NO fer massatge) al manco dos minuts per afavorir l'hemostàsia. Sempre s'ha de considerar la possibilitat d'aparició d'un hematoma en la zona d'injecció.
- En el cas de pacients hemofílics, la vacunació s'ha d'administrar el més ràpidament possible després de rebre la teràpia substitutiva amb factors de coagulació.
- No suposen una precaució per a la vacunació les malalties agudes lleus sense febre ni afectació sistèmica, ni tampoc la malaltia neurològica crònica que, en canvi, constitueix una condició de risc per a la grip i, per tant, una indicació de la vacunació.

Coadministració amb altres vacunes

Es poden administrar simultàniament amb les altres vacunes (COVID, pneumococ, herpes zòster i vacunes de calendari infantil, així com amb el Nirsevimab)

Per millorar la captació i disminuir visites, es recomana la coadministració sempre que coincideixi la vacunació antigripal amb vacunes de calendari o de campanya. Com en qualsevol altra vacunació concomitant, s'han d'administrar a membres diferents i, si no és possible, a la distància mínima entre les dues vacunes de 2 cm a infants petits i de 3 cm a la resta.

6.Registre

- **Els centres de salut d'Atenció Primària del Servei de Salut** han de registrar les vacunacions a través de l'aplicació corresponent.

S'han de registrar les vacunacions efectuades a l'aplicació e-SIAP. Per evitar oblits i acumulació de feina (que sempre indueix a més errors dels habituals) s'han de registrar immediatament si es fan al centre, mentre que els que es fan a fora dels centres (essencialment domicilis) s'han de registrar sempre que sigui possible el mateix dia i, en qualsevol cas, intentar que no s'acumulin.

En cas que la persona vacunada no estigui d'alta a la base de dades s'ha de donar d'alta a CIVITAS, inclosos els casos d'assistència privada.

- **Centres de vacunació sense accés a l'aplicació d'Atenció Primària** (Residències, serveis de prevenció de risc laboral i altres centres) han de registrar a l'aplicació de la Conselleria:
 - **Aplicació VACUNA, mòdul CAMPANYES.**

Accés on line. : <https://intranet.caib.es/vacunafront>

S'ha de demanar l'alta a vacunaciogrip@caib.es amb les dades següents: Institució, nom complet, llinatges, DNI, professió (Medicina o Infermeria), número de col·legiat, correu electrònic, telèfon de contacte.

Es pot consultar el manual a <https://www.caib.es/sites/vacunacions/ca/grip-84862/>



7. Gestió dels vaccins

7.1 Distribució

Durant la campanya s'ha previst adquirir un màxim de 100.000 dosis de Vaxigrip Tetra®, 140.000 Fluad Tetra®, 4.800 dosis d'Efluelda® i 22.000 de Fluenz Tetra®.

Els punts de distribució dels diferents vaccins són els següents:

- Vaxigrip Tetra® (Sanofi Aventis):
 - Tots els centres de vacunació.
- Fluenz Tetra® (Seqirus):
 - Tots els centres de vacunació.
- Efluelda® (Sanofi Aventis):
 - Residències amb persones institucionalitzades de 65 i més anys, en una sola entrega al principi de la campanya.
- Fluenz Tetra® (Astra Zanecca)
 - Centres de salut, centres privats de vacunació infantil, mutualitats de funcionaris.

7.2 Conservació i transport

Les vacunes s'han de conservar entre 2 °C i 8 °C i cal evitar que es congelin. És necessari, doncs, comprovar que es mantenen els nivells tèrmics de la gelera.

- Per transportar les vacunes cal emprar geleres portàtils proveïdes d'acumuladors de fred congelats que ocupin aproximadament un terç del volum de la gelera i que cobreixin l'interior de les parets. Durant el transport s'han de protegir de la llum i garantir que no es superen els 22°C
- Per evitar la congelació s'ha d'impedir el contacte directe de les vacunes amb els acumuladors.
- **Si les vacunes arriben en mal estat** (sense indicador de temperatura, amb l'indicador sense activar, amb l'indicador virat, etc.), la persona responsable de la vacunació ha de contactar amb una de les infermeres responsables de vacunes dels responsables de Vacunes de Salut Pública de l'illa corresponent.
- Conservació al centre:
 - Comproveu que totes les neveres tenen termòmetre.
 - Conserveu entre 2 °C i 8 °C.
 - Eviteu que es congelin.
 - Reviseu i registreu diàriament les temperatures.
 - Conserveu-les dins els envasos (unidosi o multidosis).

Podeu consultar les recomanacions de conservació al web <http://vacunes.caib.es>.




7.3 Indicadors

S'utilitza l'indicador de temps-temperatura i de congelació per transportar les dues vacunes.

a) Temps - temperatura:

Hi ha d'haver un indicador dins cada caixa, 3M Monitor Mark:

- És una targeta amb cinc finestres numerades que es tenyeixen de blau de manera gradual i irreversible si les vacunes han estat exposades a temperatures superiors a 10 °C. El nombre de finestres tenyides de color es relaciona amb el temps d'exposició a les temperatures altes de manera directa.



VERD: sense alarma.


VERMELL: alarma. Guardeu les vacunes dins la gelera i contacteu amb els responsables de la tramesa (Conselleria de l'illa corresponent).

- Si totes les finestretes (1, 2, 3, 4 i 5) apareixen completament blanques, el producte es pot emprar.



Manteniment correcte de la temperatura màxima

- Si 3M Monitor Mark presenta una coloració blava a la finestra 2 o a les posteriors, la vacuna podria haver estat afectada per temperatures superiors a 10 °C. Aleshores cal guardar les vacunes dins la gelera i contactar amb els responsables de la tramesa.



NOTA: La llengüeta d'activació (extrem esquerre) es retira a la sortida del laboratori. Si no s'ha fet així 3M Monitor Mark no està activat i cal posar-se en contacte amb els responsables de la tramesa. Es veuria la llengüeta de la següent manera:



b) Congelació

Hi ha d'haver un indicador dins una caixa de cada 5 o fracció que arribin al centre.



7.4 Aspecte de les vacunes

Abans d'administrar la vacuna:

- Tempereu-la a temperatura ambient.
- Agiteu-la amb suavitat.
- Comproveu-ne l'aspecte

S'han de rebutjar si:

- Presenten partícules en suspensió.
- Hi ha o variació de color.
- S'han congelat
-

VAXIGRIP TETRA



EFLUELDA



FLUAD TETRA



FLUENZ TETRA





7.5 Sol·licitud de vaccins suplementaris

En cas de necessitat de més dosis després de la 1a entrega, s'han de sol·licitar al centres de distribució, segons el quadre següent:

Centres de distribució. Contactes.				
<i>Illa</i>	<i>Centre</i>	<i>Fax</i>	<i>Telèfon</i>	<i>Correu electrònic</i>
Mallorca, Atenció Primària	Son Pisà (CS /UBS/ PVM)		682 625 694, ext 90745 971 28 38 26	Georgina Ponsa Mir (gponsa@ibsalut.es)
Mallorca, altres centres i serveis de vacunació.	D.G. de Salut Pública, Vacunes		971 17 66 20	vacunaciogrip@dgsanita.caib.es
Menorca	Centre Insular de Menorca	971 17 69 14	971 17 73 33	vacunesmenorca@dgsanita.caib.es
Eivissa	Centre Insular d'Eivissa i Formentera	971 17 68 61	971 17 70 67	vacuneseivissa@dgsanita.caib.es

Canvis de vacuna entre centres de l'IBSALUT:

No s'han de fer canvis entre centres, sinó que s'han de demanar a Son Pisà (Mallorca) o al centre de la Conselleria de l'illa corresponent (Menorca i Eivissa-Formentera).

Si, per alguna circumstància excepcional, és necessari demanar una vacuna a un altre centre, el centre que cedeix la vacuna ho ha de comunicar a Son Pisà (Mallorca) o al centre de la Conselleria de l'illa corresponent (Menorca i Eivissa-Formentera). La vacuna no s'ha de retornar al centre que l'ha cedida

Els models de sol·licitud de la vacuna són a les pàgines següents.

ATENCIÓ PRIMÀRIA IB-SALUT
CS/UBS*: Tel.: <i>* Només unitats bàsiques que poden sol·licitar vacunes (vegeu el directori).</i> Sol·licitant (nom i llinatges): Adreça electrònica: Data de la sol·licitud:

ALTRES
Centre: Tel.: Sol·licitant (nom i llinatges): Adreça electrònica: Data de la sol·licitud:

Vacuna	Quantitat
VAXIGRIP® (Sanofi)	
Fluad Tetra® (Seqirus)	
Fluenz Tetra ® (Astra Zeneca) <i>Exclusiu vacunació infantil 25-59 mesos</i>	
Efluelda ® (Sanofi) <i>Exclusiu residències geriàtriques</i>	



7.6 Albarans

RECEPCIÓ:

El control d'albarans és una tasca **fonamental** de la persona responsable de la vacunació antigripal, que haurà de dur a terme les següents funcions:

1. Efectuar la recepció de les dosis.
2. Cercar l'albarà de les VAG (pot estar dins el paquet amb les agulles o bé aferrat a la capsa). S'ha d'assegurar que és l'albarà del laboratori farmacèutic (necessari per a la posterior facturació) i no el full del transportista.

L'albarà SEMPRES du el nom del laboratori i el nombre de dosis, tal com es veu a la imatge:

sanofi-aventis, S.A.
Josep Pla, nº 2
08019 - BARCELONA
Teléfono: +34 93 485 94 00 Fax: +34 93 485 95 00
C.I.F. ESA08163586

SANOFI

ALBARÁN DE EXPEDICIÓN

Datos comerciales		de fecha		Datos Entrega		Cuenta.	
Nº Albarán:	5001432688	28.08.2020	28.08.2020	09641085	100031001	C.I.F. S0711001H	
S/ Pedido:	E-MAIL	28.08.2020	28.08.2020				

Datos expedición

Envío por: INTEGRAL 2 FRIOFARMA
Medio Transporte: Via area
Nº de bultos: 00060 Peso (kg): 165,000
Volumen CM3: 3.222.400,000 Peso Neto(kg): 115,000

Baleares
España

Centre que rep
les vacunes

Código	Descripción/Lote	Fecha caducidad	% IVA	Unidades	Precio	Importe	Nota
715024	*** S/Pedido: 2019/7836, LOTE 2 de fecha *** Nº Ped SAP: 100127827092019/7836, LOTE 2 VXQ_QUADRID ES PR WE (715222) Lote: T3J012V	31-07-2020		300	9,50	2.850,00	870,00

Nombre de
dosis

3. Comprovar la quantitat de dosis rebudes, el lot, la data de caducitat, i la temperatura.
4. Consignar les dosis rebudes i la temperatura a l'albarà.
5. Consignar la data i l'hora de recepció de la comanda. Això és especialment important si es reben comandes fora dels horaris establerts.
6. Consignar el centre i el nom i llinatges de la persona que fa la recepció.
7. Signar l'albarà.
8. En cas de rebre una entrega sense albarà, s'ha de avisar immediatament la Coordinació de Vacunes de la DGSP, al telèfon 971 17 73 34 - 971 17 73 32.

TRAMESA DE L'ALBARÀ (PER A TOTES LES ILLES):

Coordinació Vacunes de les Illes Balears de la DGSP, per fax o mail:

- Fax **971 17 69 98**
- Mail **vacunaciogrip@caib.es**

7.7 Centres amb visita de la Intervenció de la Conselleria d'Hisenda

Cada any, per assegurar un bon control del compliment dels contractes, es fa una visita de recompte de dosis rebudes a una mostra dels centres de vacunació.

La Conselleria comunica als responsables dels centres que s'han de visitar que han estat seleccionats i la data.

Per facilitar el recompte i interferir el manco possible en la feina del centre, sempre que es pugui s'han de mantenir les vacunes dins les capsas i el manco disperses possible dins els centres.

Si és necessari l'ús de dosis de vacuna abans de la visita de recompte, la persona responsable de la campanya al centre ha d'emetre un document que ho certifiqui, segons el model.

CERTIFICAT d'ús de dosis abans de la visita de la Intervenció de la Conselleria d'Hisenda
Nom i llinatges: Càrrec (infermer/a, metge/ssa, director/a...): CENTRE: CERTIFICA: Que en aquest centre s'han rebut totes les dosis de vacuna de grip corresponents a la primera entrega, realitzada el mes de novembre de 2023. Que per atendre les necessitats de la població se n'han distribuït..... dosis, abans de efectuar-se l'acte formal de recepció del subministrament. <u>DOSIS</u> - Dosis albarà de la 1a entrega - Dosis distribuïdes abans de l'acte de recepció - Dosis estoc actual, de de 20...



7.8 Notificació d'incidències

SEMPRE s'han de comunicar les incidències a la Conselleria, al contacte de l'illa corresponent, amb independència que des dels centres de salut es puguin comunicar també a la seva gerència o, des d'altres centres, als seus superiors.

Això inclou sol·licituds extraordinàries de vacuna.

8. Indicadors

Menors de 5 anys
Població diana < 5 anys
- De 6 a 24 mesos - De 25 a 59 mesos
Nre. Total de vacunats < 5 anys
- De 6 a 24 mesos - De 25 a 59 mesos
Cobertura de vacunació antigripal en persones < 5 anys
- De 6 a 24 mesos - De 25 a 59 mesos
Entre 5 i 59 anys
Població diana 5 a 59 anys
Nre. Total de vacunats entre 5 y 59 anys
Nre. Total de vacunats con criteri d'inclusió entre 5 y 59 anys
Cobertura de vacunació antigripal en persones de 5 a 59 anys
60 anys i més
Població diana
Nre. Total de vacunats >=60 anys
Cobertura de vacunació antigripal en persones >= 60 anys
Total
Població diana
Nre. Total de vacunats
Cobertura de vacunació antigripal