

**Examen del concurso-oposición para optar a plazas de la categoría
odontólogo-estomatólogo / odontóloga-estomatóloga de área de atención
primaria del Servicio de Salud de las Islas Baleares**

Observaciones:

- Este cuestionario consta de 100 preguntas en total. De la 89 a la 100 son preguntas de reserva por si alguna de la 1 hasta la 88 resulta impugnada. Por lo tanto, tiene que responder todas las preguntas.
- Las páginas de este cuaderno están numeradas; compruebe su contenido hasta la última página.
- Si detecta alguna anomalía en la impresión del cuestionario, pida que se lo cambien.
- Cada pregunta del cuestionario contiene solo una respuesta correcta, y todas las preguntas tienen el mismo valor.
- La valoración de este examen es de 60 puntos; para superarlo hay que lograr la puntuación mínima de 29,9992 puntos. Cada respuesta correcta se valora con 0,6818 puntos. Las respuestas erróneas se penalizan con una cuarta parte del valor de una respuesta correcta. Las respuestas en blanco y las que contengan más de una alternativa marcada no se valoran.
- Lea muy atentamente las instrucciones que aparecen en el encabezamiento de la hoja de respuestas para saber cómo señalarlas.
- El tiempo para completar el ejercicio es de dos horas y media (150 minutos), incluido el tiempo para responder las preguntas de reserva.
- Puede utilizar el cuestionario como borrador. Una vez terminado el examen, puede llevarse el cuestionario.

Advertencias:

- No abra el cuestionario hasta que se lo indiquen.
- No haga ningún tipo de marca que pueda desvirtuar los principios de igualdad, mérito y capacidad.
- Únicamente puede usar bolígrafo negro o azul.
- No se permite usar calculadora.
- Durante la prueba tiene que mantener apagados el teléfono móvil y cualquier otro aparato que permita la comunicación telemática.
- Incumplir cualquiera de estas advertencias puede suponer la exclusión del examen.



1. **Señale la respuesta incorrecta respecto al *dens in dente*:**
 - a) El diente que resulta afectado más a menudo es el incisivo lateral permanente.
 - b) Clínicamente, la anomalía es difícil de diagnosticar.
 - c) Es infrecuente que presente patología pulpar del tipo pulpitis.
 - d) Pueden existir dos orificios apicales.

2. **Señale la respuesta incorrecta en relación con el liquen plano oral:**
 - a) La forma reticular presenta estrías blancas en forma de red.
 - b) Las formas atróficas y erosivas no presentan estrías.
 - c) Es frecuente que sea una lesión con episodios sintomáticos entre periodos de remisiones clínicas.
 - d) Es frecuente la localización bilateral en las mucosas yugales.

3. **Señale la respuesta correcta en referencia al nervio infraorbitario:**
 - a) Está situado en la línea del eje del segundo premolar superior.
 - b) Está a 25 mm del reborde orbitario inferior.
 - c) No está indicado anestesiarlo en las intervenciones quirúrgicas periapicales.
 - d) Al anestesiarlo se puede provocar parálisis del nervio facial.

4. **¿Cuál de las respuestas siguientes respecto a la erupción dentaria es incorrecta?**
 - a) La odontoclastia de la raíz del diente temporal se inicia por la parte lingual.
 - b) La formación de la raíz de un diente temporal se completa al año de su erupción.
 - c) En caso de agenesia de dientes permanentes, el diente temporal no sufre nunca reabsorción radicular (rizólisis).
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

5. Cuando es necesario hacer una exodoncia a un paciente cardiópata, ¿en cuál de los casos siguientes no hace falta la profilaxis antibiótica de la endocarditis bacteriana?
- a) Paciente con válvula cardíaca protésica.
 - b) Historia previa de endocarditis.
 - c) Receptor de un trasplante cardíaco con enfermedad cardíaca valvular.
 - d) Cardiopatía congénita corregida por completo hace dos años por medio de un dispositivo material protésico.
6. Señale la respuesta correcta en relación con las infracciones dentales:
- a) Las líneas de infracción pueden visualizarse con un foco de luz perpendicular al diente.
 - b) Pueden visualizarse por transiluminación con luz de fibra óptica desde la cara palatina.
 - c) No es necesario hacer pruebas de vitalidad.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
7. Señale la respuesta correcta en relación con las adherencias y las adhesiones de la articulación temporomandibular:
- a) Suelen ser debidas a una sobrecarga estática prolongada de las estructuras articulares o secundarias a una hemartrosis traumática o quirúrgica.
 - b) Producen una restricción en el rango del movimiento que no depende de la localización de la adhesión.
 - c) El tratamiento es siempre quirúrgico.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
8. Señale la cantidad mínima de gel fluorado al 1,23 % que contiene aproximadamente la dosis tóxica probable (DTP) de flúor para un niño de 20 kilogramos de peso:
- a) 1-2 ml.
 - b) 7-8 ml.
 - c) 15-16 ml.
 - d) 41-42 ml.

9. Señale la respuesta incorrecta respecto a la eliminación químico-mecánica de la caries:
- a) No se produce barrillo dentinario.
 - b) El tiempo de tratamiento es más corto que en el tratamiento convencional.
 - c) Hay estudios que señalan mayor presencia de caries residual con esta técnica.
 - d) Implica el ablandamiento químico seguido de excavación suave.
10. Señale la respuesta incorrecta respecto a la eritroplasia:
- a) Es una lesión de aspecto liso, pero en algunos casos puede ser moteada o granular.
 - b) Es una lesión menos frecuente que la leucoplasia.
 - c) La localización más frecuente es la lengua.
 - d) El tratamiento es la escisión quirúrgica en el caso de displasia grave o carcinoma *in situ*, mientras que en el caso de displasia moderada hay que hacer revisiones periódicas.
11. Señale la respuesta incorrecta respecto al tratamiento de pacientes no colaboradores bajo anestesia general:
- a) No son recomendables las grandes reconstrucciones.
 - b) No son recomendables las endodoncias en dientes posteriores.
 - c) La secuencia del tratamiento ha de ser operatoria dental, tratamientos periodontales, exodoncias y cirugía oral.
 - d) No es recomendable infiltrar anestesia local.
12. Señale la respuesta incorrecta respecto al mesiodens:
- a) Está localizado típicamente en el maxilar, en la línea media entre los incisivos centrales.
 - b) Puede ser causa del bloqueo eruptivo en ese nivel.
 - c) Requiere exploración radiológica.
 - d) Aunque muy citado, es un caso poco frecuente de diente supernumerario.

13. **¿Cuál de los signos o síntomas siguientes no es indicativo de que el paciente sufre una reacción vagal?**
- a) Sensación de mareo.
 - b) Hipertensión arterial.
 - c) Visión borrosa.
 - d) Pulso lento y débil.
14. **Señale la respuesta correcta en cuanto a la hemofilia A:**
- a) Es de carácter hereditario autosómico dominante.
 - b) Afecta al factor IX de la coagulación.
 - c) Afecta más a menudo a las mujeres.
 - d) Afecta a la hemostasia secundaria.
15. **Debido a la estrecha relación entre el periápice y las corticales óseas, la vía más rápida de propagación de las infecciones odontogénicas suele ser hacia vestibular. No obstante, entre las piezas dentales siguientes hay una en la que la infección odontogénica progresa a menudo hacia palatino/lingual:**
- a) Incisivo central inferior.
 - b) Primer premolar inferior.
 - c) Incisivo lateral superior.
 - d) Canino superior.
16. **¿Cuál de las lesiones siguientes en los maxilares no dará una imagen radiolúcida en la radiografía?**
- a) Periodontitis apical aguda.
 - b) Quiste folicular.
 - c) Ameloblastoma.
 - d) Cementoblastoma verdadero.
17. **El denominado «esmalte en copos de nieve» puede hallarse en la amelogénesis imperfecta de tipo...**
- a) ...hipoplásico.
 - b) ...hipomaduro.
 - c) ...hipocalcificado.
 - d) ...hipoplásico/hipomaduración con taurodontismo.

18. **Se distinguen dos grandes grupos de anestésicos locales según su estructura química. Señale la respuesta correcta:**
- a) Clínicamente los anestésicos locales de tipo éster se aplican por la vía parenteral.
 - b) La benzocaína es un anestésico local de tipo amida.
 - c) La tetracaína es un anestésico local de tipo éster.
 - d) La mepivacaína es un anestésico local de tipo éster.
19. **Señale la respuesta incorrecta en relación con el espacio de deriva:**
- a) Es más aprovechable en la arcada superior que en la inferior.
 - b) Es debido a las diferencias de tamaño mesiodistal entre el segundo molar temporal y el premolar que le sucederá.
 - c) Es mayor en la mandíbula que en el maxilar.
 - d) Permite la intercuspidadación de los molares permanentes en clase I.
20. **¿Qué procesos terapéuticos están incluidos en la cartera básica de servicios de atención bucodental en la atención primaria?**
- a) Tratamiento reparador de la dentición temporal.
 - b) Tratamientos con finalidad estética.
 - c) Exploración de la cavidad oral de las embarazadas.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
21. **¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas orales puede ser el resultado de complicaciones de la radioterapia de la cabeza y del cuello?**
- a) Xerostomía.
 - b) Disgeusia.
 - c) Trismo.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
22. **¿Cuál de los siguientes AINE tiene un menor índice COX-2/COX-1 (es decir, actúa preferentemente sobre COX-2)?**
- a) Indometacina.
 - b) Ibuprofeno.
 - c) Meloxicam.
 - d) Ácido acetilsalicílico.

23. Señale cuál fue la primera comunidad autónoma donde se estableció un programa de capitación (PADI) para cubrir las necesidades dentales de la población escolar:
- a) Islas Baleares.
 - b) Región de Murcia.
 - c) Comunidad Autónoma Vasca.
 - d) Comunidad Foral de Navarra.
24. Señale la respuesta correcta respecto a los derechos del personal estatutario de los servicios de salud según la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.
- a) Derecho a la estabilidad en el empleo y al ejercicio o desempeño efectivo de la profesión o funciones que correspondan a su nombramiento.
 - b) Derecho a la percepción puntual de las retribuciones e indemnizaciones por razón del servicio establecidas en cada caso.
 - c) Derecho a la formación continuada adecuada a la función desempeñada y al reconocimiento de su cualificación profesional en relación con dichas funciones.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
25. Señale cuál de las respuestas siguientes es un requisito de los selladores de fisuras:
- a) Han de ser fáciles de aplicar.
 - b) Han de tener humectabilidad alta.
 - c) Han de tener viscosidad alta.
 - d) Las respuestas *a* y *b* son correctas.
26. Entre las vacunas aconsejadas contra enfermedades potencialmente transmisibles a los trabajadores de una consulta de odontología no se encuentra...
- a) ...la vacuna contra la hepatitis C.
 - b) ...la vacuna contra la gripe.
 - c) ...la vacuna contra el sarampión.
 - d) ...la vacuna contra la hepatitis B.

- 27. Señale la respuesta correcta en relación con los pacientes con síndrome de Down:**
- a) El nivel de caries es igual al del resto de la población.
 - b) La localización más frecuente de dientes incluidos se da en los premolares superiores.
 - c) El retraso eruptivo es mayor en la dentición permanente que en la temporal.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 28. Señale la respuesta correcta respecto a la fisura labiopalatina:**
- a) Es la malformación congénita orofacial menos frecuente.
 - b) La queilorrafia debe llevarse a cabo en los primeros meses de vida.
 - c) Los pacientes con fisura labiopalatina tienen poca susceptibilidad a la caries.
 - d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
- 29. ¿Qué fármaco puede causar arritmias al interactuar con el vasoconstrictor de la anestesia dental?**
- a) Captopril.
 - b) Furosemida.
 - c) Digoxina.
 - d) Hidroclorotiazida.
- 30. ¿Cuál es la indicación para un recubrimiento pulpar directo en caso de fractura coronaria esmalte-dentina con exposición pulpar?**
- a) Exposición pulpar de 1 mm, tiempo transcurrido desde el traumatismo de 24 horas, ápice inmaduro.
 - b) Exposición pulpar de 2 mm, tiempo transcurrido inferior a 1 hora, ápice inmaduro.
 - c) Exposición pulpar de 1 mm, tiempo transcurrido desde el traumatismo de 10 horas, ápice cerrado.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

31. Una de las formas graves de infección odontogénica propagada por continuidad es la angina de Ludwig, que es una celulitis difusa. ¿A qué espacio anatómico afecta?
- a) Espacio submentoniano.
 - b) Espacio sublingual.
 - c) Espacio submaxilar.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
32. En el control de la terapia con acenocumarol se utiliza la medición periódica de la INR (*international normalized ratio*). ¿Qué es la INR y cómo se interpreta?
- a) Es la proporción entre el tiempo de protrombina (TP) del paciente y un TP de control. Cuanto mayor la INR, mayor la anticoagulación.
 - b) Es la proporción entre el tiempo de protrombina (TP) del paciente y un TP de control. Cuanto mayor la INR, menor la anticoagulación.
 - c) Es la proporción entre el tiempo parcial de tromboplastina (TPT) del paciente y un TPT de control. Cuanto mayor la INR, menor la anticoagulación.
 - d) Es la proporción entre el tiempo de trombina (TT) del paciente y un TT de control. Cuanto mayor la INR, mayor la anticoagulación.
33. ¿Qué porcentaje de niños no han acudido en el último año a la consulta de odontología según la Encuesta de Salud Oral en España de 2020?
- a) 73,4 %.
 - b) 64,3 %.
 - c) 46,1 %.
 - d) 21,4 %.
34. ¿Qué administración pública expide el título de especialista en Ciencias de la Salud?
- a) El Ministerio de Sanidad.
 - b) Las consejerías autonómicas competentes en materia de sanidad.
 - c) El Ministerio de Igualdad.
 - d) El Servicio de Salud de las Islas Baleares.

35. **¿En qué consiste el tratamiento de elección para una pulpitis irreversible dolorosa?**
- a) Prescripción de analgésicos.
 - b) Prescripción de antibiótico.
 - c) Extirpación completa de la pulpa.
 - d) Actitud expectante.
36. **Señale la respuesta correcta sobre el síndrome de Stevens-Johnson:**
- a) Siempre afecta a la cavidad oral.
 - b) Puede desarrollarse síndrome de Sjögren posteriormente.
 - c) Nunca ocurren pródromos.
 - d) Las respuestas *a* y *b* son correctas.
37. **¿En qué caso no está indicada la cirugía periodontal?**
- a) Cuando la profundidad de sondaje está aumentada.
 - b) Cuando el paciente tiene un mal control de la placa.
 - c) Cuando haya sangrado o exudación.
 - d) En todos los casos anteriores está indicada la cirugía periodontal.
38. **Señale la respuesta correcta en cuanto al riesgo de lesión nerviosa debido a la extracción quirúrgica de un tercer molar inferior:**
- a) El riesgo de lesión permanente del nervio dentario inferior (NDI) tiene una incidencia muy baja.
 - b) La incidencia de parestesia temporal del NDI varía entre el 7,2 % y el 20 %.
 - c) La incidencia de parestesia temporal del NDI es 25 veces superior a la del nervio lingual.
 - d) No se puede evaluar preoperatoriamente el riesgo de lesionar el NDI.
39. **En la exploración oral debe sospecharse la presencia de un hábito de succión digital si se observa...**
- a) ...labioversión de los incisivos superiores.
 - b) ...linguoversión de los incisivos inferiores.
 - c) ...extrusión de molares.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

40. ¿Qué situación clínica corresponde al estadio I de osteonecrosis de los maxilares según la Asociación Americana de Cirujanos Orales y Maxilofaciales?
- a) Molestias locales sin evidencia de exposición de hueso necrótico.
 - b) Fístula extraoral.
 - c) Exposición de hueso necrótico sin signos de infección.
 - d) Comunicación orosinusal.
41. Señale la respuesta incorrecta en relación con los efectos de los traumatismos en dientes temporales sobre los gérmenes de los dientes permanentes:
- a) La subluxación y la luxación extrusiva representan el menor riesgo de daño.
 - b) La luxación intrusiva y la avulsión condicionarán con mayor frecuencia trastornos del desarrollo.
 - c) Tienen mayor riesgo de alteraciones del desarrollo del diente permanente si se producen entre los tres y los seis años de edad.
 - d) Pueden interferir en la formación de la raíz del diente definitivo.
42. ¿Cuál de los gérmenes siguientes implicados en la infección odontogénica son cocos grampositivos anaerobios facultativos?
- a) Peptococos.
 - b) *Veillonella*.
 - c) Estafilococos y estreptococos.
 - d) *Actinomyces*.
43. Señale el valor del índice CAOD a los doce años de edad en España según la Encuesta de Salud Oral de 2020:
- a) 0,58.
 - b) 0,99.
 - c) 1,34.
 - d) 2,25.

- 44. Señale el tipo de paciente al cual no recomendaría el uso del fosfato cálcico amorfo:**
- a) Un menor de edad.
 - b) Un paciente con xerostomía.
 - c) Un paciente con hipersensibilidad dentinaria.
 - d) Un paciente alérgico a la proteína de la leche.
- 45. ¿A quién se aplica la Ley 5/2003 de 4 de abril, de salud de las Islas Baleares?**
- a) A los ciudadanos residentes y a los no residentes, con independencia de su situación legal administrativa.
 - b) A las administraciones públicas de las Islas Baleares.
 - c) A los españoles y a los comunitarios residentes.
 - d) Las respuestas a y b son correctas.
- 46. Señale cuál puede ser la causa de displasia ambiental del esmalte:**
- a) La ingestión excesiva de flúor.
 - b) Las nefropatías.
 - c) Los déficits nutricionales.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 47. ¿Qué hay que tener en cuenta para el control de la infección en la clínica dental?**
- a) La contaminación de la mano con virus y la posterior inoculación en la mucosa es una importante vía de transmisión.
 - b) El uso de determinados colutorios, previo a los procedimientos dentales, disminuye la carga viral.
 - c) El uso del dique de goma permite reducir significativamente la carga viral presente en los aerosoles generados por el instrumental rotatorio.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 48. Señale la respuesta correcta sobre la anestesia locorregional odontológica a un niño:**
- a) No se recomienda aplicar anestesia tópica previa en forma de crema o gel.
 - b) El hueso es menos poroso en la edad infantil.
 - c) La espina de Spix se encuentra por debajo del plano oclusal.
 - d) La dosis máxima no varía con la edad.

49. **En terceros molares incluidos o semiincluidos asintomáticos y sin patología, ¿está indicada la exodoncia?**
- a) Si su posición es un factor de riesgo alto para la aparición futura de caries y/o enfermedad periodontal del segundo molar y/o del tercer molar.
 - b) Para prevenir, limitar o resolver el grado de apiñamiento anteroinferior.
 - c) La germenectomía del cordal debería ser un tratamiento preventivo en todos los pacientes.
 - d) Nunca está indicada la exodoncia.
50. **¿Qué hay que valorar para indicar el uso de un mantenedor de espacio?**
- a) La fase de dentición.
 - b) La fase de desarrollo del germen permanente.
 - c) La discrepancia oseodentaria.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
51. **¿Qué antecedente en la historia clínica de un paciente debe alertar del hecho de que toma anticoagulantes orales?**
- a) La trombosis venosa profunda.
 - b) Que se trata de un paciente sometido a diálisis renal.
 - c) Los antecedentes de infarto de miocardio.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
52. **Señale la respuesta incorrecta sobre el quiste folicular o dentígeno:**
- a) Es una lesión quística que rodea la corona de un diente no erupcionado.
 - b) Siempre es asintomático.
 - c) El tratamiento consiste en la marsupialización y la posterior enucleación quirúrgica y/o la exodoncia del diente incluido.
 - d) Hay que diferenciarlo de un saco folicular agrandado. Se considera quiste dentígeno a partir de 2,5 mm.
53. **¿Cuál de los fármacos siguientes no pertenece al grupo de los antiagregantes plaquetarios?**
- a) Clopidogrel.
 - b) Triflusal.
 - c) Warfarina.
 - d) Ticlopidina.

- 54. Señale la respuesta incorrecta en relación con las pastas dentífricas y la caries:**
- a) A mayor tiempo de contacto de la pasta dental con la superficie del diente, mayor efecto preventivo.
 - b) Al año de vida se recomienda el cepillado con una cantidad de pasta similar al tamaño de un guisante.
 - c) Se recomienda cepillar los dientes con pasta fluorada a partir de la erupción dental.
 - d) Las pastas con 5.000 ppm de flúor tienen mayor efecto preventivo que las pastas con 1.450 ppm.
- 55. Según la Ley general de sanidad, ¿quiénes pueden ser usuarios del Sistema Nacional de Salud?**
- a) Exclusivamente los españoles.
 - b) Exclusivamente los españoles residentes en España.
 - c) Todos los españoles y los ciudadanos extranjeros residentes en España.
 - d) Exclusivamente los españoles y los ciudadanos comunitarios.
- 56. Señale la respuesta incorrecta sobre las restauraciones mínimamente invasivas de resina:**
- a) Son los tratamientos de caries más conservadores.
 - b) Se limpian exclusivamente las zonas de la superficie oclusal careada.
 - c) Se lleva a cabo la restauración por medio de técnicas de adhesión.
 - d) Nunca se requiere una exploración radiológica reciente.
- 57. Plantéese el caso de un paciente que presenta pérdida de inserción clínica interproximal 5 mm, pérdida ósea radiográfica de la mitad de la longitud radicular, furcas de grado II y tres dientes perdidos por razones periodontales. ¿En qué estadio de periodontitis se encuentra según la nueva clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y periimplantarias publicada en 2018?**
- a) Estadio I.
 - b) Estadio II.
 - c) Estadio III.
 - d) Estadio IV.

- 58. La odontosección se recomienda en muchos casos para facilitar la exodoncia y evitar el riesgo de fractura radicular intraoperatoria...**
- a) ...de los premolares inferiores.
 - b) ...de los incisivos superiores.
 - c) ...del primer premolar superior.
 - d) ...del colmillo inferior.
- 59. Señale la respuesta correcta respecto a las enfermedades generales como causa de maloclusión:**
- a) El raquitismo no produce manifestaciones bucales.
 - b) El hipertiroidismo cursa con retraso eruptivo dental.
 - c) El hipotiroidismo tiene como síntoma la facies adenoidea.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 60. ¿Cuál de las siguientes técnicas de control de la conducta de niños está contraindicada en pacientes muy pequeños o con alguna discapacidad psíquica?**
- a) La técnica de distracción.
 - b) La técnica de decir-mostrar-hacer.
 - c) El refuerzo positivo.
 - d) La técnica de la mano sobre la boca.
- 61. Señale la respuesta correcta: la cartera de servicios del Servicio Nacional de Salud prevé la colocación de prótesis dentales implantosoportadas en los maxilares...**
- a) ...en cualquier paciente oncológico sometido a radioterapia.
 - b) ...en pacientes con procesos oncológicos o traumatismos que afectan a la cavidad oral.
 - c) ...en pacientes con procesos oncológicos de la cavidad oral y en los que padecen malformaciones congénitas que cursan con anodoncia.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



- 62. Señale la respuesta incorrecta en relación con las leucoplasias:**
- a) Se llega al diagnóstico definitivo después de identificar y eliminar los posibles factores etiológicos.
 - b) En las leucoplasias homogéneas la superficie suele estar indurada.
 - c) La leucoplasia no homogénea presenta una superficie irregular, nodular o exofítica.
 - d) No se desprenden al raspado.
- 63. Un paciente de cincuenta y cinco años acude a la consulta 3-4 días después de someterse a una exodoncia del cordal superior 28. Presenta una clínica de fiebre, taquicardia, dolor ocular izquierdo que aumenta con la presión, edema palpebral y ptosis del ojo izquierdo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
- a) Tromboflebitis de la vena cefálica.
 - b) Trombosis del seno cavernoso.
 - c) Orzuelo en el ojo izquierdo.
 - d) Celulitis del espacio temporal superficial.
- 64. Señale la respuesta incorrecta sobre el melanoma maligno de la mucosa oral:**
- a) Es menos agresivo que el cutáneo, ya que en el interior de la cavidad oral no hay exposición solar.
 - b) La lesión aparece como un área muy pigmentada y, a veces, ulcerada. Aumenta de tamaño en poco tiempo. En ocasiones es posible observar lesiones satélites.
 - c) El tratamiento indicado es la maxilectomía o mandibulectomía.
 - d) En caso de cualquier lesión pigmentada intraoral, y una vez descartada la pigmentación fisiológica o racial, hay que hacer una biopsia.
- 65. Señale la recomendación incorrecta para pacientes mayores de dieciocho años con riesgo alto de caries:**
- a) La aplicación de pastas con sustancias remineralizadoras derivadas de la leche.
 - b) El uso de pastas dentales con 5.000 ppm de flúor.
 - c) Enjuagarse con un colutorio fluorado.
 - d) Enjuagarse con agua de forma vigorosa después de cepillarse.

66. **¿Cuál es la emergencia médica más frecuente en la consulta de odontología?**
- a) El síncope vasovagal.
 - b) Las reacciones alérgicas moderadas.
 - c) Las convulsiones.
 - d) Los ataques de asma.
67. **Señale la afirmación incorrecta:**
- a) La apexogénesis describe el desarrollo continuo y fisiológico de la raíz con el cierre apical.
 - b) La apexificación hace referencia al procedimiento para conseguir el cierre apical.
 - c) La revascularización pulpar se aplica a dientes con el ápice cerrado.
 - d) El recubrimiento pulpar indirecto puede aplicarse en dientes con lesiones de caries profundas.
68. **Señale la respuesta correcta en relación con la pulpitis:**
- a) Una respuesta prolongada después del estímulo, con dolor espontáneo, orientará hacia el diagnóstico de pulpitis irreversible.
 - b) El dolor inducido por estímulos que cesa al desaparecer estos suele ser un indicio más favorable del estado pulpar.
 - c) La sensibilidad a la presión puede indicar que la inflamación de la pulpa se ha extendido al ligamento periodontal.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
69. **Señale la respuesta correcta en relación con la periodontitis:**
- a) La gingivitis no tratada siempre evoluciona hacia la periodontitis.
 - b) El cálculo subgingival está invariablemente presente en los sitios enfermos.
 - c) Solo la placa bacteriana es la que determina la patogenia y la tasa de progresión de la enfermedad.
 - d) Las respuestas *b* y *c* son correctas.

- 70. Señale la respuesta correcta respecto a la enfermedad periodontal necrosante:**
- a) Rara vez presenta bolsas profundas.
 - b) La halitosis es patognomónica de la enfermedad periodontal necrosante.
 - c) La fiebre y el malestar general son características constantes.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 71. En los casos de incisión alveolar de varios centímetros, es falso que la sutura continua...**
- a) ...facilita mayor rapidez en la ejecución.
 - b) ...proporciona menos nudos que acumulen placa bacteriana.
 - c) ...hay mayor riesgo de dehiscencia si no se aseguran bien el nudo inicial y el final.
 - d) ...habrá más inflamación que con puntos simples.
- 72. Respecto al procedimiento terapéutico conocido como extracción seriada, ¿cuál es la cronología correcta?**
- a) 1) Extracción de caninos temporales; 2) extracción de primeros molares temporales, y 3) extracción de segundos molares temporales.
 - b) 1) Extracción de caninos temporales; 2) extracción de primeros molares temporales, y 3) extracción de primeros bicúspides.
 - c) 1) Extracción de primeros molares temporales; 2) extracción de segundos molares temporales, y 3) extracción de primeros bicúspides.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- 73. Al explorar la cavidad oral de un paciente con diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, ¿qué hay que tener en cuenta?**
- a) El eritema lingual en alas de mariposa es patognomónico de esta enfermedad.
 - b) La lesión oral más frecuente son las úlceras erosivas.
 - c) La mayoría de los pacientes padecen sialorrea.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.



74. Señale la respuesta correcta sobre el ameloblastoma sólido:

- a) Es una neoplasia benigna pero localmente invasiva. Su crecimiento es lento.
- b) Se recomienda la eliminación quirúrgica con un margen mínimo de 5 mm de hueso sano, ya que tiende a infiltrar el tejido adyacente.
- c) Aparece radiográficamente como una lesión radiolúcida multiloculada, con el típico aspecto en pompas de jabón.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

75. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente de producción de un mucocele?

- a) Obstrucción del conducto de saliva.
- b) Extravasación de fluido de los conductos o de los acinis.
- c) Dilatación de los conductos.
- d) Destrucción de los acinis glandulares.

76. Señale el índice CAOD de un paciente de dieciocho años que presenta una obturación por caries en el 16, una corona de cerámica por caries en el 26, dos sellados en los molares 36 y 46 y una obturación por caries en la pieza 85.

- a) 1.
- b) 2.
- c) 4.
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

77. Señale la respuesta incorrecta respecto a la enfermedad periodontal:

- a) La furcación de los primeros molares superiores entre la raíz mesiovestibular y la palatina se explora mejor desde vestibular.
- b) El tabaquismo es el segundo factor de riesgo en la patogenia de la enfermedad periodontal.
- c) La ausencia de sangrado en el sondeo con una presión de 25 N tiene un valor predictivo negativo alto.
- d) La profundidad de la bolsa no mide la extensión de la pérdida de inserción.

- 78. Es falso que el botador de Pott...**
- a) ...proporciona difícil acceso en la exodoncia del cordal superior.
 - b) ...permite obtener una fuerza sensiblemente menor que con el botador de Winter.
 - c) ...tiene un mango más pequeño y fino que otros botadores en T.
 - d) ...tiene la punta roma.
- 79. ¿Cuál de las siguientes lesiones orales puede considerarse asociada a una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)?**
- a) Leucoplasia vellosa.
 - b) Sarcoma de Kaposi.
 - c) Candidiasis pseudomembranosa.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 80. Señale la afirmación falsa en relación con el carcinoma oral de células escamosas (COCE):**
- a) Las localizaciones más frecuentes son la lengua, el suelo de la boca y la zona del paladar blando / pilar amigdalino.
 - b) Las lesiones iniciales suelen aparecer como eritroplasias acompañadas o no de lesiones de color blanco de tipo asintomático.
 - c) La forma clínica más frecuente de las lesiones avanzadas es la exofítica con base y bordes infiltrados.
 - d) El diagnóstico definitivo del COCE se confirma por medio de un estudio histopatológico.
- 81. ¿Cuál sería el diagnóstico de presunción ante este cuadro clínico?: mujer de veinticinco años con historia de ruidos articulares, que presenta dolor en la apertura mandibular desde el momento en que intentó morder una manzana; limitación en la apertura (22 mm) con desviación hacia la derecha; al aplicar fuerza sobre los incisivos inferiores no se produce aumento alguno en la apertura; movimiento de lateralidad derecha normal con limitación de la lateralidad izquierda:**
- a) Luxación discal derecha sin reducción.
 - b) Luxación discal izquierda sin reducción.
 - c) Luxación discal derecha con reducción.
 - d) Luxación discal izquierda con reducción.

- 82. Señale la respuesta incorrecta en relación con el índice diagnóstico ICDAS:**
- a) Establece más criterios diagnósticos de evolución de la lesión que el índice CAOD.
 - b) Diferencia entre visión con diente húmedo y diente seco.
 - c) Una lesión de caries según el ICDAS también será lesión de caries en el índice CAOD.
 - d) Diferencia entre diferentes tamaños de la lesión de caries.
- 83. En los escolares de hasta seis años de edad con riesgo alto de caries, ¿con qué frecuencia se recomienda aplicar un barniz de flúor?**
- a) 3-4 veces al año.
 - b) 1 vez al año.
 - c) 2 veces al año, como máximo.
 - d) 2 veces al año únicamente si tienen más de tres años de edad.
- 84. Señale la respuesta correcta en cuanto a la hemostasia en la cirugía bucal:**
- a) No se puede influir preoperatoriamente en el control de la hemostasia.
 - b) Es aconsejable que el paciente se enjuague con un colutorio antiséptico las primeras 24 horas postoperatorias para ayudar a controlar la hemostasia.
 - c) El ácido tranexámico favorece la hemostasia.
 - d) El anestésico local utilizado no influye en el sangrado en la cirugía bucal.
- 85. En un caso de hiperémesis gravídica, ¿qué medida hay que aconsejar a la gestante?**
- a) Enjuagarse con abundante agua después de vomitar.
 - b) Cepillarse inmediatamente los dientes después de vomitar.
 - c) Evitar los colutorios con flúor.
 - d) No usar dentífricos con más de 1.000 ppm.
- 86. Para una exodoncia quirúrgica de un tercer molar mandibular incluido, es falso que...**
- a) ...si es horizontal, hay que hacer la odontosección coronal completa.
 - b) ...para hacer la incisión hay que palpar la línea oblicua externa de la rama mandibular.
 - c) ...la coronectomía no es una opción terapéutica actualmente.
 - d) ...el despegamiento del colgajo debe ser de medial a distal.

- 87. Señale la respuesta correcta en cuanto a la hiposecreción salival o hiposialia:**
- a) Se considera que un paciente tiene hiposecreción salivar cuando los valores de la tasa de flujo salival son inferiores a 0,5 ml/min en la saliva estimulada e inferiores a 0,1 ml en la saliva no estimulada.
 - b) La hiposecreción salivar siempre cursa con xerostomía.
 - c) La sensación de boca seca es atribuible habitualmente a la hipofunción de las glándulas salivales mayores.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
- 88. Señale la respuesta incorrecta sobre la técnica de la toma de biopsias de la mucosa oral:**
- a) Debe hacerse con un bisturí frío convencional o con un bisturí circular o *punch*.
 - b) El *punch* se desaconseja en las biopsias incisionales de zonas de acceso difícil.
 - c) La biopsia ha de abarcar todo el espesor de la lesión.
 - d) La muestra obtenida debe sumergirse en formol al 10 %.

Preguntas de reserva

- 89. ¿Cuál es la dosis efectiva máxima de rayos X para el personal radioexpuesto (personal ocupacional)?**
- a) 100 mSv en un periodo de cinco años sin superar los 50 mSv en un año.
 - b) 50 mSv en un periodo de cinco años sin superar los 10 mSv en un año.
 - c) 100 mSv en un periodo de veinte años sin superar los 5mSv en un año.
 - d) 50 mSv en un periodo de cinco años sin superar los 500 mSv en un año.
- 90. La displasia de Capdepot se conoce también como...**
- a) ...dentinogénesis imperfecta.
 - b) ...amelogénesis imperfecta.
 - c) ...displasia dentinaria radicular.
 - d) ...odontodisplasia regional.

91. En caso de encontrarse en la consulta de odontología solo y sin ayuda y un paciente adulto pierde la conciencia y respira de forma anormal, ¿cuál es el orden de actuación recomendado?
- a) 2 ventilaciones ⇒ 30 compresiones torácicas ⇒ llamar al servicio de emergencias.
 - b) 30 compresiones torácicas ⇒ 2 ventilaciones ⇒ llamar al servicio de emergencias.
 - c) Llamar al servicio de emergencias ⇒ 2 ventilaciones ⇒ 30 compresiones torácicas.
 - d) Llamar al servicio de emergencias ⇒ 30 compresiones torácicas ⇒ 2 ventilaciones.
92. Señale el porcentaje de escolares que presentan en España como mínimo un sellado de fisuras según los datos de la Encuesta de Salud Oral de 2021:
- a) 12,5 %.
 - b) 22,6 %.
 - c) 25,1 %.
 - d) 32,2 %.
93. Señale la respuesta incorrecta sobre el linfoma no Hodgking (LNH):
- a) Es la segunda neoplasia más común de la región maxilofacial después del carcinoma oral de células escamosas.
 - b) Se manifiesta como tumoraciones blandas, asintomáticas y de coloración normal, rojiza o rojo-azulada localizadas en el paladar o las encías.
 - c) Existe un riesgo aumentado de LNH en pacientes con síndrome de Sjögren u otras enfermedades autoinmunitarias.
 - d) Tienen peor pronóstico que el linfoma de Hodgking.
94. Señale la afirmación verdadera:
- a) La gingivoestomatitis herpética primaria ocurre generalmente durante la infancia y se caracteriza por presentar síntomas prodrómicos y lesiones que afectan únicamente a la mucosa queratinizada.
 - b) El herpes recurrente se presenta más a menudo en la mucosa masticatoria como vesículas en ramillete que se ulceran y dejan una erosión.
 - c) El virus de la varicela zóster causa vesículas que se transforman en pústulas y luego se ulceran, se secan y forman costras. Estas lesiones se presentan generalmente en niños.
 - d) Todas las respuestas anteriores son incorrectas.

95. Para escoger la zona donde hay que hacer una biopsia de una lesión extensa se puede utilizar el test de azul de toluidina. Señale la afirmación cierta:
- a) Se utiliza una tinción de azul de toluidina al 20 % en solución acuosa.
 - b) Se complementa con ácido acético al 20 % en solución acuosa.
 - c) Se puede utilizar con el método de enjuagues sucesivos.
 - d) No da resultados falsos negativos.
96. Señale la afirmación correcta según la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud pública:
- a) Los ciudadanos han de facilitar el desarrollo de las actuaciones de salud pública y deben abstenerse de conductas que dificulten, impidan o falseen la ejecución de dichas actuaciones.
 - b) Los ciudadanos tienen la obligación de ayudar a los sanitarios en su profesión.
 - c) Los ciudadanos han de velar por cumplir correctamente la ley.
 - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
97. ¿Qué alteración dental se detecta más a menudo en los pacientes con fisura labiopalatina?
- a) Supernumerarios.
 - b) Microdoncia.
 - c) Ectopia.
 - d) Agenesias.
98. Señale la respuesta correcta respecto al síndrome de boca ardiente:
- a) Interfiere en el sueño.
 - b) Empeora al comer o beber.
 - c) En el secundario, si se trata la causa el proceso mejora y puede llegar a desaparecer.
 - d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

99. La presencia de un cloroma en la mucosa oral es muy sugerente de que el paciente padezca...
- a) Hepatitis vírica.
 - b) Leucemia.
 - c) Insuficiencia renal.
 - d) Cirrosis hepática.
100. ¿En cuál de las situaciones siguientes hay mayor probabilidad de que una paciente que ha tomado bifosfonatos sufra una osteonecrosis de los maxilares?
- a) Colocación de un implante dental.
 - b) Cirugía periodontal.
 - c) Exodoncia.
 - d) Presencia de úlceras por decúbito producidas por prótesis removibles mal ajustadas.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I SERVEI SALUT
B ILLES BALEARS
/