

Examen del concurs oposició per optar a places de la categoria odontòleg-estomatòleg / odontòloga-estomatòloga del Servei de Salut de les Illes Balears

Observacions:

- Aquest qüestionari consta de 72 preguntes en total. De la 61 a la 72 són preguntes de reserva per si alguna de la 1 fins a la 60 resulta impugnada.
- Les pàgines del quadern estan numerades; comprovau-ne el contingut fins a la darrera pàgina. Si detectau alguna anomalia en la impressió del qüestionari, demanau que us el canviïn.
- Per a cada pregunta només hi ha una resposta correcta entre les quatre possibles.
- Cada resposta correcta es valora amb 1 punt, de manera que la valoració total de l'examen és de 60 punts. Cal respondre les preguntes de reserva, encara que en principi només es puntuaran les preguntes 1-60. Cada resposta errònia es penalitza amb una quarta part del valor d'una de correcta. Les respostes en blanc i les que contenguin més d'una alternativa marcada no es valoren.
- **Heu de senyalar les respostes en el full òptic que us han entregat. Llegiu molt atentament les instruccions que hi figuren.**
- El temps per completar la prova és **120 minuts (dues hores), inclòs el temps per senyalar les respostes en el full òptic.**
- Podeu utilitzar el qüestionari com a esborrany. Una vegada acabat l'examen, us el podeu endur.

Advertiments:

- No obriu el qüestionari fins que no us ho indiquin.
- No faceu cap mena de marca ni signatura que pugui desvirtuar els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.
- Únicament podeu emprar bolígraf negre o blau.
- No és permès emprar calculadora.
- Durant la prova no podeu dur damunt ni tenir damunt la taula cap aparell electrònic, ni tan sols apagat.
- Abans de començar la prova, algun membre del tribunal o algun dels seus col·laboradors haurà explicat les instruccions. Si no n'heu entès alguna, demanau-li que us l'aclareixi.
- El fet de concórrer a aquesta prova suposa acceptar aquestes instruccions, sense detriment del dret a interposar-hi una reclamació o un recurs.
- Incomplir qualsevol d'aquests advertiments pot suposar l'exclusió de la prova.



1. **Respecte de les zones que s'anestesien en infiltrar anestèsic local al nervi palatí anterior, senyalau la resposta incorrecta:**
 - a) La geniva palatina de la incisiva lateral superior.
 - b) La geniva palatina de la tercera molar superior.
 - c) La geniva palatina de la segona premolar superior.
 - d) El periosti i el paladar ossi de la primera molar superior.

2. **No es considera normal una producció de saliva diària de...**
 - a) 1.200 cm³.
 - b) 750 cm³.
 - c) 180 cm³.
 - d) 1.300 cm³.

3. **Segons l'evidència científica actual, quin material es pot utilitzar per al segellat preventiu de les fissures oclusives?**
 - a) Amalgama de plata.
 - b) Resina.
 - c) Ionòmer de vidre.
 - d) Les respostes b) i c) són correctes.

4. **L'ús d'anestèsics locals amb vasoconstrictor presenta alguns avantatges a l'hora de fer un tractament odontològic. Senyalau l'afirmació incorrecta:**
 - a) Incrementa la durada de l'efecte anestèsic.
 - b) Augmenta l'absorció de l'anestèsic local en el flux sanguini.
 - c) Millora la qualitat de l'anestèsia.
 - d) Disminueix l'hemorràgia.

5. **Senyalau la resposta incorrecta sobre la síndrome d'hipomineralització incisivomolar (MIH):**
 - a) És freqüent la sensibilitat tèrmica i mecànica, que va de lleugera a extrema.
 - b) Es recomana emprar un dentífric desensibilitzador abans del tractament restaurador.
 - c) Les càries associades solen ser de progressió ràpida.
 - d) És més fàcil obtenir una anestèsia correcta de la dent afectada.



6. **Quin dels antibiòtics següents NO es pot prescriure a un pacient que refereixi tenir al·lèrgia als betalactàmics?**
- a) Cefalexina.
 - b) Clindamicina.
 - c) Doxiciclina.
 - d) Azitromicina.
7. **Senyalau la definició d'escolar sense càries a l'edat de vuit anys segons el criteri de l'Organització Mundial de la Salut:**
- a) Escolar que presenta totes les lesions de càries tractades de manera conservadora.
 - b) Escolar que presenta un índex CAOD igual a zero.
 - c) Escolar que no presenta cap lesió de càries.
 - d) Les respostes a) i c) són correctes.
8. **Quina de les respostes següents és un tumor mesenquimàtic?**
- a) Fibroma.
 - b) Queratoacantoma.
 - c) Nevus.
 - d) Papiloma.
9. **Quin dels fàrmacs següents es considera de primera elecció en el tractament de l'osteonecrosi dels maxil·lars (ONM)?**
- a) Metronidazole.
 - b) Amoxicil·lina-clavulànic.
 - c) Vibramicina®.
 - d) Eritromicina.
10. **Quina pot ser la causa del retard eruptiu de la dentició temporal?**
- a) La disostosi clidocranial.
 - b) L'hipotiroïdisme.
 - c) La fibromatosi gingival.
 - d) Totes les respostes anteriors són correctes.



- 11. Quin dels fàrmacs següents no pertany al grup dels anticoagulants?**
- a) Acenocumarol.
 - b) Bemiparina.
 - c) Rivaroxaban.
 - d) Àcid aminocaproic.
- 12. En el cas d'una pacient exfumadora remesa des de la consulta d'oncologia abans de tractar amb radioteràpia una neoplàsia de laringe, quines recomanacions proposaríeu?**
- a) Emprar sal fluorada en totes les menjades habituals.
 - b) Mantenir la cura habitual de la boca com abans de la teràpia.
 - c) Eliminar qualsevol afecció bucal abans de la teràpia, emprar pasta dentifrícia de 5.000 ppm de fluor per millorar la prevenció de la càries i acudir a una revisió bucodental cada tres mesos.
 - d) Extreure totes les dents per evitar patologies futures derivades de la càries o de la malaltia periodontal.
- 13. Segons recomana l'Associació Europea d'Odontopediatria, a partir de quin moment cal iniciar el raspallat amb pasta dental fluorada?**
- a) Amb l'inici de l'erupció dental.
 - b) Als 12 mesos.
 - c) Als 24 mesos.
 - d) Als 36 mesos.
- 14. Senyalau l'afirmació correcta:**
- a) Un queixal extremer es considera inclòs si està parcialment cobert per mucosa.
 - b) Un queixal extremer es considera semiinclòs si és parcialment visible o està en comunicació amb la cavitat oral.
 - c) Una dent inclosa és el que assoleix el pla oclusiu després que les arrels es tanquin per complet.
 - d) Una dent inclosa mai no és un factor de risc de càries ni de malaltia periodontal.



- 15. Quina d'aquestes característiques és un desavantatge del compòsit respecte de l'amalgama de plata?**
- a) Permet la tècnica adhesiva.
 - b) Suporta teixit afeblit.
 - c) És una tècnica sensible a la humitat.
 - d) Té bona estètica.
- 16. Segons l'Associació Americana de Cirurgians Orals i Maxilofacials, quina de les respostes següents es pot considerar un criteri diagnòstic de l'osteonecrosi dels maxil·lars per bifosfonats?**
- a) L'exposició d'os necròtic al territori maxil·lar d'almenys vuit dies de durada.
 - b) Els antecedents de radioteràpia del cap i del coll.
 - c) Els antecedents de prendre bifosfonats o prendre'n actualment.
 - d) Totes les respostes anteriors són correctes.
- 17. En la maloclusió de classe II divisió 1a s'observa...**
- a) ...augment del ressalt.
 - b) ...proïnclinació de les incisives inferiors.
 - c) ...primera molar inferior en relació mesial respecte de la superior.
 - d) Totes les respostes anteriors són correctes.
- 18. Quin dels fàrmacs següents pot produir hiperplàsia gingival si es consumeix durant molt de temps?**
- a) Fenitoïna.
 - b) Ciclosporina.
 - c) Nifedipina.
 - d) Tots les respostes anteriors són correctes.
- 19. Segons l'evidència científica, senyalau l'afirmació correcta respecte de l'extracció quirúrgica de la tercera molar:**
- a) No hi ha criteris clínics ni radiològics preoperatoris que es relacionin amb el grau de dificultat quirúrgica.
 - b) Cal fer, com a mínim, una ortopantomografia per a l'estimació preoperatoria del grau de dificultat quirúrgica.
 - c) El curs postoperatori no depèn de la dificultat quirúrgica.
 - d) La ressonància magnètica nuclear està indicada de manera rutinària.

- 20. Recaldent® (fosfopèptid de caseïna de fosfat de calci amorf, o CPP-ACP) és un derivat...**
- a) ...de l'esmalt boví.
 - b) ...de la proteïna de la llet.
 - c) ...de l'amoni.
 - d) ...de la galactosa.
- 21. Senyalau l'afirmació incorrecta respecte de l'eliminació de la càries:**
- a) La remoció manual sol ser més ben tolerada pels infants.
 - b) La remoció mecànica és més lenta.
 - c) La remoció mecànica pot produir dany pulpar per la calor que provoca la fressa.
 - d) Per a la remoció de la dentina cariada es poden utilitzar excavadors de dentina.
- 22. Senyalau l'afirmació correcta respecte del recontornejat ossi en la cirurgia periodontal:**
- a) L'estètica mai condiona la magnitud de l'eliminació òssia.
 - b) La presència de furcacions no limita l'extensió del recontornejat.
 - c) La morfologia del defecte i la quantitat de periodonci condicionen el tractament.
 - d) Les respostes a) i c) són correctes.
- 23. Senyalau l'afirmació correcta:**
- a) La diabetis *mellitus* de tipus 2 mal controlada s'associa a una prevalença més alta i una gravetat més acusada de la malaltia periodontal.
 - b) La diabetis *mellitus* de tipus 1 mal controlada s'accepta com a factor de risc en l'aparició de periodontitis.
 - c) Les respostes a) i b) són correctes.
 - d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
- 24. Quin és el nevus més freqüent a la cavitat oral?**
- a) Nevus compost.
 - b) Nevus de la unió.
 - c) Nevus intramucós.
 - d) Nevus blau.



- 25. Una pacient que ha tingut bastants problemes de càries durant tota la vida demana com pot evitar que li passi el mateix al seu fill de sis anys. Què li heu de recomanar com a mesura principal?**
- a) Emprar una quantitat de pasta dental de la mida d'un pèsol de concentració d'1.450 ppm de fluor almenys dues vegades al dia.
 - b) Emprar una pasta dental fluorada de 500 ppm tres vegades al dia.
 - c) Beure aigua molt fluorada amb més de 9 ppm d'ió de fluor.
 - d) Emprar una quantitat de pasta dental de la mida d'un gra d'arròs de concentració d'1.450 ppm de fluor almenys dues vegades al dia.
- 26. Senyalau l'afirmació falsa segons l'enquesta de salut oral d'Espanya de 2020:**
- a) Si s'analitza l'evolució de la càries en la dentició temporal del grup d'edat de 5-6 anys s'observa que es va mantenir en uns nivells estables en el període 1993-2020.
 - b) En els joves de 15 anys, el nivell social s'associa a la prevalença de la càries.
 - c) En el grup d'infants de 5-6 anys s'observa un índex menor de càries en la dentició temporal dels nascuts a Espanya.
 - d) El sexe determina l'índex de càries radicular en la cohort de 65 a 74 anys, que és més alt entre les dones.
- 27. Com es denomina una lesió traumàtica dels teixits periodontals en els quals no hi ha mobilitat ni desplaçament anormal de la dent, però amb evident reacció a la percussió?**
- a) Luxació intrusiva.
 - b) Luxació extrusiva.
 - c) Subluxació.
 - d) Concussió.
- 28. Quina és la complicació oral més freqüent en un pacient que ha rebut radioteràpia del cap i del coll?**
- a) La disfàgia.
 - b) La mucositis.
 - c) L'agèusia.
 - d) L'osteoradionecrosi.

29. De les tècniques següents per controlar la conducta dels pacients pediàtrics, quina no és una tècnica de comunicació?

- a) Distracció.
- b) Reforç positiu.
- c) Restricció física.
- d) Control de la veu.

30. Quin dels elements anatòmics següents no és a l'espai submaxil·lar?

- a) La glàndula submaxil·lar.
- b) El conducte de Stenon.
- c) El nervi lingual.
- d) El nervi hipoglòs.

31. Quin dels següents virus de l'hepatitis no és del tipus ARN?

- a) Virus de l'hepatitis A.
- b) Virus de l'hepatitis B.
- c) Virus de l'hepatitis C.
- d) Virus de l'hepatitis D.

32. A quina edat es relaciona el risc de fluorosi en premolars i segones molars amb la ingesta excessiva de fluor?

- a) En el rang d'1 a 3 anys.
- b) En el primer any de vida.
- c) En el rang de 7 a 8 anys.
- d) En el rang de 4 a 6 anys.

33. Senyalau l'afirmació vertadera respecte del material per suturar en cirurgia oral:

- a) La humitat i la microflora bacteriana a penes afecten la sutura.
- b) En general, s'han de llevar els punts de sutura al cap de vint dies.
- c) S'empra exclusivament l'agulla cilíndrica atraumàtica.
- d) El nombre creixent de zeros en la mida del material de sutura indica un diàmetre decreixent.



- 34. Senyalau l'afirmació falsa respecte de l'extracció quirúrgica d'una tercera molar superior inclosa o seminclosa:**
- a) Pot produir la ruptura de la tuberositat del maxil·lar superior.
 - b) La profunditat de la inclusió és un factor de risc de complicacions.
 - c) L'os del maxil·lar superior sol ser més dens que el del maxil·lar inferior.
 - d) Les complicacions després de l'extracció de la tercera molar són menys freqüents al maxil·lar superior que a la mandíbula.
- 35. Senyalau l'afirmació vertadera respecte del tractament de la leucoplàsia:**
- a) Cal eliminar els agents etiològics i, si no hi ha canvis substancials al cap de 2-4 setmanes, es farà la biòpsia.
 - b) En lesions petites s'ha de fer una biòpsia per excisió amb marges de seguretat.
 - c) Si es tracta d'una leucoplàsia displàsica, s'ha d'extirpar quirúrgicament i fer-ne una revisió cada tres mesos.
 - d) Totes les afirmacions anteriors són vertaderes.
- 36. És cert que durant l'embaràs...**
- a) ...no augmenta el risc de patir gingivitis.
 - b) ...hi ha una tendència a la hipertensió en la posició de decúbit supí.
 - c) ...es poden fer tractaments pulpars.
 - d) ...està contraindicat fer raspaments i allisaments radiculars.
- 37. En un cas de pèrdua prematura de la primera molar temporal abans de la intercuspidació de les primeres molars permanents, quina actitud terapèutica és la correcta?**
- a) Abans de la pèrdua d'espai: mantenidor corona-ansa.
 - b) Després de la pèrdua d'espai: recuperador d'espai.
 - c) Mantenir la retenció fins que la primera premolar erupcioní parcialment.
 - d) Totes les respostes anteriors són correctes.



- 38. Quin dels procediments següents no està inclòs en la cartera bàsica de serveis de l'atenció bucodental a l'atenció primària?**
- a) Tractament de processos aguts odontològics.
 - b) Informació i educació per a la salut bucodental.
 - c) Exodòncia de peces dentals per indicació ortodòntica.
 - d) Realització de biòpsies de lesions mucoses.
- 39. Senyalau la resposta correcta sobre la cel·lulitis facial odontogènica:**
- a) Com a norma general, el pacient sol estar afebril.
 - b) Encara no s'ha format l'exsudat purulent.
 - c) No hi ha els signes clàssics de la inflamació (dolor, rubor, calor i tumor).
 - d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
- 40. Senyalau l'afirmació vertadera:**
- a) En l'hemofília A hi ha un dèficit del factor IX de la coagulació.
 - b) En l'hemofília B hi ha un dèficit del factor VIII de la coagulació.
 - c) La malaltia de Von Willebrand afecta la coagulació.
 - d) L'hemofília és un trastorn hemorràgic hereditari lligat al cromosoma Y
- 41. Senyalau l'afirmació vertadera sobre la candidiasi:**
- a) En el muguet, la simptomatologia està en relació amb l'extensió de la lesió.
 - b) La forma aguda de la candidiasi es pot presentar en forma nodular o en plaques.
 - c) És freqüent que la forma eritematosa crònica de la candidiasi tengui una imatge doble en mirall.
 - d) Totes les afirmacions anteriors són vertaderes.

- 42. Senyalau l'afirmació correcta en relació amb les proves radiològiques dentals durant el primer trimestre de la gestació:**
- a) La tècnica d'elecció és l'ortopantomografia.
 - b) La radiografia periapical no es considera un mètode segur en cap cas.
 - c) En cap cas es pot fer una exploració radiològica.
 - d) És preferible utilitzar la radiologia amb sistemes de digitalització de la imatge.
- 43. Com es denomina la dosi de radiació absorbida corregida pel diferent dany que produeixen els diferents tipus de radiació (factors de ponderació de la radiació)?**
- a) Dosi absorbida.
 - b) Dosi equivalent.
 - c) Dosi efectiva.
 - d) Dosi letal.
- 44. Senyalau l'afirmació correcta en relació amb la cura oral del nounat:**
- a) Els gèrmens cariògens presents en la saliva de la mare poden passar al bebè per compartir culleres, biberons o xumets.
 - b) Els bacteris cariògens són l'únic factor que determina l'aparició de càries en el bebè.
 - c) La lactància materna sempre augmenta el risc de càries en el bebè.
 - d) El sucre de la llet materna (és a dir, la fructosa) és menys cariogen que la sacarosa.
- 45. Senyalau la resposta correcta en relació amb el vernís de fluor:**
- a) La concentració habitual aproximada de fluorur de sodi és de 23.000 ppm.
 - b) Després d'aplicar-lo no fa falta esperar gens per menjar o beure.
 - c) No es pot utilitzar en infants de menys de sis anys.
 - d) Habitualment, la freqüència d'aplicació és anual.

- 46. Senyalau la resposta correcta en relació amb el cas d'un penjall per exodòncia quirúrgica d'un queixal extremer inferior quan es fa la incisió de descàrrega:**
- a) La descàrrega s'ha de fer cap a mesial.
 - b) Amb la descàrrega hi ha més risc d'esquinçament.
 - c) Amb la descàrrega es crea més tensió en el penjall.
 - d) La descàrrega s'ha de fer sobre la bisectriu de la papiña interdental.
- 47. Quin dels materials següents es pot utilitzar per al recobriment pulpar directe?**
- a) Hidròxid de calci.
 - b) Agregat de triòxid mineral (MTA).
 - c) Silicat tricàlcic (Biodentine™).
 - d) Totes les respostes anteriors són correctes.
- 48. En el cas d'un pacient classificat com de risc molt alt de presentar conseqüències adverses a causa de l'endocarditis, en quin dels procediments següents es recomana la profilaxi antibiòtica?**
- a) Raspament i allisament radicular.
 - b) Sondatge amb sonda periodontal en una visita de manteniment.
 - c) Col·locació de bandes ortodòntiques.
 - d) Totes les respostes anteriors són correctes.

49. **Quina és la definició de *consentiment informat* segons la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica?**
- a) La conformitat lliure, voluntària i conscient d'un pacient, manifestada en el ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada, perquè tengui lloc una actuació que afecta la seva salut.
 - b) La conformitat lliure, involuntària i conscient d'un pacient, manifestada en el ple ús de les seves facultats abans de rebre la informació adequada, perquè tengui lloc una actuació que afecta la seva salut.
 - c) La conformitat lliure, involuntària i conscient d'un pacient, manifestada quan ja no està en el ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada, perquè tengui lloc una actuació que afecta la seva salut.
 - d) La conformitat induïda, involuntària però conscient d'un pacient, manifestada en el ple ús de les seves facultats després de rebre la informació adequada, perquè tengui lloc una actuació que afecta la seva salut.
50. **D'acord amb l'article 39 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, el treballador que estigui en la situació de comissió de serveis...**
- a) ...perd la seva plaça o lloc de feina d'origen.
 - b) ...perd la condició de personal estatutari fix.
 - c) ...no pot participar en els concursos de trasllats que es convoquin.
 - d) ...té dret a la reserva de la seva plaça o lloc de feina d'origen.
51. **En el cas d'un pacient adult de 60 quilos de pes que ha patit un xoc anafilàctic a la consulta d'odontologia, quin fàrmac s'ha d'utilitzar com a tractament primari i en quina dosi?**
- a) Entre 0,3 i 0,5 mg d'adrenalina per la via subcutània en una dosi única.
 - b) Entre 0,3 i 0,5 mg d'adrenalina per la via intramuscular i repetint les dosis, si fa falta, cada 5-10 minuts.
 - c) Entre 0,3 i 0,5 mg d'adrenalina per la via intramuscular en una dosi única.
 - d) 0,03 mg d'adrenalina per la via intravenosa més 600 mg de metilprednisolona per la via intravenosa.



- 52. Indicau l'índex CAOD d'un pacient que presenta un segellat amb resina a la peça dental 46, pèrdua de les peces 36 i 37 a causa de càries, dues facetes dentals a les peces 11 i 21 com a tractament d'un traumatisme i una amalgama de plata a la peça 16 per tractar la càries:**
- a) 2.
 - b) 3.
 - c) 4.
 - d) 6.
- 53. En què consisteix la prevenció primària en el càncer oral?**
- a) A deixar de fumar.
 - b) En el diagnòstic precoç.
 - c) A prevenir l'aparició de metàstasi.
 - d) Les respostes a) i b) són correctes.
- 54. Si es fa un test d'INR per valorar l'hemostàsia secundària d'un pacient abans d'una biòpsia de la mucosa jugal, ¿amb quin resultat ajornaríeu aquest tractament?**
- a) INR = 1.
 - b) INR = 2.
 - c) INR = 2,5.
 - d) Cap de les respostes anteriors és correcta.
- 55. Senyalau l'afirmació incorrecta respecte de la llengua geogràfica:**
- a) L'etiologia és desconeguda.
 - b) Sol ser asimptomàtica.
 - c) Requereix tractament actiu.
 - d) Les lesions es corresponen amb una pèrdua de papil·les filiformes.
- 56. Quina de les respostes següents no és una causa d'extinció de la condició de personal estatutari fix?**
- a) La renúncia.
 - b) La jubilació.
 - c) La sanció disciplinària ferma de separació del servei.
 - d) La incapacitat temporal.

- 57. Senyalau l'afirmació vertadera sobre la fissura labiopalatina:**
- a) És la malformació craniofacial congènita més freqüent.
 - b) A Espanya apareix en aproximadament un de cada vuit-cents nascuts vius.
 - c) La prevalença varia de manera significativa segons la raça.
 - d) Totes les afirmacions anteriors són vertaderes.
- 58. Senyalau l'afirmació incorrecta sobre les persones amb síndrome de Down:**
- a) En els infants, tant les dents de llet com les permanents solen erupcionar abans en comparació amb els infants que no pateixen aquesta síndrome.
 - b) Tenen macroglòssia.
 - c) Les seves dents són més petits de l'habitual i poden presentar agenèsies més sovint.
 - d) Sovint presenten la mossegada oberta anterior.
- 59. Plantejau-vos el cas següent: dona amb història de renous articulars que debuta amb dolor en mossegar una poma. L'exploració de l'articulació temporomandibular mostra obertura bucal limitada i amb desviació a la dreta i moviment de lateralitat dreta normal i de lateralitat esquerra limitat. A més, l'aplicació de força sobre les incisives inferiors no augmenta l'obertura.**
- Quin seria el diagnòstic de presumpció d'aquest quadre clínic?**
- a) Luxació discal esquerra sense reducció.
 - b) Luxació discal dreta sense reducció.
 - c) Luxació discal esquerra amb reducció.
 - d) Luxació discal dreta amb reducció.
- 60. En el cas d'un pacient de set anys i molt poc col·laborador que presenta pèrdua prematura de la segona molar temporal inferior, quin mantenidor d'espai hi està indicat?**
- a) Cap: s'ha d'esperar que col·labori.
 - b) Un mantenidor fix.
 - c) Un mantenidor removable.
 - d) Una placa de resina amb ganxos a les molars.

- 61. Quina de les següents cel·lulitis del maxilar inferior no sol cursar amb tumefacció facial?**
- a) Cel·lulitis mentoniana.
 - b) Cel·lulitis migratòria de Chompret.
 - c) Cel·lulitis d'Escat.
 - d) Cel·lulitis geniana baixa.
- 62. Senyalau l'afirmació incorrecta sobre l'amelogènesi imperfecta:**
- a) L'estructura defectuosa de la dent es limita a l'esmalt.
 - b) Afecta tant la dentició primària com la permanent.
 - c) Sovint té correlació amb l'osteogènesi imperfecta.
 - d) Pot ser de transmissió genètica.
- 63. En el cas d'un pacient amb discapacitat visual, quina tècnica de control de la conducta cal utilitzar?**
- a) Ensenyar - dir - fer.
 - b) Dir - tocar - provar - ensumar - fer.
 - c) Tocar - ensumar - fer.
 - d) Tocar - ensumar - fer olor.
- 64. A quin àmbit és aplicable la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals?**
- a) A la policia, la seguretat i a les duanes.
 - b) A les relacions laborals regulades per l'Estatut dels treballadors i a les relacions de caràcter administratiu o estatutari del personal al servei de les administracions públiques.
 - c) Als serveis operatius de protecció civil i al peritatge forense en els casos de risc greu, catàstrofe i calamitat pública.
 - d) A les forces armades i a les activitats militars de la Guàrdia Civil.
- 65. La maniobra de Nelaton s'utilitza per resoldre una de les complicacions següents. Senyalau quina:**
- a) Fractura de la tuberositat.
 - b) Luxació mandibular bilateral.
 - c) Fractura mandibular.
 - d) Luxació mandibular unilateral.

- 66. Senyalau en quin cas no hi ha necessitat d'anestesià el nervi nasopalatí:**
- a) Exodòncia quirúrgica d'una canina inclosa en el paladar.
 - b) Fenestració palatina d'incisives i canines retingudes.
 - c) Exodòncia del mesiodens.
 - d) Tractament quirúrgic de quists propers a la cortical del paladar en el nivell de les molars superiors.
- 67. Senyalau l'afirmació vertadera sobre els queratoquists dentigènics o quists primordials?**
- a) La majoria són asimptomàtics, de creixement lent a través de la medulla i respecten les corticals. Poden produir reabsorcions radiculars a les arrels de les dents adjacents a la lesió.
 - b) Apareixen com a imatges radiolúcides uniloculars o multiloculars, per la qual cosa cal fer un diagnòstic diferencial amb l'ameloblastoma.
 - c) No solen tenir recidives.
 - d) Totes les afirmacions anteriors són vertaderes.
- 68. Senyalau l'afirmació vertadera sobre l'ús de gel fluorat per prevenir la càries dental:**
- a) Es recomana utilitzar-lo en infants de menys de sis anys.
 - b) La concentració habitual és del voltant de 1.500 ppm de fluor.
 - c) En els casos indicats, la freqüència d'aplicació recomanada per l'Associació Europea d'Odontopediatria és trimestral o semestral.
 - d) Es recomana no beure ni menjar res després durant deu minuts.
- 69. Senyalau l'afirmació errònia respecte a l'agenèsia dental:**
- a) Pot ser unilateral o bilateral.
 - b) Els pacients amb agenèsia en la dentició temporal tenen més probabilitats de patir-ne en la dentició permanent.
 - c) És més freqüent en la dentició temporal.
 - d) Les dents més afectades són les terceres molars, seguides de les incisives laterals permanents superiors.

- 70. Senyalau l'afirmació errònia respecte de l'ús d'antibioteràpia sistèmica en el tractament periodontal:**
- a) No s'han de receptar antibiòtics si el desbridament mecànic no quirúrgic exhaustiu pot resoldre el problema.
 - b) En bosses profundes, els antibiòtics per la via sistèmica redueixen la necessitat de prosseguir amb tractaments quirúrgics.
 - c) Són útils en cas de retractament amb resposta insatisfactòria al tractament mecànic.
 - d) El tractament d'elecció, quan s'aplica juntament amb raspament i allisament radicular, és l'associació d'espíramicina i metronidazole.
- 71. Senyalau l'afirmació vertadera amb relació al lupus:**
- a) Les lesions orals discoides típiques presenten una àrea central queratinitzada envoltada d'una zona ulcerada.
 - b) Les lesions orals discoides atípiques presenten estries blanquinoses semblants a les estries de Wickham.
 - c) Les lesions orals no discoides presenten àrees queratinitzades.
 - d) Totes les afirmacions anteriors són vertaderes.
- 72. Segons la classificació de Winter, la posició de la tercera molar en relació amb l'eix longitudinal de la segona molar pot ser...**
- a) ...només mesioangular o distoangular.
 - b) ...només horitzontal o vertical.
 - c) ...mesioangular, distoangular, horitzontal o vertical.
 - d) ...mesioangular, distoangular, horitzontal, vertical o invertit.



G CONSELLERIA
O SALUT I CONSUM
I SERVEI SALUT
B ILLES BALEARS
/