


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 29 de septiembre de 2026


Los modelos consultados prevén la presencia de masas de aire africano sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias para el día 29 de septiembre. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, centro y noroeste de la Península y las islas Canarias y 5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste, este, norte y noreste peninsular y las islas Baleares. Según el modelo SKIRON también se podría producir depósito seco de polvo sobre el sur, centro, noroeste y norte de la Península y las islas Canarias. Además, se podría producir de posición húmeda sobre el sur, centro, este, noroeste, norte y noreste peninsular y las islas Baleares a lo largo del día.

El resultado de la comparación de varios modelos proporcionado por el Barcelona Dust Regional Center prevé la presencia de masas de aire africano sobre las islas Canarias, la Península y las islas Baleares para el día 29 de septiembre. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, centro y noroeste de la Península y las islas Canarias y 5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste, este, norte y noreste peninsular y las islas Baleares.




Resultado de la comparación de varios modelos de predicción de concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) para el día 29 de septiembre de 2026 a las 00h y 12h UTC. © Barcelona Dust Regional Center.

El modelo SKIRON prevé también la presencia de masas de aire africano en superficie sobre las islas Canarias y la Península para el día 29 de septiembre. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 1-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste de la Península y 1-25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para el día 29 de septiembre de 2026 a las 00 y 12 UTC © Universidad de Atenas.

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON, muestran el transporte de masas de aire africano en altura sobre las islas Canarias, la Península y las islas Baleares para el día 29 de septiembre, favorecido por las bajas presiones sobre el noroeste del continente africano.




Carga total de polvo (mgr/m^2) predicha por el modelo SKIRON para el día 29 de septiembre de 2026 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 29 de septiembre de 2026 a las 12 UTC © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también se podría producir depósito seco de polvo sobre el sur, centro, noroeste y norte de la Península y las islas Canarias durante el día 29 de septiembre. Además, se podría producir de posición húmeda sobre el sur, centro, este, noroeste, norte y noreste peninsular y las islas Baleares a lo largo del día.



Depósito seco de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 29 de septiembre de 2026 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 29 de septiembre de 2026 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.

Fecha de la predicción: 28 de septiembre de 2026

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico”.