



TOSFERINA

Definición de caso

Criterio clínico

Tos durante, al menos, dos semanas con alguno de estos signos:

- Tos paroxística
- Estridor inspiratorio
- Vómitos provocados por la tos

O

Persona diagnosticada clínicamente de tosferina

O

Menores de un año con episodios de apnea

En cualquier persona, en edad adulta, adolescencia o en la infancia, vacunados, la tosferina puede cursar con síntomas atípicos. La aparición de tos debería ser investigada, particularmente si es paroxística, se exacerba durante la noche y cursa sin fiebre.

Criterio de laboratorio

Al menos, uno de los siguientes:

- Aislamiento de *Bordetella pertussis* en una muestra clínica
- Detección del ácido nucleico de *Bordetella pertussis* en una muestra clínica
- Respuesta de anticuerpos específicos de *Bordetella pertussis* (seroconversión)

Criterio epidemiológico

Contacto con un caso de tosferina confirmado por laboratorio entre 6 y 20 días antes del inicio de los síntomas

Clasificación de los casos

- **Caso sospechoso:** persona que cumple **criterio clínico**.
- **Caso probable:** persona que cumple **criterio clínico** y **criterio epidemiológico**
- **Caso confirmado:** persona que cumple **criterio clínico** y **criterio de laboratorio**

Definición de brote

Se considerará brote de tosferina 2 o más casos con vínculo epidemiológico, que tengan relevancia epidemiológica por el **grupo de población** en el que aparecen los casos, por la **gravedad** de la enfermedad o por el **lugar** donde ocurren (como guarderías, o establecimientos donde concurren menores de un año, servicios de obstetricia, neonatología o sus áreas de urgencias).