



| Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS | | | |
|---|-----------------|---------------------|------------|
| Malaltia | Lloc adquisició | Tipus epidemiològic | Nre. casos |
| - | - | - | - |
| Informació sobre BROTS Oberts | | | |
| Malaltia / Etiologia | Nº brotes | | |
| Covid-19 | 35 | | - |
| M. Tuberculosi | 1 | | - |
| Sarna | 1 | | - |
| Informació sobre BROTS ALIMENTARIS | | | |
| - | - | - | - |
| Novetats a www.epidemiologia.caib.es: | | | |

SVMDO 2020. Infecció Gonocòccica a les Illes Balears, any 2020. Dades definitives. (Part 2 de 2)

- **País d'origen:** El 2020, un total de 72 casos (32%) són d'origen estranger repartits en 26 països i destacant Colòmbia (8 casos). En els anys 2010-2020, un total de 890 casos (33 % dels 2.673 acumulats) són d'origen estranger repartits en 58 països. Colòmbia és el primer país amb un total de 105 casos. En els darrers anys el percentatge d'estrangers es manté envoltant el 30-40% del total. Respecte el 2019, en aquets any 2020 disminueixen tan els casos d'origen espanyol (246 vs 155) com estranger (170 vs 72) i igualment ho fan tots els subgrups per sexe i país d'origen.





| Infecció Gonocòccica a les Illes Balears, país d'origen. Acumulat 2016-2020. | | | | | |
|--|-----------|----------------|-----------|------------------|-----------|
| país | 2016-2020 | país | 2016-2020 | país | 2016-2020 |
| Colòmbia | 75 | Cuba | 16 | Suïza | 3 |
| Itàlia | 63 | Frància | 13 | Costa Rica | 2 |
| Argentina | 50 | Chile | 10 | Rússia | 2 |
| Ecuador | 45 | Peru | 9 | Suecia | 2 |
| Marruecos | 40 | Paraguai | 7 | Austria | 2 |
| Rep Dominicana | 36 | Nigèria | 6 | Bèlgica | 2 |
| Brasil | 27 | Portugal | 6 | China | 2 |
| Rumania | 27 | GuineaEqu | 5 | Ghana | 2 |
| Venezuela | 25 | Irlanda | 4 | Mali | 2 |
| Alemania | 23 | Desconocido | 4 | Méjico | 2 |
| Bulgària | 20 | Estados Unidos | 4 | Nicaragua | 2 |
| Reino Unido | 18 | Polònia | 4 | Rep Checa | 2 |
| Uruguay | 17 | Índia | 3 | països amb 1 cas | 11 |
| Bolivia | 17 | Moldàvia | 3 | | |
| Senegal | 17 | Pakistán | 3 | | |

Factors associats o situacions de risc: s'apuntaren els següents al protocols de notificació: Parelles múltiples (50 casos), homosexualitat (45 casos), exercici de la prostitució (1 cas), usuari o ex-usuari de drogues (14 casos), VIH positiu (23 casos) i presència d'altres malalties de transmissió sexual (73 casos). Des del 2010 (2.673 casos acumulats) el perfil majoritari és de relacions heterosexuales amb parelles múltiples (679 casos) sense consum de drogues (1.215 casos), VIH negatiu (1.594 casos) i sense altres malalties de transmissió sexual (1.494 casos).

- **Altres variables:** Es varen confirmar per laboratori 400 dels 416 casos. Es varen poder identificar 8 casos associats en forma de brots: Un total de 4 brots. Segons la informació rebuda, es va fer estudi de contactes en 38 casos.