


<b>Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS</b>			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
-	-	-	-
-	-	-	-
<b>Informació sobre BROTS EN ESTUDI (Informació provisional)</b>			
Malaltia / Etiologia	Territori / Àmbit		Nre. casos
Covid	268		-
B. Pertussis	1		-
Enterobacter Cloacae	1		
M. Tuberculosis	4		
N. Gonorreae	1		
Parvovirus B19	1		
Sarcoptes Scabiei	10		
Virus Gripal A	1		
Virus Gripal A H1n1	1		
Novetats a <a href="http://www.epidemiologia.caib.es">www.epidemiologia.caib.es</a> :			


### Vacunació antimeningocòccica a les Illes Balears.

#### Programes de vacunacions en Salut Pública. Coordinació de vacunes.

La malaltia meningocòccica ha experimentat un descens considerable des de la dècada dels 90 de segle XX, tant a les Illes Balears com a la resta d'Espanya, fins a les temporades 2012-2013 i 2013-2014, a partir de les quals els serogrupos B i C s'han mantingut estables, mentre que a les temporades 2017-2018 i 2018-2019 hi ha hagut un augment dels serogrupos W i Y, tal com ha passat a altres països europeus. Vegeu les figures 1 i 2. Respecte de les edats, el C afecta tot persones majors de 65 anys i el B segueix sent una malaltia majoritàriament infantil, mentre que la MMI causada pel serogrup W, que afectava sobretot a persones majors, ha anat disminuint l'edat de presentació fins a tenir una presència considerable en adolescents i adults joves. A les Illes Balears en les darreres temporades també s'ha vist aquest desplaçament de l'edat, amb un cas de 9 anys i un de 15.

Figura 1





Al 1997, després d'un augment de la incidència de la MMI per serogrup C es va dur a terme una campanya de vacunació d'infants amb la vacuna polisacàrida A+C, la disponible en aquell moment. Al 2000 es va introduir la vacuna conjugada contra el serogrup C en calendari de vacunació infantil. Atesos els canvis en l'epidemiologia de la malaltia i els resultats dels programes de vacunacions s'han anat modificant les pautes d'administració d'aquesta vacuna i al 2018 la Ponència de Programes i Registre de Vacunacions va recomanar el canvi de la dosi de vacuna antimeningocòccica C que s'administra als 12 anys d'edat per una tetravalent ACWY, a més de recomanar vacunar a tots els joves i adolescents nascuts a partir de l'any 2001 amb una dosi d'aquesta vacuna. La Ponència no ha recomanat la inclusió de la vacuna contra el meningococ B mentre no hi hagi resposta a una sèrie de dubtes sobre efectivitat, durada de la protecció i soques de meningococ B cobertes per la vacuna. Vegeu la taula 1.

Taula 1.- Vacunació antimeningocòccica universal a Espanya, 1997-2021.

Any	Acció	Vacuna	Pauta
1997	Campanya vacunació massiva infantil	Polisacàrida A+C	1 dosi
2001	Introducció en calendari	Conjugada C	3 dosis: 2, 4 i 6 mesos
	Campanya recaptació infants menors de 6 anys	Conjugada C	3 dosis
2007	Modificació de la pauta	Conjugada C	2 dosis entre els 4-6 mesos 1 dosi als 18 mesos
2014	Modificació de la pauta	Conjugada C	3 dosis: 4 mesos, 12 mesos, 12 anys
	Recaptació adolescents de 13 i 14 anys	Conjugada C	1 dosi
2019	Modificació de la pauta	Conjugada C	2 dosis: 4 i 12 mesos
	Modificació de la pauta	Conjugada ACWY	1 dosi als 12 anys
2020-2021	Campanya vacunació adolescents i joves nascuts a partir de 2001	Conjugada ACWY	1 dosi

A més de la vacunació sistemàtica, la Ponència va recomanar també vacunar a persones de risc augmentat contra el meningococ amb les vacunes conjugada ACWY i proteica contra el serogrup B. Els grups de risc es poden consultar al web de Vacunes <http://vacunes.caib.es>.

## **Vacunació antimeningocòccica a les Illes Balears**

### A. Calendari:

- 4 mesos d'edat: una dosi Men C
- 12 mesos d'edat: una sola dosi Men C, amb independència de la vacunació anterior, inclosos els no vacunats durant els primers mesos de vida.
- 12 anys d'edat: una sola dosi Men ACWY, amb independència de la vacunació anterior, inclosos els no vacunats mai.
  - Els adolescents que hagin rebut una dosi de Men ACWY a partir dels 10 anys no s'han de vacunar.
  - Els adolescents que hagin rebut una dosi de Men C a partir dels 10 anys s'han de vacunar.

### B. Campanya de recaptació d'adolescents i joves:

- Vacunació amb una dosi de tots els adolescents i joves nascuts a partir de 2001.
- No s'han de vacunar els que, pels motius que sigui, ja han rebut una dosi de Men ACWY a partir dels 10 anys.
- Cronograma de la recaptació:
  - Any 2020: nascuts en els anys 2001, 2002 i 2006.
  - Any 2021: nascuts en els anys 2003, 2004 i 2005.
- Lloc de la vacunació:
  - Edat pediàtrica: es poden vacunar als llocs on es vacunen habitualment (centre de salut, consultes privades de pediatria)
  - A partir dels 15 anys: centres de salut.

### C. Situacions de risc especials:

- Per indicació clínica, segons les recomanacions de la Ponència de Vacunacions.

## **Documents d'interès disponibles al web de vacunes <http://vacunes.caib.es>**

- Instruccions de la DG de Salut Pública i Participació relatives a les recomanacions i a l'ús de les vacunes antimeningocòcciques a les Illes Balears.
- Grupo de trabajo vacunación frente a EMI de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Recomendaciones de vacunación frente a enfermedad meningocócica invasiva. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, marzo 2019.
- Grupo de Trabajo MenB de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Vacuna frente a enfermedad meningocócica invasora por serogrupo B y su posible utilización en salud pública. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2013.
- Grupo de trabajo 4CMenB en situaciones especiales de la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Recomendaciones de utilización de la vacuna frente a enfermedad meningocócica por serogrupo B. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015.
- Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones. Adenda. Modificación en "Recomendaciones de utilización de la vacuna frente a enfermedad meningocócica por serogrupo B". Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015.
- Grupo de trabajo Vacunación en población adulta y grupos de riesgo. Vacunación en grupos de riesgo de todas las edades y en determinadas situaciones. Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 2018.