

<b>Informació sobre CASOS IMPORTATS O EXTRACOMUNITARIS</b>			
Malaltia	Lloc adquisició	Tipus epidemiològic	Nre. casos
Tuberculosi	Venezuela	Immigrant estranger	1
Paludisme	Guinea Equatorial	Visita a familiars	1
<b>Informació sobre BROTS acumulats 2020-2021</b>			
Malaltia / Etiologia	Nº brotes		
Covid-19	818		
Eritema Infecció	1		
Gea	1		
Grip	2		
I, Gonocòccica	1		
Sarna	11		
Tos ferina	1		
Tuberculosi	5		
Novetats a <a href="http://www.epidemiologia.caib.es">www.epidemiologia.caib.es</a> :			

### **SVMDO 2019. Leishmaniosi a les Illes Balears, any 2019 i sèrie històrica. Dades definitives. Resum de dades.**

- Nombre de casos al 2019: 31
- Taxa: 2,7 per 100.000 habitants.
- Índex epidèmic: 1,11

- Àmbits geogràfics: 26 casos del 2019 corresponen a Mallorca (6 a Palma), 1 a Menorca i 4 a Eivissa. No s'ha notificat cap cas de Formentera. Els 31 casos es distribueixen en 19 zones bàsiques de residència i figuren en primer lloc les zones de Manacor i Felanitx ambdues amb 4 casos. En els anys 2010-2019 hi ha 246 casos acumulats repartits en 52 zones bàsiques de residència. Les zones amb major nombre de casos acumulats són Manacor (20), Felanitx i Vilafranca (18 ambdues) i Lluçmajor (16 casos).

- Forma clínica: Dels 31 casos del 2019, 26 són formes cutànies (1 amb lesions múltiples) i 5 són visceral.

- Variables de risc recollides al protocol de notificació: Es comunicaren 2 casos VIH positiu i corresponents a formes cutànies. Dels 290 casos de leishmaniosi cutànies acumulats des de 1999, 14 (5%) es notificaren amb serologia positiva a VIH. Pel que fa als casos acumulats de leishmaniosi visceral o mixta el percentatge es del 44% (129 casos acumulats amb 57 positius; 44%). Altres factors detallats en els protocols de notificació acumulats des del 2010 i referits a un període de dos anys previs al diagnòstic són la presència de malalties immunosupressores (18 casos), tractament immunosupressors (11 casos), enolisme (6 casos), antecedent de transfusions (1 cas), usuari de drogues per via parenteral (5 casos) així com factors ambientals a l'entorn habitual del malalt: Presència de cans (62 casos), moscards (60 casos) o activitat ramadera (17 casos).

- Forma de presentació: Tots els casos del 2019 es consideraren esporàdics, és a dir que no s'ha detectat cap agrupació.

- Variables personals: El rang d'edat va de 9 mesos a 90 anys, 20 casos són homes i podem destacar la detecció de 6 casos pediàtrics (tots menors de 7 anys; 1 amb forma visceral).

- Fonts d'informació: 5 casos del 2019 es van detectar des d'atenció primària: CS de Can Pastilla, CS Es Banyer, CS Es Trencadors, CS Lluçmajor i Son Gotleu. Dels 5 casos, 4 es detectaren per recerca activa. Des de la xarxa hospitalària es detectaren 24 casos: 10 des de Son Llàtzer (7 de dermatologia i 3 de medicina interna), 6 casos des de l'hospital de Manacor (dermatologia), 4 de Son Espases (dermatologia, cardiologia i pediatria) i 4 de Can

Misses (dermatologia, hematologia i medicina interna). D'aquests 24 casos de procedència hospitalària, 15 es detectaren per recerca activa. 2 dels casos del 2019 es notificaren des d'una consulta privada.

Tot i que en els darrers anys ha millorat la col·laboració de les unitats hospitalàries de dermatologia, la leishmaniosi és una de les malalties amb més problemes de notificació. Dels 419 casos acumulats des del 1999, un total de 162 (40%) no s'han notificat des de la xarxa assistencial i s'han incorporat al registre gràcies a les activitats de recerca activa. La majoria de casos subnotificats (89; 55%) es detecten a través de la revisió dels codis d'altres hospitalàries, 48 (30%) a través d'e-SIAP i 24 (15%) per la revisió de dades facilitades pels laboratoris hospitalaris de microbiologia.

