



## Govern de les Illes Balears

Conselleria de Salut  
Direcció General de Salut Pública i Participació

Fuente: "PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE LA SÍFILIS CONGÉNITA"  
(Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, protocolos aprobados en el año 2014)

(definición original modificada en fecha 21/10/2015 a raíz de cambios aprobados en la Ponencia de Vigilancia de septiembre de 2105)

### Definición de caso

#### -Criterio clínico

Niño menor de dos años que presenta, al menos, uno de los diez signos siguientes:

- Hepatoesplenomegalia.
- Lesiones mucocutáneas.
- Condiloma plano.
- Rinitis persistente.
- Ictericia.
- Pseudoparálisis (debida a periostitis y osteocondritis).
- Afectación del sistema nervioso central.
- Anemia.
- Síndrome nefrótico.
- Desnutrición  
o
- Niño muerto al nacer

#### -Criterio de laboratorio

#### **Caso confirmado:**

Al menos uno de los tres siguientes:

- Confirmación de treponemas por microscopía de campo oscuro en cordón umbilical, placenta, material de autopsia, exudado nasal o lesión cutánea.
- Confirmación de treponemas mediante su tinción directa con anticuerpos fluorescentes (IFD) en cordón umbilical, placenta, material de autopsia, exudado nasal o lesión cutánea.
- Detección de ácidos nucleicos de *Treponema pallidum* en cordón umbilical, placenta, material de autopsia, exudados de lesiones sospechosas o fluidos corporales mediante PCR
- Detección de IgM específica de *Treponema pallidum* (FTA-abs, EIA, Immunoblot), JUNTO CON una prueba treponémica reactiva en el suero del niño.
- Una titulación de un test no treponémico (VDRL, RPR) en el suero del niño cuatro veces superior a la del suero de la madre junto con un test treponémico reactivo en el suero del niño.

#### **Caso probable:**

Al menos, uno de los dos siguientes:

- VDRL positivo en LCR.
- Análisis serológicos de la madre, treponémicos y no treponémicos, positivos

#### - Criterio epidemiológico

Niño menor de dos años cuya madre ha tenido pruebas serológicas positivas para la sífilis y no haya sido tratada o lo ha sido de forma inadecuada hasta el momento del parto.

### Clasificación de los casos

Caso sospechoso: No procede.

Caso probable: Lactante o niño menor de 2 años que satisface los criterios clínicos y presenta al menos uno de los dos siguientes:

- Una relación epidemiológica.
- Criterios de laboratorio de caso probable.

Caso confirmado: Niño menor de 2 años que satisface los criterios analíticos de confirmación de los casos.