



G CONSELLERIA  
O MEDI AMBIENT,  
I AGRICULTURA  
B I PESCA



*Malus domestica*

## Marinera

### Caracterització agromorfològica

#### Arbre

Port	Erecte
Vigor	Fort
Inici de la floració	4a set. de març (primerenca)
Maduració del fruit	2a set. de juliol (primerenca)

#### Fulla

Longitud del limbe (cm)	9,75 ± 1,20 (mitjana)
Amplada del limbe (cm)	6,37 ± 0,40 (mitjana)
Relació Longitud/Amplada	1,27 (petita)
Longitud del pecíol (cm)	3,27 ± 0,40 (llarga)
Limbe en relació a la rama	Ascendent
Pubescència del revers	Absent o molt feble

#### Fruit

Alçada (mm)	46,05 ± 4,89 (curta)
Diàmetre (mm)	58,13 ± 7,19 (petit)
Relació Alçada/Diàmetre	0,79 (mitjana)
Forma	Globosa
Distribució del color superior	Estries
Color de la polpa	Crema
Color de fons de l'epidermis	Groc
Acostellat	Absent o feble
Pruïna	Absent o feble
Bronzejat de la base del peduncle	Absent o feble
Bronzejat de l'ull	Absent o feble

### Informació fisicoquímica

Contingut en sucres (°Brix)	13,93 ± 0,25
Pes (gr)	71,47 ± 18,38
Acidesa (grams àcid màlic/l)	3,73 ± 0,28
pH	3,55 ± 0,06
Índex de qualitat	200,09

### Origen de la varietat



Municipis amb cita històrica de cultiu de poma a Mallorca.

Citada com una varietat mallorquina primerenca, P.A. Cerdà (1910), assenyala que és "molt recomanable. Madura dins el Juliol i Agost".

Es descriu com a "verdosa, amb retxes vermelles, mitjancera o grosseta, àcida, molt bona" (ALCOVER-MOLL: 1957).

A la Gran Enciclopèdia de Mallorca (1989), es diu que "madura al començament del mes de juliol. El fruit és petit o mitjancer. És de sabor àcid. Fructifica en ramells apinyats".

Suau, Tomàs (2016). *Recerca bibliogràfica de varietats locals a les Illes Balears*.

<sup>1</sup> Les dades mostrades són el resultat de l'avaluació d'un any.

