

Observatorio español sobre drogas
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS SECUNDARIAS
(ESTUDES)
DEL AÑO 2010

ESTUDES 2010

INFORME DE RESULTADOS
ALUMNOS

Illes Balears

Septiembre de 2011

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	4
1.1. OBJETIVOS DE ESTUDES	4
1.2. METODOLOGÍA	7
2. RESUMEN	12
3. PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS	25
3.1. TABACO	25
3.2. ALCOHOL.....	36
3.3. CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES.....	46
3.4. TRANQUILIZANTES.....	49
3.5. CANNABIS	55
3.6. COCAÍNA.....	60
3.7. HEROÍNA.....	70
3.8. SPEED/ANFETAMINAS	73
3.9. ALUCINÓGENOS.....	77
3.10. INHALABLES VOLÁTILES.....	80
3.11. ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO	83
3.12. GHB.....	86
3.13. POLICONSUMO	88
3.14. CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS	91
3.15. CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA	93
3.16. CANNABIS: PATRONES DE CONSUMO RELEVANTES	95
4. OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS	98
4.1. RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO	98
4.2. DISPONIBILIDAD PERCIBIDA	102
5. INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS	103
6. ENTORNO SOCIAL.....	106
7. ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES	114
8. NUEVAS SUSTANCIAS.....	124
8.1. KETAMINA	126
8.2. SPICE	129

8.3. PIPERAZINAS	132
8.4. MEFEDRONA.....	135
8.5. NEXUS	138
8.6. METANFETAMINAS.....	141
8.7. SETAS MÁGICAS.....	144
8.8. RESEARCH CHEMICALS	147
8.9. LEGAL HIGHS.....	150

1. INTRODUCCIÓN

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, ha promovido la ejecución de la Encuesta ESTUDES correspondiente al año 2010.

ESTUDES es una de las operaciones estadísticas de referencia a la hora de conocer determinados aspectos del consumo de drogas entre los jóvenes españoles escolarizados. Se enmarca en la serie de encuestas que han venido realizándose en España de forma bienal desde 1994 con el objetivo de conocer la prevalencia de consumo, las tendencias y actitudes hacia el consumo de drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan enseñanzas secundarias. Esta larga trayectoria permite contar con información de relevancia acerca de la evolución del consumo en España. En la medida en que su metodología y cuestionario son similares a los de otros países de la Unión Europea y de Estados Unidos, permite igualmente realizar comparaciones internacionales.

Estudes 2010 y sus ediciones precedentes son financiadas y promovidas por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y han contado con la colaboración de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas (Planes Autonómicos sobre Drogas y Consejerías de Educación) y del Ministerio de Educación y Ciencia.

Estudes recoge la información sobre los alumnos de Enseñanza Secundaria que cursan:

- ❖ 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria
- ❖ 1º y 2º de Bachillerato
- ❖ 1º y 2º de Ciclos formativos de Grado Medio de Formación Profesional Específica.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas promovió la realización y ejecución de ESTUDES 2010 a nivel nacional. Los responsables en materia de drogodependencias de la comunidad balear, por su parte, han respaldado la obtención de

una muestra mayor en su territorio, que permitiese la consideración de los resultados con un mayor nivel de fiabilidad estadística, respondiendo a idénticos parámetros técnicos y metodológicos que la recogida a nivel nacional.

En especial en Baleares se ha perseguido representatividad a nivel insular, de forma que el margen de error estadístico se situase en valores próximos a $\pm 3\%$ en cada una de las islas.

Los casos relativos a esta ampliación muestral se añaden a las entrevistas realizadas en Baleares para la Encuesta Nacional ESTUDES 2010. De este modo, la muestra que respalda la información vertida en el presente informe totaliza 2.288 casos.

1.1. OBJETIVOS DE ESTUDES

El objetivo general de Estudes es conocer de forma periódica la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio a nivel estatal, con el fin de orientar el desarrollo y evaluación de intervenciones destinadas a reducir el consumo y los problemas asociados.

A partir de este objetivo general, los objetivos concretos del proyecto son los siguientes:

- a) Estimar la prevalencia de consumo de las distintas sustancias.
- b) Estimar los patrones de consumo y las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- c) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas: oferta y accesibilidad (especialmente disponibilidad percibida) y consumo (especialmente riesgo percibido ante diversas conductas de consumo).
- d) Conocer el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

En el cuestionario de Estudes 2010 se han introducido objetivos orientados a determinar la incidencia del consumo de las denominadas “nuevas sustancias” y a escalas internacionales comparativas de consumo de cannabis.

1.2. METODOLOGÍA

La Encuesta Estudes se aplicó a los estudiantes de Secundaria de 14 a 18 años que cursan sus estudios en una selección de centros educativos públicos y privados de toda España. La distribución de la muestra atiende a criterios de proporcionalidad entre el número de alumnos que cursan estudios de Secundaria en cada Comunidad Autónoma y la titularidad del centro. Partiendo de una estratificación previa de las unidades de primera etapa según Comunidad Autónoma (incluyendo Ceuta y Melilla) y según titularidad del centro educativo (pública-privada), la asignación de la muestra según Comunidad Autónoma ha sido proporcional a la raíz cuadrada del universo de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años del curso 2009/2010 de cada una de las comunidades. En especial en la ampliación muestral de Baleares, la asignación de la muestra se ha realizado considerando cada isla como una submuestra independiente.

**DISTRIBUCIÓN DE ENTREVISTAS SEGÚN SEXO, TITULARIDAD Y TIPO DE ESTUDIOS.
TOTAL NACIONAL E ISLAS BALEARES.**

CURSO ESCOLAR 2009-2010	TOTAL UNIVERSO (estudiantes 14-18 años)	NÚMERO REAL DE ENTREVISTAS POR SEXO			ENTREVISTAS EN MUESTRA (1) POR SEXO		
		H	M	T	H	M	T
BALEARIS (ILLES)	33.985	1.318	1.435	2.753	1.300	1.415	2.715
Mallorca	26.356	541	512	1.053	552	507	1.059
Menorca	2.763	295	316	611	272	285	557
Eivissa	3.608	407	522	929	402	539	941
Formentera	238	75	85	160	74	83	157
TOTAL NACIONAL	1.708.089	15.657	16.577	32.234	15.594	16.376	31.967

CURSO ESCOLAR 2009-2010	TOTAL UNIVERSO (estudiantes 14-18 años)	NÚMERO REAL DE ENTREVISTAS POR TITULARIDAD			ENTREVISTAS EN MUESTRA (1) POR TITULARIDAD		
		Público	Privado	TOTAL	Público	Privado	TOTAL
BALEARIS (ILLES)	33.985	1.725	1.028	2.753	1.781	934	2.715
Mallorca	26.356	673	380	1.053	704	355	1.059
Menorca	2.763	327	284	611	354	202	556
Eivissa	3.608	565	364	929	565	377	942
Formentera	238	160	0	160	158	0	934
TOTAL NACIONAL	1.708.089	21.453	10.781	32.234	22.081	9.886	31.967

(1) Aplicando los coeficientes de ponderación que devolviesen la representatividad a la muestra. Dado que la selección aleatoria de la muestra no incluyó ningún grupo de Ciclos Medios de Formación Profesional de Centros Privados, el valor teórico se pondera a 0, provocando una minoración en el número de entrevistas.

CURSO ESCOLAR 2009-2010	TOTAL UNIVERSO (estudiantes 14- 18 años)	NÚMERO DE ENTREVISTAS REAL POR TIPO DE ESTUDIOS					ENTREVISTAS EN MUESTRA (1) POR TIPO DE ESTUDIOS				
		ESO	BACH	CFGM	CFGS	TOTAL	ESO	BACH	CFGM	CFGS	TOTAL
BALEARES (ISLAS)	33.985	1.873	801	79	0	2.753	1.597	938	180	0	2.715
Mallorca	26.356	785	232	36	0	1.053	683	294	82	0	1.059
Menorca	2.763	400	182	29	0	611	317	174	66	0	557
Eivissa	3.608	569	347	13	0	929	480	432	30	0	942
Formentera	238	119	40	1	0	160	117	38	2	0	157
TOTAL NACIONAL	1.708.089	21.697	8.908	1.493	121	32.234	17.811	11.677	2.336	126	31.967

(1) Aplicando los coeficientes de ponderación que devolviesen la representatividad a la muestra. Dado que la selección aleatoria de la muestra no incluyó ningún grupo de Ciclos Medios de Formación Profesional de Centros Privados, el valor teórico se pondera a 0, provocando una minoración en el número de entrevistas.

DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE CENTROS Y GRUPOS ENTREVISTADOS. TOTAL NACIONAL EN ISLAS BALEARES.

	RECuento		
	ALUMNOS	CENTROS	GRUPOS
BALEARES (ISLAS)	2.753	42	153
Mallorca	1.053	18	55
Menorca	611	11	38
Eivissa	929	12	49
Formentera	160	1	11
TOTAL NACIONAL	31.967	857	1.730

FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA

ÁMBITO: Comunidad Autónoma de Illes Balears.

UNIVERSO: Jóvenes de 14 a 18 años que cursan estudios de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en centros educativos de la Comunidad.

MUESTRA: 2.753 individuos.

AFIJACIÓN: Bietápica por conglomerados. Estratificada proporcional al número de alumnos según la titularidad pública o privada del centro dentro de cada isla. En segunda etapa, selección aleatoria de centros educativos y de pares de aulas en cada centro (exhaustiva en el caso de los centros de la isla de Formentera). En cada aula, se aplicaron los cuestionarios a la totalidad de los alumnos que asistían a clase el día de la Encuesta.

MARGEN DE ERROR: $\pm 1.83\%$ a nivel global para variables de proporción, siendo $p=q=0.5$.

En la información desagregada para cada isla, los márgenes de error son los siguientes:

MÁRGENES DE ERROR			
	ALUMNOS EN EL UNIVERSO	ALUMNOS EN MUESTRA	MARGEN DE ERROR
BALEARES (ISLAS)	33.985	2.753	+ 1.83
Mallorca	26.356	1.053	+ 3.02
Menorca	2.763	611	+ 3.57
Eivissa	3.608	929	+ 2.83
Formentera	238	160	+ 4.54

TRABAJO DE CAMPO: Del 15 de noviembre al 15 de diciembre de 2010 en la recogida de información de la muestra nacional; del 14 de febrero al 11 de marzo para la recogida de datos de la ampliación muestral de la Comunidad.

INSTITUTO RESPONSABLE: Instituto Sondaxe, S.L.

NOTA METODOLÓGICA: Con el fin de devolver a la muestra la representatividad del Universo de estudiantes, se han aplicado unos coeficientes de ponderación basados en la titularidad de los centros y el tipo de enseñanza.

Para la selección de los centros que compondrían la muestra se aplicó una selección aleatoria entre todas las instituciones educativas de cada isla que impartían los niveles educativos determinados en el Universo (3º y 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional). Una vez seleccionado el centro, siguiendo igualmente un proceso aleatorio, se seleccionaron pares de aulas a las que se aplicaría el cuestionario a la totalidad de sus alumnos, utilizando para ello la información suministrada por los responsables de los centros educativos.

El porcentaje de sustitución de centros titulares en la Comunidad de Islas Baleares fue del 7,1%, lo que supone un total 3 centros.

Para evitar sesgos en la recogida de información, los alumnos no fueron informados previamente de su condición de seleccionados para la aplicación de la Encuesta.

Una vez en el aula, un equipo de dos encuestadores específicamente formados, informaron a los alumnos acerca de los objetivos de Estudes, persiguiendo una óptima implicación en la Encuesta, y resolviendo durante su autocumplimentación todas aquellas dudas que surgiesen entre el alumnado. Estas indicaciones fueron ofrecidas por los equipos de campo de modo individualizado y privado para cada alumno que las planteaba.

El absentismo total en el momento de la encuesta se situó en un 6,8%. En la mayoría de los casos, la razón del absentismo fue por enfermedad.

Durante la experiencia, el profesor permanecía en un segundo plano a efectos de no introducir sesgos en las respuestas de los alumnos vertidas en los cuestionarios. Para ello, se solicitó expresamente al profesorado que permaneciese en un lugar neutral del aula.

El cuestionario aplicado a los estudiantes fue totalmente anónimo, aspecto que se aclaró con especial énfasis a los jóvenes, en pro de una mejor y mayor colaboración. Consta de un total de 91 preguntas, entre las que cabe destacar significativas novedades de esta edición de ESTUDES respecto a experiencias anteriores:

- De forma pionera se han introducido preguntas orientadas a conocer la prevalencia de consumo y la percepción del riesgo de sustancias emergentes. Las nueve sustancias incluidas en el módulo específico de drogas emergentes son: ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, *research chemicals* y *legal highs*. No obstante, el reducido número de casos sobre los que se basa el análisis del consumo de estas sustancias aconsejan una interpretación de la información en términos cualitativos, dado el elevado margen de error que soportan.
- A efectos de que Estudes permitiese dar cabida a objetivos comunes a otras encuestas internacionales, el cuestionario de la edición de 2010 incluyó preguntas relacionadas con los efectos del consumo de cannabis.


Finalmente indicar que en el cálculo de algunas variables a nivel nacional se han introducido variaciones metodológicas que pueden provocar ligeras diferencias en la comparación de los resultados de la CCAA con los obtenidos en la Encuesta a nivel nacional.

2.RESUMEN

El 85,3% del alumnado encuestado ha nacido en España. Los países de nacimiento mayoritarios de quienes nacieron fuera de España son Ecuador (14,4%), Marruecos (9,8%), Colombia (9,5%) y Argentina (9,5%).


El siguiente gráfico presenta los 10 países principales de nacimiento del alumnado que no ha nacido en España, y que suponen el 77,3% del total de países de origen mencionados.

GRÁFICO 2.1: PAÍSES MAYORITARIOS DE NACIMIENTO DE LOS ALUMNOS QUE NO HAN NACIDO EN ESPAÑA



Las y los estudiantes encuestados conviven mayoritariamente en una familia nuclear compuesta por padres y/o hermanos o hermanas, tal y como refleja el gráfico 2.2. En el 82,3% de los casos los padres del menor han nacido en España, porcentaje este que se reduce ligeramente (79,6%) si nos detenemos en la procedencia de sus madres.


GRÁFICO 2.2: PERSONAS CON LAS QUE ACTUALMENTE CONVIVE O COMPARTE CASA



En el gráfico 2.3 podemos comprobar que en el 83,6% de los casos, los padres de las y los estudiantes que respondieron a la Encuesta estaban ocupados en el momento de realizarse la misma, frente a un 67,5% de las madres. Por su parte, la tasa de paro es ligeramente superior en el caso de las madres, con un 6% que se encuentran en situación de desempleo, frente al 5,6% de los padres.

Por otro lado, la tasa de madres que se dedican en exclusiva al trabajo dentro del hogar es del 23,8%, mientras que los padres apenas obtienen representatividad en lo que a trabajo exclusivamente doméstico se refiere (2,9%).

GRÁFICO 2.3: SITUACIÓN LABORAL DE LOS PADRES



Analizando el nivel de estudios más elevado completado por los padres, encontramos los más altos porcentajes en los estudios de Graduado escolar, bachillerato o FPI, en los primarios y en Bachillerato Superior o FP de Segundo Grado, tanto para el padre o la madre, y tal y como se aprecia en la tabla 2.1.

TABLA 2.1 NIVEL MÁS ALTO DE ESTUDIOS COMPLETADO POR LOS PADRES

	PADRE	MADRE
Sin estudios o primarios sin terminar	6,1	5,2
Primarios completos, 6º EGB completo, certificado escolar	19,4	20,6
8º EGB, Graduado escolar, Bachillerato, FP 1º grado	20,4	22,6
BUP, Bachillerato Superior, COU, Preu, FP de segundo grado	18,3	18,3
Estudios universitario	16,5	17,5
No sabes	19,3	15,9

El análisis del consumo de las diferentes sustancias en función del sexo, y teniendo en cuenta las prevalencias del consumo alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en los últimos

30 días, revela significativas diferencias de género en los patrones de consumo. Así, los chicos consumen en mayor medida cannabis, GHB, alucinógenos y heroína, mientras que las chicas presentan mayores proporciones de consumo en el resto de sustancias.

TABLA 2.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS SEGÚN SEXO


	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES	HOMBRES	MUJERES
· Tabaco	36,1	45,1	28,2	37	20,7	27,1
· Alcohol	75,6	77,5	74,4	76,4	60,2	63
· Tranquilizantes con / sin receta	15,8	21	8,2	12,1	4,5	5,8
· Tranquilizantes sin receta	8,8	13,3	5	7,4	2,7	3,3
· Cannabis	36,8	35,4	30,8	28,8	21,7	17,8
· Cocaína (base o polvo)	3,2	3,6	2	2,4	1,2	1,1
· Cocaína (base)	1,8	2,4	1,1	1,6	0,7	0,9
· Cocaína (polvo)	2,5	2,9	1,7	1,8	0,8	0,8
· GHB	1,2	1,1	0,7	0,7	0,4	0,6
· Éxtasis	2,2	2,9	1,8	1,6	0,8	1,1
· Speed y anfetaminas	1,6	2	1	1	0,8	0,5
· Alucinógenos	4,5	3,6	2,9	2,3	1	1,5
· Heroína	1,1	0,8	0,8	0,4	0,5	0,5
· Sustancias volátiles	1,6	2,1	0,8	1,4	0,5	1,1

Si observamos los resultados concluimos también que el alcohol es la sustancia de consumo más extendida entre las y los estudiantes de entre 14 y 18 años, seguido del tabaco como sustancia más consumida por las chicas, mientras que en el caso de los chicos el hachís ocupa el segundo puesto en cuando a prevalencias del consumo.

En general, la proporción de consumidores y consumidoras aumenta con la edad, entre los 14 y los 18 años, para prácticamente todas las sustancias, aunque con excepciones. Así, el consumo de heroína disminuye entre esas edades, el de speed, sustancias volátiles y éxtasis disminuye en el paso de los 14 a los 16 años, y el de tranquilizantes y cocaína al pasar de los 16 años a los 18.


Por su parte, el alcohol es la sustancia cuyo consumo experimenta el mayor incremento entre los 14 y los 16 años, y el cannabis entre los 16 y los 18. El gráfico 2.5 presenta estos resultados.

GRÁFICO 2.5: PREVALENCIA DE CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE DISTINTAS SUSTANCIAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD




Con respecto a la percepción del riesgo que el alumnado tiene sobre el consumo habitual de drogas, observamos que el valor máximo, a juicio de las y los estudiantes entrevistados, está en el consumo habitual de heroína, y así, un 95,7% asocia bastantes o muchos problemas al consumo de dicha sustancia, pero también la cocaína, el éxtasis y el speed son drogas a las que se asocian riesgos elevados para la salud. En el extremo opuesto, el alcohol es la sustancia sobre la que se percibe un riesgo menor.

GRÁFICO 2.6: PROBLEMAS DE SALUD PERCIBIDOS POR EL CONSUMO HABITUAL DE DIFERENTES SUSTANCIAS.



El tabaco y el alcohol son las sustancias consideradas más accesibles por el alumnado encuestado, seguidas del cannabis y los tranquilizantes. La heroína, el speed, el éxtasis y la cocaína son, por ese orden, las drogas que se perciben como más difíciles de conseguir, y también las que presentan mayores porcentajes de estudiantes que no saben valorar esta cuestión.

GRÁFICO 2.7: DIFICULTADES PERCIBIDAS PARA CONSEGUIR DIVERSAS SUSTANCIAS.



En la siguiente tabla podemos observar los resultados obtenidos en nuestra CCAA en lo que a las prevalencias del consumo de diferentes sustancias se refiere.

TABLA 2.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS

	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
	Baleares 2010	Baleares 2010	Baleares 2010
Tabaco	40,8	32,8	24
Alcohol	76,6	75,4	61,6
Tranquilizantes sin receta	11,2	6,3	3
Cannabis	36,1	29,8	19,7
Cocaína	3,4	2,2	1,1
Heroína	0,9	0,6	0,5
Speed y anfetaminas	1,8	1	0,6
Alucinógenos	4,1	2,6	1,3
Sustancias volátiles	1,8	1,1	0,8
Éxtasis	2,6	1,7	0,9

TABLA 2.3 - A	PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS SEGÚN ISLA				
	ALGUNA VEZ EN LA VIDA				
	Baleares 2010	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera
Tabaco	40,8	37,3	44,9	41	48,1
Alcohol	76,6	74,2	85,7	72,8	83,4
Tranquilizantes sin receta	11,2	10,4	8,8	12,9	14,6
Cannabis	36,1	31	38,2	38	51,6
Cocaína	3,4	1,7	5,2	3,4	8,9
Heroína	0,9	0,7	1,3	1	1,3
Speed y anfetaminas	1,8	0,8	2,5	1,9	4,4
Alucinógenos	4,1	3,4	5,4	3,6	7
Sustancias volátiles	1,8	1	2,5	2	3,8
Éxtasis	2,6	1,4	2,9	3,1	6,3

TABLA 2.3 - B	PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS SEGÚN ISLA				
	EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES				
	Baleares 2010	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera
Tabaco	32,8	30,7	35,2	32,8	37,8
Alcohol	75,4	73,4	85,1	70,9	82,9
Tranquilizantes sin receta	6,3	6	5,9	6,4	8,9
Cannabis	29,8	24,7	30,3	32,8	43,7
Cocaína	2,2	1	3,6	2,2	5,1
Heroína	0,6	0,4	0,7	0,6	1,3
Speed y anfetaminas	1	0,4	1,8	1	2,5
Alucinógenos	2,6	1,8	3,9	2,8	2,5
Sustancias volátiles	1,1	0,7	1,6	1,1	2,5
Éxtasis	1,7	0,8	1,4	2,5	4,4

TABLA 2.3 - C	PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE DIFERENTES SUSTANCIAS SEGÚN ISLA				
	EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS				
	Baleares 2010	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera
Tabaco	24	23,3	25,2	23,6	27,6
Alcohol	61,6	58,1	68,3	60	71,2
Tranquilizantes sin receta	3	3,1	2	2,9	6,3
Cannabis	19,7	15,9	18,7	22,5	31,8
Cocaína	1,1	0,4	2	1,1	3,8
Heroína	0,5	0,3	0,7	0,6	0,6
Speed y anfetaminas	0,6	0,3	0,4	1	1,9
Alucinógenos	1,3	0,8	1,6	1,4	1,9
Sustancias volátiles	0,8	0,6	0,9	1	1,9
Éxtasis	0,9	0,4	0,4	1,6	1,9


A la vista de los datos, y para los tres períodos analizados (alguna vez en la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días), podemos afirmar que, en general, que el alcohol, el tabaco y el cannabis son las sustancias que presentan las prevalencias más altas.

TABLA 2.4		EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE LAS DISTINTAS DROGAS
		Baleares
· Tabaco		13,69
· Alcohol		13,85
· Tranquilizantes sin receta		13,99
· Cannabis		14,64
· Cocaína		14,60
· Heroína		12,41
· Speed y anfetaminas		14,22
· Alucinógenos		15,15
· Sustancias volátiles		12,93
· Éxtasis		14,78

La edad media de inicio al consumo de las distintas drogas oscila entre un mínimo de 12,9 años en el caso de los inhalables volátiles, y un máximo de 15,1 años en el caso de los alucinógenos.


Un 47,1% de estudiantes baleares reconoció haber faltado algún día completo a clase durante los 30 días previos a la realización de la Encuesta. La mayoría (77,8%) justificó su ausencia por enfermedad o necesidad de ir al médico, mientras que el 24,4% mencionó otros motivos, el 16,8% afirmó haber faltado por no haber tenido ganas de ir y un 5,6% se ausentó para asistir a un funeral o atender a familiares enfermos.

GRÁFICO 2.8: MOTIVOS PARA NO ASISTIR, DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS, ALGÚN DÍA COMPLETO A CLASE.



Un 31,8% declaró haber repetido curso alguna vez, el 24,7% sólo un curso y el 7,1% dos o más. Los resultados se presentan en el gráfico que sigue a continuación:

GRÁFICO 2.9: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES SEGÚN HAYAN REPETIDO CURSO ALGUNA VEZ.



La hora de regreso a casa durante las salidas nocturnas se ha retrasado sustancialmente, de manera que el tramo horario más frecuente durante la última salida en fin de semana es el que transcurre entre las 4 y las 8 de la mañana, opción escogida por un 22,4% de las y los jóvenes entrevistados. Existen sin embargo diferencias en función de la edad: mientras las y los estudiantes de 14 y 15 años regresan mayoritariamente a horas tempranas, a partir de los 16 años son mayoritarios los regresos posteriores a las 4 de la madrugada. La tabla 2.5 describe esta situación:

TABLA 2.5 HORA DE REGRESO A CASA LA ÚLTIMA SALIDA EN FIN DE SEMANA POR EDAD

	14	15	16	17	18	Total
Antes de las 12	41,6	22	7,6	5,4	3,6	16
Entre las 12 y la 1	28,6	24	17	8	2,4	17,9
Entre la 1 y las 2	10,2	17,3	14,2	9,2	4,8	12,8
Entre las 2 y las 3	7,1	10,1	14,8	12	11,5	11,5
Entre las 3 y las 4	5,9	10,4	16,9	20,5	24,8	14,7
Entre las 4 y las 8	4,8	11,4	23,9	40,2	45,5	22,4
Después de las 8	1,7	4,7	5,5	4,8	7,3	4,7

En cuanto a la frecuencia de salidas nocturnas, un 9,8% del alumnado balear que respondió a la Encuesta reconoció no haber salido nunca en los últimos 12 meses, mientras que un 44,3% señaló haberlo hecho entre 1 y 3 noches cada mes. Por edades, la frecuencia de salidas nocturnas aumenta con la edad.

TABLA 2.6 FRECUENCIA DE SALIDAS NOCTURNAS EN EL ÚLTIMO AÑO

	14	15	16	17	18	Total
Nunca	16,6	12	7,2	6,7	4,6	9,8
De 1 a 3 noches al mes	35,7	44,4	47,1	47,1	44,6	44,3
4 noches al mes	20,7	21,4	24,8	20,9	20	22,1
Más de 4 noches al mes	27	22,2	21	25,3	30,9	23,8

El cruce de la frecuencia de las salidas nocturnas con la edad revela que ambas variables guardan relación directa con el consumo de drogas ilegales, de manera que encontramos las mayores tasas de consumo entre quienes han salido 4 noches al mes o más, sobre todo entre el alumnado de mayor edad.

TABLA 2.7 CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN FRECUENCIA DE SALIDAS NOCTURNAS

	14	15	16	17	18
Nunca	10,6	12,2	7,8	12,6	0,0
De 1 a 3 noches al mes	16,5	26,9	33,9	36,9	28,4
4 noches al mes	21,7	30,4	50,4	46	57,5
Más de 4 noches al mes	43,3	50	59,7	67,8	67,8

Del mismo modo, la hora de regreso a casa en la última salida en fin de semana parece influir en el consumo de drogas ilegales, de manera también proporcional a la edad, y tal y como refleja la tabla 2.8.

TABLA 2.8 CONSUMO DE DROGAS ILEGALES EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN HORA DE REGRESO A CASA LA ÚLTIMA SALIDA EN FIN DE SEMANA

	14	15	16	17	18
Antes de las 12	17,4	15,9	22,5	38,7	14,7
Entre las 12 y la 1	29,6	30,3	31,5	26,2	0,0
Entre la 1 y las 2	25,1	39,3	44,3	18,8	22,7
Entre las 2 y las 3	29,8	39,3	33,7	46,6	15,4
Entre las 3 y las 4	38,2	38,5	46	55,9	40,1
Entre las 4 y las 8	64,1	43,2	61,2	52,4	62,8
Después de las 8	63,2	59,1	61,5	65,8	83,8

3. PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

3.1.TABACO

Un 40,8% de estudiantes baleares de entre 14 y 18 años reconoció haber consumido tabaco en alguna ocasión. Por sexos, el consumo de tabaco es superior en las mujeres. Los datos de la tabla 3.1.1 confirman las citadas diferencias en función del sexo. Atendiendo a la edad de la persona encuestada, la misma tabla pone de manifiesto que el consumo de tabaco aumenta con la edad.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD		
TABLA 3.1.1	Alguna vez Baleares 2010	Últimos 30 días Baleares 2010
Total	40,8	24
Sexo		
Hombre	36,1	20,7
Mujer	45,1	27,1
Edad		
14 años	27,8	12,4
15 años	37,1	21,9
16 años	44,7	24,7
17 años	48,4	32,3
18 años	49,1	34,1

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco en los 12 meses previos a la realización de la Encuesta, encontramos que la tasa de fumadoras supera en 8,8 puntos a la de fumadores, y que ésta aumenta conforme lo hace la edad, excepto en el paso de los 17 a los 18 años, momento en que disminuye.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.1.2	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	32,8
Sexo	
Hombre	28,2
Mujer	37
Edad	
14 años	21,8
15 años	29,8
16 años	35,5
17 años	40,3
18 años	38,6

La siguiente tabla presenta la prevalencia del consumo de tabaco por islas para los tres períodos temporales estudiados:

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN ISLA	
TABLA 3.1.2.1	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	40,8
Isla	
Mallorca	37,3
Menorca	44,8
Eivissa	41
Formentera	48,1
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	32,8
Isla	
Mallorca	30,8
Menorca	35,3
Eivissa	32,8
Formentera	37,4
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	24
Isla	
Mallorca	23,3
Menorca	25,2
Eivissa	23,6
Formentera	27,5

Se recogen a continuación las prevalencias de consumo en función del sexo y la edad simultáneamente, y así se observa que el consumo de tabaco se incrementa con la edad, con

la única excepción del paso de los 16 a los 17 años en el caso de los hombres, y de los 17 a los 18 en el caso de las mujeres. Además, las prevalencias del consumo son superiores en las mujeres para todos los grupos de edad y en todos los períodos estudiados.

TABLA 3.1.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	27,5	33,9	40,4	35,7	45,8	28	39,8	49	60,1	52,8
Consumo últimos 12 meses	19,6	26,1	32,5	27,8	37,2	23,6	32,9	38,5	51,9	40
Consumo últimos 30 días	10,5	19,2	22,9	22,5	32,7	14,2	24,1	26,4	41,3	35,3

La tabla 3.1.4 muestra los incrementos porcentuales de consumo al pasar de un grupo de edad al siguiente. El mayor incremento (82,9%) se encuentra entre los chicos que pasan de 14 a 15 años, y el menor (-22,9%), en el paso de las chicas de los 17 a los 18 años.

TABLA 3.1.4

INCREMENTOS PORCENTUALES EN CONSUMO DE TABACO AL PASAR DE UNA EDAD A LA SIGUIENTE SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES				MUJERES			
	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18	14 a 15	15 a 16	16 a 17	17 a 18
Consumo alguna vez	23,3	19,2	-11,6	28,3	42,1	23,1	22,7	-12,1
Consumo últimos 12 meses	33,2	24,5	-14,5	33,8	39,4	17,0	34,8	-22,9
Consumo últimos 30 días	82,9	19,3	-1,7	45,3	69,7	9,5	56,4	-14,5

En la tabla 3.1.5 se muestra la relación entre el consumo de tabaco y el tipo de enseñanza:

TABLA 3.1.5 PREVALENCIAS DE CONSUMO DE TABACO SEGÚN TIPO DE ENSEÑANZA

	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS	EDAD MEDIA INICIO
ESO	37,5	30,2	22,3	13,22
Bachillerato	44,3	34,8	24,1	14,36
Ciclos Formativos de Grado Medio	51,4	45,3	39,2	13,76
Ciclos Formativos de Grado Superior	-	-	-	-

El alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio es el que presenta una mayor prevalencia de consumo en los tres indicadores, y el de ESO es el que muestra una prevalencia menor. Son las y los alumnos de la ESO quienes presentan una menor media de inicio al consumo (13,22

años). La mayor edad media de inicio al consumo de tabaco la encontramos entre el alumnado de Bachillerato (14,36 años).

En la siguiente tabla se observa que, tanto para hombres como para mujeres, la cantidad más habitual de cigarrillos consumidos diariamente es entre 1 y 5. Además, se observa que la prevalencia de consumo no va necesariamente asociada a la cantidad consumida, puesto que aunque la prevalencia es mayor en las mujeres, la cantidad de cigarrillos diarios es superior en los hombres: un 7,9% reconoce fumar más de 10 cigarros al día, frente a un 4,9% de mujeres que señala esa misma cantidad.

FRECUENCIAS DE CONSUMO DE TABACO Y CANTIDAD DIARIA CONSUMIDA ENTRE LOS CONSUMIDORES DE TABACO LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS			
TABLA 3.1.6			
	Hombres	Mujeres	Total
De 1 a 5 cigarrillos	78,7	76,5	77,4
De 6 a 10 cigarrillos	13,4	18,6	16,4
Más de 10 cigarrillos	7,9	4,9	6,2

Un 33,7% de las y los estudiantes que han fumado los últimos 30 días consumen tabaco a diario, un porcentaje que es superior entre los hombres y que aumenta además conforme lo hace la edad. Se observa asimismo que la prevalencia es mayor entre el alumnado de centros públicos, mientras que si atendemos al tipo de enseñanza, es el alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio el que presenta un mayor consumo diario, alcanzando un 57,4%.

PREVALENCIA EN EL CONSUMO DIARIO DE TABACO SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
TABLA 3.1.7.1	
Total	33,7
Sexo	
Hombre	36,4
Mujer	31,9
Edad	
14 años	18,2
15 años	26,5
16 años	29,3
17 años	41,5
18 años	56,9
Titularidad	
Pública	36,5
Privada	27,9
Tipo de Enseñanza	
ESO	27
Bachillerato	36
CFGM	57,4
CFGS	-

En la tabla 3.1.8 aparecen las frecuencias de consumo de tabaco en los últimos 30 días, desagregadas por sexo y edad. La mayoría (76,1%) nunca ha fumado, una situación que es más habitual entre los hombres (79,4%) que entre las mujeres (73,1%). El 8% de las y los estudiantes de secundaria baleares consumen tabaco diariamente, frente al 12,3% en ámbito nacional. Con respecto a la edad, se observa que a medida que ésta aumenta, lo hace también el consumo diario de tabaco, y así, es el alumnado de 18 años el que con mayor frecuencia reconoce fumar diariamente (19,3%).

TABLA 3.1.8 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE TABACO EN LOS 30 ÚLTIMOS DÍAS POR SEXO Y EDAD

	Nunca	Menos de un día a la semana	Algún día a la semana, pero no diariamente	Diariamente
Total	76,1	5,5	10,3	8
Sexo				
Hombre	79,4	4,5	8,6	7,5
Mujer	73,1	6,4	11,9	8,6
Edad				
14 años	87,4	4,9	5,3	2,3
15 años	78,4	5,2	10,6	5,7
16 años	75,6	4,8	12,4	7,2
17 años	67,8	7,2	11,5	13,5
18 años	65,9	6,3	8,5	19,3

El número medio de cigarrillos consumidos al día (3,86) aumenta conforme lo hace la edad. En general, el nivel de consumo de las mujeres (3,8) es ligeramente inferior al de los hombres (3,94), y alcanza su máximo valor entre el alumnado de Ciclos Formativos de Grado Medio (6,35), sobre todo el matriculado en centros de titularidad pública (4,09).

TABLA 3.1.9.1 NÚMERO MEDIO DE CIGARRILLOS CONSUMIDOS AL DÍA, SEGÚN SEXO, EDAD, TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
Total	3,86
Sexo	
Hombre	3,94
Mujer	3,8
Edad	
14 años	3,09
15 años	3,21
16 años	3,64
17 años	4,14
18 años	6,15
Titularidad	
Pública	4,09
Privada	3,42
Tipo de Enseñanza	
ESO	3,62
Bachillerato	3,37
CFGM	6,35
CFGS	-

La edad media de inicio al consumo de tabaco es de 13,69 años, un valor que aumenta ligeramente conforme lo hace la edad, y que es muy similar en varones y mujeres. En cuanto a la edad media de comienzo de consumo diario, se sitúa en 14,52 años y sigue la tendencia de la edad de inicio, tanto en lo que se refiere al cruce por sexo como al cruce por edad. Estos resultados pueden verse en la tabla 3.1.10.

TABLA 3.1.10 EDAD MEDIA DE COMIENZO DE CONSUMO DE TABACO SEGÚN SEXO Y EDAD (Fumadores actuales)								
	TOTAL	SEXO		EDAD				
		HOMBRE	MUJER	14	15	16	17	18
Baleares 2010								
Edad media de consumo por primera vez	13,69	13,65	13,73	12,5	13,36	13,88	14,27	14,01
Edad media de comienzo de consumo diario	14,52	14,49	14,54	12,85	13,78	14,55	15,2	15,3

Las tablas que siguen a continuación presentan las frecuencias con las que las y los estudiantes han visto fumar, dentro del centro educativo, al profesorado (tabla 3.1.10.1), a estudiantes (tabla 3.1.10.2) y a otras personas (tabla 3.1.10.3), según la titularidad del centro y la edad.

La situación más habitual es que el alumnado no haya visto fumar a profesores o profesoras dentro del centro educativo ningún día (54,1%), sobre todo las y los estudiantes más jóvenes, encontrándose la frecuencia más elevada para esta opción en los 14 años. La titularidad del centro resulta también muy significativa en este aspecto, siendo más común el haber visto fumar al profesorado en centros públicos que en centros privados.

FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A <u>PROFESORES</u> DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD Y EDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	54,1	16,3	6	6	13,6
Titularidad					
Pública	42,2	22,9	7,6	7,8	14,7
Privada	76,8	3,5	2,8	2,6	11,6
Edad					
14 años	62,8	11,6	3,3	6	13,5
15 años	56,8	11,7	7,1	6,4	14,9
16 años	52,1	14,6	7,2	7	14,2
17 años	50,6	21,6	5,5	4,6	11,8
18 años	40	39,4	4	4	10,9

Respecto a la frecuencia con la que han visto fumar a estudiantes dentro del centro educativo, un 31% reconoce que todos o casi todos los días que ha ido a clase presencié esta situación. La frecuencia para esta opción aumenta a medida que lo hace la edad, y es asimismo más elevada en los centros públicos que en los privados.

FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A <u>ESTUDIANTES</u> DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD Y EDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	33,2	31	9,4	8,3	15,2
Titularidad					
Pública	24,3	38,7	10,8	8,8	14,2
Privada	50,2	16,3	6,9	7,4	17,1
Edad					
14 años	42,1	22,1	8,4	7,2	18,4
15 años	36,5	25,3	10	8	17,3
16 años	31,2	33,4	11,6	7,8	12,5
17 años	27,9	35,9	7,4	11,3	14,8
18 años	21,6	54,5	6,3	5,7	10,8

Por último, un 47,7% declaró no haber visto fumar a otras personas dentro del centro educativo, encontrándose el porcentaje más elevado para esta opción en las y los estudiantes de 14 años y en los centros privados.

TABLA 3.1.11.3 FRECUENCIA CON LA QUE HAS VISTO FUMAR A OTRAS PERSONAS DENTRO DEL CENTRO EDUCATIVO SEGÚN TITULARIDAD Y EDAD					
	Ningún día	Todos o casi todos los días que has ido a clase	Más de la mitad de los días	Aproxim. la mitad de los días	Menos de la mitad de los días
Total	47,7	18,6	6,7	6,3	12,3
Titularidad					
Pública	40,1	23	7,7	7	12,1
Privada	62,3	10,2	4,8	5,1	12,7
Edad					
14 años	55	14,5	7,2	6,5	11,4
15 años	51,7	15,7	6,6	6	13,8
16 años	44,1	18	7	8,9	12,9
17 años	48,2	21,6	4,1	2,8	10,5
18 años	25,7	35,4	13,1	7,4	9,7

Las tablas que siguen a continuación presentan las frecuencias de diferentes planteamientos sobre el tabaco (planteamiento de dejarlo, intentos efectivos de hacerlo, molestia de que se fume en lugares cerrados y personas con las que se convive y que fuman). En primer lugar un 42,9% de las y los jóvenes fumadores encuestados se han planteado en algún momento dejar de fumar y lo han intentado realmente; un 33,7% se lo han planteado pero no lo han intentado y un 23,2% ni siquiera se lo han planteado.

TABLA 3.1.12 SE HA PLANTEADO DEJAR DE FUMAR SEGÚN SEXO Y EDAD			
	Sí y lo ha intentado	Sí pero no lo ha intentado	No se lo ha planteado
Total	42,9	33,7	23,2
Sexo			
Hombre	38,2	39,1	22,7
Mujer	46,1	30,1	23,8
Edad			
14 años	42	36	22
15 años	42,9	32,5	24,5
16 años	40,4	32,8	26,8
17 años	45,6	32,5	21,9
18 años	45,5	41,8	12,7

Respecto a los que piensan actualmente en dejar de fumar, un 29,9% ha decidido que dejará de fumar en los próximos 30 días, un 29,7% lo intentará en los próximos 6 meses y un 40,4% no piensa dejar de fumar, al menos en los próximos 6 meses. En función del sexo, la intención de dejar de fumar a corto o a medio plazo es más evidente entre las mujeres.

PIENSA ACTUALMENTE EN DEJAR DE FUMAR SEGÚN SEXO Y EDAD			
TABLA 3.1.13	Sí, ha decidido que dejará de fumar en los próximos 30 días	Sí, le gustaría dejar de fumar en los próximos 6 meses	No piensa dejar de fumar, al menos en los próximos 6 meses
Total	29,9	29,7	40,4
Sexo			
Hombre	28,8	24,4	46,8
Mujer	30,6	33,4	36
Edad			
14 años	32,7	30,6	36,7
15 años	36,7	29,7	33,5
16 años	26,3	29,1	44,6
17 años	26,1	33,9	40
18 años	28,1	19,3	52,6

Respecto a las opiniones del alumnado entrevistado acerca de la molestia que les causa que otras personas fumen en lugares cerrados en su presencia, observamos que al 45% les molesta poco o nada mientras que al 54,9% les incomoda mucho o bastante.

LE MOLESTA QUE OTRAS PERSONAS FUMEN EN LUGAR CERRADO SEGÚN SEXO Y EDAD				
TABLA 3.1.14	Nada	Mucho	Bastante	Poco
Total	16,6	27,1	27,8	28,4
Sexo				
Hombre	16,7	28,4	28,4	26,5
Mujer	16,5	25,9	27,4	30,2
Edad				
14 años	12,9	32,9	29,7	24,5
15 años	16,5	28,3	27,1	28,1
16 años	14,8	25,7	29,6	30
17 años	20,4	22,9	26,4	30,3
18 años	22,5	26,6	23,7	27,2

La convivencia con personas que fuman diariamente alcanza al 43,7% de estudiantes encuestados.

TABLA 3.1.15		PERSONAS CON LAS QUE CONVIVE QUE FUMEN DIARIAMENTE SEGÚN SEXO Y EDAD		
	No	Sí	Vive en un centro educativo o institución	Vive solo/a
Total	55,7	43,7	0,4	0,1
Sexo				
Hombre	56,3	43,0	0,5	0,2
Mujer	55,1	44,4	0,4	0,1
Edad				
14 años	56,1	42,9	0,7	0,5
15 años	57,7	41,7	0,5	0,1
16 años	56,6	42,9	0,4	0,1
17 años	56,2	43,6	0,2	0,0
18 años	40,9	59,1	0,0	0,0

3.2. ALCOHOL

El consumo de bebidas alcohólicas sigue estando muy extendido entre las y los estudiantes de 14 a 18 años. En términos globales, un 76,6% de jóvenes de las Islas Baleares han consumido alcohol alguna vez en su vida. Por sexos, el consumo de alcohol es sensiblemente superior entre las mujeres que entre los varones para los tres indicadores. Si atendemos a la edad, la prevalencia del consumo de alcohol aumenta con los años, excepto en el paso de los 17 a los 18 años. Entre los 14 y los 16, dicho aumento es especialmente significativo.

TABLA 3.2.1. PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD

Alguna vez	
Baleares	
Total	76,6
Sexo	
Hombre	75,6
Mujer	77,5
Edad	
14 años	58,2
15 años	70,6
16 años	82
17 años	88,3
18 años	84,1

TABLA 3.2.2. PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD

Últimos 12 meses	
Baleares	
Total	75,4
Sexo	
Hombre	74,4
Mujer	76,4
Edad	
14 años	56,4
15 años	69,2
16 años	81,1
17 años	87,3
18 años	83,2

TABLA 3.2.3. PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD

Últimos 30 días	
Balears	
Total	61,6
Sexo	
Hombre	60,2
Mujer	63
Edad	
14 años	44,2
15 años	55,5
16 años	67,2
17 años	71,4
18 años	71,3

Se presentan a continuación las prevalencias del consumo de alcohol por islas, y así, observamos que son las y los jóvenes menorquines quienes presentan las mayores prevalencias para los períodos alguna vez en la vida y últimos 12 meses, mientras que si nos referimos a los últimos 30 días es el alumnado de Formentera el que muestra la mayor tasa de consumo, con un 71,3% que reconocen haber bebido alcohol en este período.

TABLA PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN ISLA

ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	76,6
Isla	
Mallorca	74,3
Menorca	85,7
Eivissa	72,8
Formentera	83,6
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	75,4
Isla	
Mallorca	73,4
Menorca	85,1
Eivissa	70,9
Formentera	82,4
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	61,6
Isla	
Mallorca	58,1
Menorca	68,2
Eivissa	59,9
Formentera	71,3

En la siguiente tabla se muestra la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días en función del consumo de tabaco.

Si, como veíamos en la tabla anterior, la prevalencia del consumo de alcohol en los últimos 30 días era del 61,6%, al cruzar este indicador con el consumo de tabaco obtenemos una distribución muy diferente. Así, mientras que un 52,3% reconocen consumir alcohol pero no tabaco, el porcentaje se eleva hasta a un 87,2% para las y los consumidores de ambas sustancias.

TABLA 3.2.4		PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS	
		ALCOHOL	
		Consumo	No consume
TABACO	Consumo	87,2	12,8
	No consume	52,3	47,7

En la tabla 3.2.5 se presentan los datos referentes a la edad media de consumo de bebidas alcohólicas por primera vez, que se sitúa en esta ocasión en 13,9 años. Por su parte el dato referente a la edad media de comienzo de consumo semanal es de 14,9 años en esta edición.

Por sexos, chicos y chicas se inician en el consumo de alcohol y comienzan su consumo semanal prácticamente a la misma edad. En cuanto a la edad, observamos que a medida que ésta aumenta, lo hacen también las edades medias de inicio al consumo, tanto por primera vez como semanalmente.

TABLA 3.2.5		EDAD MEDIA DE COMIENZO DE CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN SEXO Y EDAD						
		TOTAL	SEXO		EDAD			
	HOMBRE		MUJER	14	15	16	17	18
Baleares 2010								
Edad media de consumo por primera vez	13,9	13,8	13,9	12,8	13,6	13,9	14,5	14,9
Edad media de comienzo de consumo semanal	14,9	14,8	15,0	12,0	14,2	14,9	15,4	16,0

Atendiendo a la intensidad en el consumo de alcohol, un 59,2% de las y los jóvenes baleares reconocieron haberse emborrachado alguna vez en su vida. Por su parte, un 53,2% se emborrachó en los últimos 12 meses y un 34,3% lo hizo en los últimos 30 días.

TABLA 3.2.6 PREVALENCIAS DE BORRACHERAS SEGÚN SEXO Y EDAD

	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
Total	59,2	53,2	34,3
Sexo			
· Hombres	57,7	52,4	33,9
· Mujeres	60,6	53,9	34,7
Edad			
· 14 años	35,1	31,8	21,2
· 15 años	48,3	42	26,7
· 16 años	67,7	61,4	39
· 17 años	75,9	68,4	42,4
· 18 años	73,2	66,4	50,7

Estos resultados aparecen distribuidos conjuntamente por sexo y edad en la tabla 3.2.7, que pone de manifiesto como, a medida que aumenta la edad, aumenta también la prevalencia de borracheras, excepto en el paso de las mujeres de los 17 a los 18 años para alguna vez en la vida y para los últimos 12 meses, y de los hombres a partir de los 16 años para alguna vez en la vida, y entre los 17 y los 18 años en los últimos 12 meses.


TABLA 3.2.7 PREVALENCIAS DE BORRACHERAS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	33,3	42,7	71,6	71	70,9	36,5	53,2	63,9	80,1	75,6
Consumo últimos 12 meses	30,2	37,7	63,6	67,3	66,4	33,1	45,8	59,4	69,3	66,3
Consumo últimos 30 días	18,5	24,3	39,7	41,9	54,8	23,2	28,9	38,2	42,7	46,5

El mayor incremento en el porcentaje de jóvenes que reconoce haberse emborrachado en alguno de los períodos se produce entre los 15 y los 16 años, tanto en las chicas como en los chicos, con la excepción del período “alguna vez en la vida” en el caso de las chicas, que en este espacio temporal experimentan el mayor incremento entre los 14 y los 15 años. Además, los incrementos se reducen conforme aumenta la edad, aunque sólo llegan a ser negativos en las edades y períodos temporales ya descritos.

La prevalencia de atracones de alcohol o “*binge drinking*” (5 ó más copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los últimos 30 días entre el alumnado de Baleares de entre 14 y 18 años fue de un 61,6% (64,7% en hombres y 58,9% en las mujeres). Por edad las mayores prevalencias se encuentran entre las y los jóvenes estudiantes de 18 años (74,5%) (Gráfico 3.2.1).

GRÁFICO 3.2.1: PREVALENCIA DE ATRACONES DE ALCOHOL (BINGE DRINKINGS) EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS



La tabla 3.2.9 presenta los datos obtenidos en relación a la cantidad de alcohol ingerida, y en función del sexo y la edad del alumnado.

En general, la toma de 5 vasos o más de alcohol en una misma ocasión en los últimos 30 días aumenta a medida que lo hace la edad, y es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Nuevamente, la frecuencia de borracheras es más elevada en las islas de Menorca y Formentera para cualquiera de los períodos analizados.

TABLA 3.2.7 B PREVALENCIA DE BORRACHERAS SEGÚN ISLA

	ISLA				
	Baleares	Mallorca	Menorca	Eivissa	Formentera
Consumo alguna vez	59,2	53,4	71,4	57,2	68,3
Consumo últimos 12 meses	53,2	46,8	66,5	50,4	67,2
Consumo últimos 30 días	34,3	27,8	39,4	35,7	51,2

TABLA 3.2.9 FRECUENCIA EN LA TOMA DE 5 Ó MÁS VASOS DE ALCOHOL EN UNA MISMA OCASIÓN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	30,9	18,9	11,4	8,2	6,7	2,6	0,9	0,9
Sexo								
· Hombres	28,4	19,7	10,2	9,7	6,7	3,5	1,3	0,8
· Mujeres	33,1	18	12,4	6,9	6,7	1,9	0,5	1
Edad								
· 14 años	31	14	4,4	5,7	3,9	1,7	1,3	1,7
· 15 años	31,5	17,4	11	7,2	5,2	1,7	1	0,8
· 16 años	32,2	18,4	11,5	7,4	8,6	2	0,9	1,1
· 17 años	31	21,4	15	9,7	7,6	4,6	0,3	0,8
· 18 años	23,4	25,8	12,5	16,4	7	3,9	1,6	0

Un 7,8% del alumnado balear ha viajado en cuatro ocasiones o más como pasajero/a en un vehículo de motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses, un dato que aumenta con la edad, y que alcanza el 14,3% para las y los jóvenes de 18 años. El sexo influye asimismo en el comportamiento aquí analizado, y así, los chicos viajan más frecuentemente que las chicas en vehículos conducidos por alguien bajo los efectos del alcohol.

FRECUENCIA CON LA QUE VIAJAN DE PASAJEROS EN UN VEHÍCULO DE MOTOR CONDUCIDO POR ALGUIEN BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	78,6	5,7	3,6	2,4	2,6	1,3	1	2,9
Sexo								
· Hombres	79,5	4,6	3,4	2	2,8	0,7	1,2	3,6
· Mujeres	77,9	6,6	3,7	2,7	2,3	1,8	0,8	2,3
Edad								
· 14 años	84,8	5,1	2,3	1,6	0,2	0,9	0,7	2,8
· 15 años	81,6	4,7	3,2	1,6	1,6	0,7	0,4	2,7
· 16 años	78,9	5,5	3,9	2,6	2,1	0,9	1,2	3,1
· 17 años	73,5	7	4,3	2,2	5,9	2	1,5	2,4
· 18 años	64,6	8,6	5,1	6,3	4,6	3,4	1,7	4,6

Los valores se reducen al preguntar por la propia conducción bajo los efectos del alcohol, tal y como muestra la tabla 3.2.11. Igual que ocurría con la tabla 3.2.10.1, la conducción de vehículos a motor bajo los efectos del alcohol es más frecuente en los chicos que en las chicas, pero en este sentido es interesante destacar que las mayores frecuencias se encuentran en los extremos de edad: los 14 años y los 18.

FRECUENCIA CON LA QUE HAS CONDUCIDO UN VEHÍCULO A MOTOR BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL EN LOS 12 ÚLTIMOS MESES SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	77,1	2,4	1,1	0,9	1	0,7	0,4	1,4
Sexo								
· Hombres	72,7	3,6	1,9	1	1,7	0,9	0,5	2,1
· Mujeres	81,2	1,3	0,4	0,8	0,4	0,5	0,3	0,8
Edad								
· 14 años	63,7	2,8	0,4	0,7	0,4	1,4	0	2,5
· 15 años	77,6	0,8	0,8	0,5	0,5	0,3	0,2	1
· 16 años	79,2	2,2	1,1	1,4	0,9	0,8	0,6	1,4
· 17 años	81,3	3,7	1,5	0,8	2,1	0,8	0,4	0,6
· 18 años	76,7	4	3,3	0,7	1,3	0,7	0,7	3,3

La tabla 3.2.12 refleja diferentes situaciones que pudieron haber vivido las y los estudiantes encuestados en los últimos 12 meses y el porcentaje de quienes habían consumido alcohol en las dos horas previas a plantearse la situación, en relación con el sexo, la edad y la titularidad del centro. La asistencia sanitaria urgente es la situación más habitual (11,7%), seguida de las

peleas o agresiones físicas (11,2%). Es en esta última situación donde encontramos la mayor brecha de género, siendo más habituales las peleas en varones que en mujeres. Sin embargo, el porcentaje de consumo de alcohol en las dos horas previas a la pelea o agresión es superior en las mujeres.

Los chicos han experimentado en mayor medida que las chicas todas las situaciones propuestas (accidente con asistencia médica, pelea o agresión física y detención por la policía o guardia civil), y para ambos sexos, las frecuencias aumentan en general conforme lo hace la edad.

PROBLEMAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO Y PORCENTAJE DE TABLA 3.2.12 JÓVENES QUE CONSUMIERON ALCOHOL EN LAS 2 HORAS ANTERIORES

	ACCIDENTE CON ASISTENCIA MÉDICA	CONSUMO DE ALCOHOL 2 HORAS PREVIAS	PELEA O AGRESIÓN FÍSICA	CONSUMO DE ALCOHOL 2 HORAS PREVIAS	ASISTENCIA SANITARIA URGENTE	CONSUMO DE ALCOHOL 2 HORAS PREVIAS	DETENIDO POR POLICIA O GUARDIA CIVIL	CONSUMO DE ALCOHOL 2 HORAS PREVIAS
Total	6	7,9	11,2	27,4	11,7	7,2	5	34
Sexo								
· Hombres	7,8	8,5	16,6	23,9	12	8	7,3	30,8
· Mujeres	4,4	6,9	6,3	35,7	11,3	6,5	2,9	41,3
Edad								
· 14 años	4,4	13,1	11,6	13	11,4	7,8	4,4	36,7
· 15 años	5,2	9,4	11,5	16,9	12,9	3	4,7	28,7
· 16 años	5,7	8,6	9,7	34	9,5	12,4	5	42,8
· 17 años	7,4	6,7	10,5	31	13,3	4,9	5,6	36
· 18 años	10,5	0	17,4	58,2	11,1	17	5,6	9,8
Titularidad								
· Público	6,2	8,4	11,3	30,7	12	7,4	5,4	37,2
· Privado	5,7	6,8	10,9	21,1	11	6,9	4,2	26,6

El consumo de alcohol es más común durante el fin de semana (66,6%) que en días laborables (25%). Atendiendo al tipo de bebida alcohólica más consumida, destacan los combinados o cubatas en fin de semana (73,1%), seguidos de la cerveza (40,3%), aunque en este caso es significativa la diferencia entre mujeres y hombres que consumen esta bebida (33,3% frente a 48,3%). Durante la semana, la cerveza pasa a ocupar el primer puesto, con un 19,5%, y las diferencias en el consumo de hombres y mujeres vuelven a ser evidentes (24,2% frente a 15,4%). El vermut es la bebida menos consumida, tanto en días laborables como en fines de semana.

TABLA 3.2.13 PREVALENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN TIPO DE BEBIDA						
	ALGÚN FIN DE SEMANA			ALGÚN DÍA LABORABLE		
	HOMBRE	MUJER	TOTAL	HOMBRE	MUJER	TOTAL
Total	65,8	67,3	66,6	27,9	22,4	25
Tipo de bebida						
· Vino / Champán	19,7	16	17,8	8,9	6,6	7,7
· Cerveza	48,3	33,3	40,3	24,2	15,4	19,5
· Aperitivos / Vermut	12	8,7	10,2	5,7	3,6	4,6
· Combinados / Cubatas	70,7	75,3	73,1	14,3	14	14,2
· Licores de Frutas	24,9	26	25,5	8,7	9	8,9
· Licores Fuertes	42,4	34,1	38	10,8	7,1	8,8

Considerando el consumo distribuido en los días de semana, en la tabla 3.2.14 observamos que el consumo en los días de fin de semana se dispara muy por encima del consumo en días laborables.

TABLA 3.2.14 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALCOHOL ALGÚN FIN DE SEMANA O ALGÚN DÍA LABORABLE	
Consumidores en los últimos 30 días	
Baleares 2010	
Fin de Semana	66,6
Días Laborables	25

La continuidad en el consumo de alcohol, reflejada en la tabla 3.2.15, es ligeramente superior para las mujeres, y aumenta conforme lo hace la edad. Se observa que es, asimismo, mayor entre el alumnado de centros públicos, y el mayor porcentaje de continuidad se encuentra entre quienes cursan estudios de Bachillerato.

En términos generales, un 85,8% del alumnado balear de entre 14 y 18 años que consumió alcohol alguna vez en su vida, lo ha seguido haciendo en los últimos 12 meses, el 71,5% de quienes bebieron alcohol en los últimos 12 meses lo ha hecho también en los últimos 30 días, y un 71,4% que reconoció haber consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida continuó haciéndolo durante el último mes.

TABLA 3.2.15 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE ALCOHOL			
	VIDA / 12 MESES	12MESES / 30 DÍAS	VIDA / 30 DÍAS
Total	85,8	71,5	71,4
Sexo			
Hombres	85,6	70,7	70,6
Mujeres	86	72,2	72,2
Edad			
14 años	71,6	57,3	57,3
15 años	83,2	68,1	68,1
16 años	89	75	74,9
17 años	92,1	77	77
18 años	89,3	78	78
Titularidad			
Público	86,9	71,7	71,6
Privado	83,6	70,9	70,9
Tipo de Enseñanza			
ESO	81,6	66,7	66,6
Bachillerato	91,3	78,9	78,9
Ciclos Formativos G.M.	88,8	68,8	68,8
Ciclos Formativos G.S.	-	-	-

Por otro lado, el consumo de alcohol en el hogar es más común entre los padres que entre las madres. En este sentido, un 44,1% de las madres no ha bebido nunca, frente al 27,3% de los padres, y entre éstos, lo más común es el consumo aislado (33,7%). Estos datos se muestran en la tabla 3.2.16.

TABLA 3.2.16	CONSUMO DE ALCOHOL EN EL HOGAR	
	PADRE	MADRE
No ha bebido nunca	27,3	44,1
Ha bebido algún día aislado	33,7	34
Ha bebido sólo los fines de semana	14,2	9,1
Ha bebido casi todos los días moderadamente	14,3	6,6
Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días	0,8	0,2
No lo sé	9,7	6,1

3.3. CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son analizadas en la Encuesta ESTUDES son: tranquilizantes, cannabis, cocaína (considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, éxtasis, speed/ anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles.

El 46,7% de las y los estudiantes baleares de entre 14 y 18 años admitieron haber consumido alguna vez en su vida una o más de las sustancias antes mencionadas, incluidas en el grupo de drogas ilegales. Analizando los resultados según el sexo de las personas entrevistadas, observamos que la prevalencia del consumo de sustancias ilegales es superior en las mujeres. Además, aumenta conforme lo hace la edad, y alcanza un 60,8% entre el alumnado de 18 años.

Resulta interesante destacar que un 58% de jóvenes que cursan Ciclos Formativos de Grado Medio ha reconocido haber consumido drogas ilegales alguna vez en su vida, siendo éste el tipo de enseñanza en el que la prevalencia de consumo es mayor.

TABLA 3.3.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ALGUNA VEZ EN LA VIDA
Total		46,7
Sexo		
Hombre		46,1
Mujer		47,2
Edad		
14 años		32,2
15 años		40,2
16 años		49,5
17 años		59,3
18 años		60,8
Titularidad		
Pública		48,3
Privada		43,5
Tipo de Enseñanza		
ESO		41,4
Bachillerato		53,4
CFGM		58
CFGS		-

De la misma manera, un 36,5% de las y los estudiantes baleares de entre 14 y 18 años admitieron haber consumido una o más de las drogas antes mencionadas alguna vez en los últimos 12 meses. En este período, el consumo de los hombres es ligeramente superior al de las mujeres, y la mayor prevalencia corresponde al alumnado de 17 años.

En relación al tipo de enseñanza, son en esta ocasión las y los estudiantes de Bachillerato quienes presentan una mayor prevalencia de consumo.

TABLA 3.3.2		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ÚLTIMOS 12 MESES
Total		36,5
Sexo		
Hombre		36,7
Mujer		36,4
Edad		
14 años		23,8
15 años		31
16 años		41,5
17 años		45
18 años		44,9
Titularidad		
Pública		37,1
Privada		35,5
Tipo de Enseñanza		
ESO		31,6
Bachillerato		43,6
CFGM		43,1
CFGS		-

Finalmente, un 24,3% de jóvenes baleares con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años admitieron haber consumido, alguna vez en el último mes, una o más de las drogas antes mencionadas. Para este período temporal, las diferencias entre hombres y mujeres se agrandan, y los 17 años se mantienen como la edad de mayor prevalencia del consumo. En cuanto al tipo de enseñanza, el máximo valor vuelve a encontrarse en los Ciclos Formativos de Grado Medio, tal y como ocurría para el período “alguna vez en vida”.

TABLA 3.3.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
ÚLTIMOS 30 DÍAS		
Total		24,3
Sexo		
Hombre		25,9
Mujer		22,8
Edad		
14 años		16,5
15 años		20,2
16 años		28,7
17 años		29,4
18 años		26,1
Titularidad		
Pública		25
Privada		22,8
Tipo de Enseñanza		
ESO		21,7
Bachillerato		27,7
CFGM		29,3
CFGS		-

3.4. TRANQUILIZANTES

El 11,2% del alumnado de Baleares entre 14 y 18 años ha tomado tranquilizantes sin prescripción médica alguna vez en su vida, un consumo que es más habitual en las mujeres y que aumenta a medida que lo hace la edad.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD	
Tabla 3.4.1.	
Alguna vez	
Baleares 2010	
Total	11,2
Sexo	
Hombre	8,8
Mujer	13,3
Edad	
14 años	11,2
15 años	9,1
16 años	11,9
17 años	12,9
18 años	12,5

En los últimos 12 meses, consumieron tranquilizantes sin prescripción médica un 6,3% de las y los estudiantes baleares encuestados. Los comportamientos en función del sexo se repiten en este período, y en cuanto a la edad, el consumo disminuye entre los 14 y los 15 años, y entre los 17 y los 18.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD	
Tabla 3.4.2.	
Últimos 12 meses	
Baleares 2010	
Total	6,3
Sexo	
Hombre	5
Mujer	7,4
Edad	
14 años	5,8
15 años	5,1
16 años	7,6
17 años	7,2
18 años	3,4

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de tranquilizantes sin receta se establece en el

3%. Las mujeres siguen consumiendo tranquilizantes sin receta en mayor medida que los hombres, y las prevalencias aumentan con la edad, excepto en el paso de los 17 a los 18 años.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Baleares 2010	
Total	3
Sexo	
Hombre	2,7
Mujer	3,3
Edad	
14 años	3,3
15 años	3,2
16 años	3,3
17 años	2,8
18 años	1,1

Las tablas que siguen a continuación presentan las prevalencias del consumo de tranquilizantes, con y sin receta, según la isla:

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SEGÚN ISLA	
TABLA 3.4.3.1	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	18,5
Isla	
Mallorca	17,8
Menorca	17,3
Eivissa	19,5
Formentera	21,8
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	10,3
Isla	
Mallorca	10,1
Menorca	11,3
Eivissa	9,7
Formentera	11,3
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	5,2
Isla	
Mallorca	4,8
Menorca	6,4
Eivissa	4,7
Formentera	6,8

TABLA 3.4.3.2 PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN ISLA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	11,2
Isla	
Mallorca	10,4
Menorca	8,7
Eivissa	12,9
Formentera	15
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	6,3
Isla	
Mallorca	6
Menorca	6
Eivissa	6,3
Formentera	9
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	2,9
Isla	
Mallorca	3
Menorca	1,9
Eivissa	2,9
Formentera	6

El consumo de tranquilizantes con o sin receta tiene un comportamiento similar al consumo de tranquilizantes sin receta, mostrando mayor prevalencia de consumo las mujeres, y aumentando con la edad, salvo en el paso de los 17 a los 18 años para los últimos 12 meses y para los últimos 30 días.

TABLA 3.4.4 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON Y SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN
Total	20,1	11,2	10,9	6,3	5,6	3
Sexo						
· Hombres	17,6	8,8	9	5	5,2	2,7
· Mujeres	22,5	13,3	12,7	7,4	6	3,3
Edad						
· 14 años	17,5	11,2	9,1	5,8	4,9	3,3
· 15 años	18,6	9,1	9,9	5,1	5,7	3,2
· 16 años	19,9	11,9	12,1	7,6	6,1	3,3
· 17 años	23,1	12,9	12,9	7,2	5,9	2,8
· 18 años	25,6	12,5	9,1	3,4	4	1,1

En las tablas 3.4.5.1 y 3.4.5.2 podemos observar la prevalencia en el consumo de tranquilizantes con o sin receta en el primer caso y sin receta en el segundo, por sexo y edad simultáneamente. A la vista de los datos, podemos afirmar que las mujeres tienen, en general, mayor prevalencia de consumo, salvo en edades y períodos temporales concretos.

TABLA 3.4.5.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON O SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	17,6	17,2	17,5	16,7	21,9	17,5	19,7	22,5	29,1	29,3
Consumo últimos 12 meses	9,5	8,9	9,6	8,1	8,1	8,9	10,6	14,6	17,3	9,9
Consumo últimos 30 días	4,9	5,5	6,1	4,1	4,5	5	5,9	6,2	7,6	3,5

TABLA 3.4.5.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES SIN RECETA MÉDICA SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	11,7	7,9	9,6	7	9,1	10,8	10,1	14,1	18,4	16,1
Consumo últimos 12 meses	7	3,8	6,2	3,8	3,6	5	6,3	9	10,3	3,5
Consumo últimos 30 días	3,6	3	3,2	1,4	1	2,9	3,4	3,4	3,9	1,2

En cuanto a la titularidad del centro, la prevalencia de consumo de tranquilizantes con o sin receta es ligeramente superior entre el alumnado de centros públicos. Por tipo de enseñanza, quienes cursan Bachillerato presentan las mayores prevalencias en los tres indicadores, excepto para el consumo de tranquilizantes sin receta en los últimos 30 días, cuando son superados por las y los estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio.

TABLA 3.4.6 PREVALENCIAS DE TRANQUILIZANTES CON Y SIN RECETA MÉDICA SEGÚN TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA

	ALGUNA VEZ		ÚLTIMOS 12 MESES		ÚLTIMOS 30 DÍAS	
	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN
Total	20,1	11,2	10,9	6,3	5,6	3
Titularidad						
· Pública	20,7	11,6	10,7	6,4	5,9	3,1
· Privada	19,2	10,4	11,5	6	5,1	2,7
Tipo de Enseñanza						
· E.S.O.	19,5	10,7	10	5,9	5,6	3,3
· Bachillerato	21,1	12,5	12,8	7,1	5,7	2,5
· Ciclo Formativo GM	20,4	8,8	8,8	5	5	2,8
· Ciclo Formativo GS	-	-	-	-	-	-

Respecto a la continuidad del consumo de tranquilizantes sin receta médica, el 14,7% de quienes los consumieron alguna vez en la vida continuaron haciéndolo en los últimos 30 días, más en el caso de los hombres.

TABLA 3.4.7 CONTINUIDAD EN EL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES CON Y SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA SEGÚN SEXO

	VIDA / 12 MESES		12 MESES / 30 DÍAS		VIDA / 30 DÍAS	
	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN	CON / SIN	SIN
Total	57,1	32,2	29	14,7	29	14,7
Sexo						
Hombre	54,4	29,1	31,1	15	31,1	15
Mujer	58,9	34,3	27,5	14,4	27,5	14,4

Finalmente, la edad media de inicio al consumo de tranquilizantes es de 13,9 años, (14,21 en el caso de tranquilizantes sin receta). La tabla 3.4.8. nos ofrece estos resultados e indica, asimismo, que los chicos se inician antes en el consumo que las chicas.

TABLA 3.4.8	EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE TRANQUILIZANTES	
	CON	SIN
Total	13,9	14,21
Sexo		
Hombres	13,41	13,71
Mujeres	14,16	14,48

3.5.CANNABIS

El 36,1% del alumnado de las Islas Baleares ha consumido cannabis alguna vez en el vida, un consumo que aumenta entre los 14 y los 17 años, edad en la que el 50,3% de estudiantes baleares reconoce haber consumido cannabis alguna vez. Por sexos, la prevalencia del consumo en los hombres es mayor que en las mujeres.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.5.1	
Alguna vez	
Baleares 2010	
Total	36,1
Sexo	
Hombre	36,8
Mujer	35,4
Edad	
14 años	19,6
15 años	28,3
16 años	40,5
17 años	50,3
18 años	48,9

En los últimos 12 meses, consumió cannabis un 29,8% del alumnado balear encuestado, y un 19,7% lo hizo en los últimos 30 días. Para ambos indicadores, los valores son superiores a los observados para el total de jóvenes españoles. Los comportamientos en función del sexo y la edad se repiten.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.5.2	
Últimos 12 meses	
Baleares 2010	
Total	29,8
Sexo	
Hombre	30,8
Mujer	28,8
Edad	
14 años	16,8
15 años	23,7
16 años	33,8
17 años	40
18 años	39,8

TABLA 3.5.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Baleares 2010	
Total	19,7
Sexo	
Hombre	21,8
Mujer	17,8
Edad	
14 años	11,9
15 años	15,1
16 años	23,6
17 años	25,4
18 años	25

Por islas, el consumo de cannabis es superior en Formentera que en el resto, llegando a duplicar el consumo de esta sustancia en Mallorca en los últimos 30 días. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

TABLA PREVALENCIA DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN ISLA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	36,1
Isla	
Mallorca	30,9
Menorca	38,2
Eivissa	38
Formentera	51,9
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	29,8
Isla	
Mallorca	24,7
Menorca	30,3
Eivissa	32,8
Formentera	43,6
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	19,7
Isla	
Mallorca	15,9
Menorca	18,8
Eivissa	22,4
Formentera	31,6

En la tabla 3.5.4 aparece reflejada la distribución del porcentaje de jóvenes fumadores de cannabis durante los 30 últimos días en función de si ha fumado tabaco o no en ese mismo período de tiempo.

		CANNABIS	
		Consume	No consume
TABACO	Consume	57,7	42,3
	No consume	7,6	92,4

El contraste χ^2 es significativo, y el coeficiente de contingencia llega a 0,47, lo que supone asociación entre las dos variables. De ello se deduce que el consumo de tabaco lleva emparejado el consumo de cannabis, pues un 57,7% de las y los jóvenes baleares encuestados consumió ambas sustancias simultáneamente en los últimos 30 días.

TABLA 3.5.5 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	22,9	31,2	43,7	41,3	47,2	17	25,8	37,4	58,6	50,6
Consumo últimos 12 meses	18	26,3	38	33,8	37,2	15,8	21,6	29,5	45,9	43,2
Consumo últimos 30 días	11,3	17,8	28,6	22,5	28,3	12,4	12,6	18,7	28,1	21,1

El consumo de cannabis es superior en los hombres que en las mujeres entre los 14 y los 16 años, mientras que a los 17 y los 18 la tasa de consumidoras supera a la de consumidores. Se observa además que a medida que aumenta la edad también lo hace el consumo de cannabis, pero en el caso de las mujeres sólo hasta los 17 años.

Las tablas 3.5.6.1, 3.5.6.2 y 3.5.6.3 muestran las frecuencias de consumo de cannabis según el sexo y la edad para los tres periodos de tiempo estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días respectivamente.

TABLA 3.5.6.1 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE CANNABIS ALGUNA VEZ EN LA VIDA SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	63,2	5	2,4	3,2	3,9	3,6	4,1	3,1	11,4
Sexo									
· Hombres	62,4	4,7	2,4	2,9	3,6	4	3,4	3,6	13
· Mujeres	64	5,3	2,5	3,4	4,2	3,3	4,7	2,6	10
Edad									
· 14 años	80,2	3,3	2,4	1,7	1,7	1,7	1,9	2,4	5
· 15 años	71	6	1,4	2,7	3,7	3,9	1,7	2,1	7,6
· 16 años	58,7	3,9	3,9	3,5	3,9	3,2	6	3,7	13,4
· 17 años	49	6,4	2,8	4,3	5,8	6	5,6	4,5	15,7
· 18 años	50,3	5,8	0,6	3,5	5,2	2,9	6,9	1,7	23,1

TABLA 3.5.6.2 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE CANNABIS LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	69,5	4,4	3,5	3	3,6	3	3,3	3,2	6,7
Sexo									
· Hombres	68,2	3,8	3	2,7	4,2	2,9	3,7	3,1	8,3
· Mujeres	70,5	4,9	3,9	3,2	3,1	3	2,9	3,4	5,2
Edad									
· 14 años	83	2,8	2,4	1,4	1,7	0,9	1,9	2,4	3,5
· 15 años	75,4	5,3	2,1	2,7	2,4	2,8	2,4	2,3	4,5
· 16 años	65,2	3,6	4,1	3,5	4,6	2,3	6,2	3,5	7,1
· 17 años	59,1	5,1	4,6	4,2	5,1	5,9	2,1	5,7	8,2
· 18 años	59,1	5,3	6,4	2,3	4,7	2,3	1,8	0,6	17,5

TABLA 3.5.6.3 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE CANNABIS LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD								
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	79,7	5,4	3,1	2,3	1,9	2,2	1,9	3,5
Sexo								
· Hombres	77,5	5,2	3,4	2,5	2,1	2,1	2,8	4,3
· Mujeres	81,8	5,5	2,9	2,2	1,6	2,2	1	2,8
Edad								
· 14 años	87,7	4	1,7	0,9	1,2	1,9	0,9	1,7
· 15 años	84,3	4	2,7	2,3	1,6	1,9	1,4	1,7
· 16 años	75,5	5,9	3,8	2,7	3,4	3,1	2,1	3,6
· 17 años	73,9	9,1	3,4	2,7	1,1	1,5	2,7	5,7
· 18 años	75	1,7	5,2	3,5	0,6	1,7	2,9	9,3

A la vista de los datos, podemos concluir que los mayores consumidores de cannabis en Baleares son los hombres: un 16,6% han consumido dicha sustancia más de 20 días en su vida (frente al 12,6% de las mujeres), un 11,4% en los últimos 12 meses (frente al 8,6% de las mujeres), y un 4,3% en los últimos 30 días (frente al 2,8% de las mujeres).

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa en los 14,68 años, y es ligeramente más temprana en los hombres que en las mujeres.

TABLA 3.5.7		EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE CANNABIS
Total		14,68
Sexo		
Hombres		14,55
Mujeres		14,8

3.6.COCAÍNA

El consumo de cocaína alguna vez en la vida entre las y los jóvenes de entre 14 y 18 años de Baleares se sitúa en un 3,4%. Las mujeres reconocen consumir cocaína en mayor medida que los hombres, aunque las diferencias entre unas y otros son mínimas. El análisis por edades refleja un incremento en las tasas de consumo entre los 15 y los 16 años y entre los 17 y los 18, edad esta en la que encontramos la mayor prevalencia del consumo de esta sustancia.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.6.1.	
	Alguna vez
	Baleares 2010
Total	3,4
Sexo	
Hombre	3,2
Mujer	3,6
Edad	
14 años	3,5
15 años	2
16 años	4,2
17 años	3,9
18 años	4,5

Si nos centramos en los últimos 12 meses, un 2,2% dice haber consumido cocaína en este período, y si analizamos el consumo en los últimos 30 días, el porcentaje es de 1,1%. Tal y como sucedía con el consumo alguna vez en la vida, la prevalencia es mayor en las mujeres para los últimos 12 meses, pero la situación se invierte si nos referimos a los últimos 30 días. Si atendemos a la edad, las mayores prevalencias en estos períodos corresponden al alumnado de 16 años.

TABLA 3.6.2. PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD

Últimos 12 meses	
Balears 2010	
Total	2,2
Sexo	
Hombre	2
Mujer	2,4
Edad	
14 años	2,6
15 años	1,2
16 años	2,7
17 años	2,4
18 años	2,3

TABLA 3.6.3. PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD

Últimos 30 días	
Balears 2010	
Total	1,1
Sexo	
Hombre	1,2
Mujer	1,1
Edad	
14 años	1,4
15 años	1
16 años	1,6
17 años	0,7
18 años	0,6

Formentera destaca de nuevo como la isla en la que la prevalencia del consumo de cocaína es mayor, tanto base como cocaína en polvo, y tal y como se muestra en las siguientes tablas:

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE COCAÍNA BASE SEGÚN ISLA	
TABLA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	2,1
Isla	
Mallorca	0,8
Menorca	3,2
Eivissa	2,3
Formentera	6
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	1,4
Isla	
Mallorca	0,4
Menorca	2,3
Eivissa	1,5
Formentera	3,8
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,8
Isla	
Mallorca	0,3
Menorca	1,5
Eivissa	0,8
Formentera	2,3

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO SEGÚN ISLA	
TABLA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	2,7
Isla	
Mallorca	1,6
Menorca	4,1
Eivissa	2,4
Formentera	7,5
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	1,7
Isla	
Mallorca	1
Menorca	3
Eivissa	1,5
Formentera	3,8
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,8
Isla	
Mallorca	0,3
Menorca	1,3
Eivissa	0,9
Formentera	2,3

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE COCAÍNA (BASE/POLVO) SEGÚN ISLA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	3,5
Isla	
Mallorca	1,7
Menorca	5,3
Eivissa	3,4
Formentera	9
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	2,2
Isla	
Mallorca	1
Menorca	3,6
Eivissa	2,3
Formentera	5,3
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	1,1
Isla	
Mallorca	0,4
Menorca	1,9
Eivissa	1
Formentera	3,8

La tabla 3.6.4.1 refleja los resultados obtenidos en cuanto a prevalencia del consumo de cocaína base por sexo y edad, mientras que la tabla 3.6.4.2 presenta los datos para la cocaína en polvo.

A la vista de ambas tablas se concluye que el consumo de cocaína en polvo es superior al de cocaína base alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, e igual en los últimos 30 días. Además, dicho consumo es más frecuente en las mujeres y, en el caso de la base, aumenta únicamente en el paso de los 15 a los 16 años.

TABLA 3.6.4.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE BASE SEGÚN SEXO Y EDAD			
	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
	Baleares 2010	Baleares 2010	Baleares 2010
Total	2,1	1,4	0,8
Sexo			
· Hombres	1,8	1,1	0,7
· Mujeres	2,4	1,6	0,9
Edad			
· 14 años	3	2,6	1,2
· 15 años	1,6	1	0,7
· 16 años	2,7	1,6	0,9
· 17 años	1,7	1,1	0,6
· 18 años	1,1	0,6	0,6

TABLA 3.6.4.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO SEGÚN SEXO Y EDAD			
	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
	Baleares 2010	Baleares 2010	Baleares 2010
Total	2,7	1,8	0,8
Sexo			
· Hombres	2,5	1,7	0,8
· Mujeres	2,9	1,8	0,8
Edad			
· 14 años	2,8	2,3	1,4
· 15 años	1,6	0,7	0,5
· 16 años	2,7	2	1,2
· 17 años	3,7	2,2	0,6
· 18 años	4	2,3	0,8

Es interesante el análisis de la tabla 3.6.5, en el que se presenta la prevalencia en el consumo de esta sustancia tanto para su consumo en polvo como en base por sexo y edad conjuntamente.

TABLA 3.6.5 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE BASE Y COCAÍNA EN POLVO SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

	BASE									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	3,3	1,2	3,2	0,4	0	3	2	2,2	2,7	2,3
Consumo últimos 12 meses	3,3	0,5	1,5	0	0	1,8	1,3	1,7	2	1,2
Consumo últimos 30 días	1,3	0,5	1,3	0	0	1	1	0,6	1,2	1,2

	COCAÍNA EN POLVO									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	2,8	1,2	3,9	1,8	3,5	3	1,9	1,6	5,5	5,1
Consumo últimos 12 meses	2,8	0,7	2,8	0,7	1	2,1	0,8	1,1	3,8	3,9
Consumo últimos 30 días	1,3	0,3	1,8	0,4	0	1,3	0,7	0,6	0,9	1,2

Salvo algunas excepciones, en general, tal y como se concluyó ya anteriormente, se observa que el consumo de cocaína en polvo es mayor que el consumo de cocaína base, tanto para hombres como para mujeres, excepto entre los chicos más jóvenes (14 años). Además, las prevalencias del consumo son mayores en las mujeres, salvo entre el alumnado de 14 años en el caso de la base y el de 16 en el caso de la cocaína en polvo. Se observa asimismo que, a medida que aumenta la edad, también aumenta la diferencia entre el consumo de ambos tipos de cocaína. En el caso de la cocaína en polvo, el mayor incremento en su consumo se encuentra en el paso de los 15 a los 16 años para los hombres, y de los 16 a los 17 para las mujeres.

Las tablas que siguen a continuación muestran las frecuencias en el consumo de cocaína base, para alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días. Para todos los indicadores, encontramos que la mayoría de quienes han dicho haber consumido base lo han hecho un único día. El consumo es más frecuente en las mujeres y, en general, disminuye con la edad.

TABLA 3.6.6.1 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA BASE ALGUNA VEZ EN LA VIDA SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	97,8	1	0,3	0,2	0,1	0	0,2	0,1	0,3
Sexo									
· Hombres	98,1	0,9	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
· Mujeres	97,5	1	0,4	0,1	0,1	0	0,4	0,1	0,3
Edad									
· 14 años	96,7	1,4	0,5	0	0,2	0	0,2	0	0,9
· 15 años	98,2	0,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,1
· 16 años	97,3	1,3	0,5	0,3	0	0	0,3	0,1	0,1
· 17 años	98,5	0,4	0	0,2	0	0	0,4	0	0,6
· 18 años	98,9	1,1	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 3.6.6.2 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA BASE LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	98,6	0,6	0,2	0,1	0	0,1	0	0,2	0,3
Sexo									
· Hombres	98,8	0,5	0,1	0	0,1	0,1	0	0,2	0,2
· Mujeres	98,3	0,7	0,2	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0,4
Edad									
· 14 años	97,4	0,9	0,2	0	0,2	0	0,2	0,2	0,7
· 15 años	99	0,5	0	0	0	0,3	0	0,1	0,1
· 16 años	98,4	0,9	0,4	0	0	0	0	0,3	0
· 17 años	99,1	0	0	0,4	0	0	0	0	0,6
· 18 años	99,4	0,6	0	0	0	0	0	0	0

TABLA 3.6.6.3 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA BASE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,2	0,4	0	0	0	0	0	0,3
Sexo								
· Hombres	99,3	0,4	0	0	0,1	0,1	0	0,2
· Mujeres	99,1	0,3	0,1	0	0	0	0,1	0,4
Edad								
· 14 años	98,8	0,2	0	0	0,2	0	0,2	0,5
· 15 años	99,2	0,4	0,1	0	0	0	0	0,3
· 16 años	99,1	0,7	0	0	0	0,1	0	0,1
· 17 años	99,4	0	0	0	0	0	0,2	0,4
· 18 años	99,4	0,6	0	0	0	0	0	0

En cuanto a la cocaína en polvo, la frecuencia más habitual de consumo de esta sustancia es también un único día en cualquiera de los tres períodos temporales estudiados. El análisis por sexo y edad revela un consumo más frecuente en las mujeres que, en general, aumenta conforme lo hace la edad. Los resultados se muestran en las tablas que siguen:

TABLA 3.6.6.4 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO ALGUNA VEZ EN LA VIDA SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	97,2	1,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0	0,5
Sexo									
· Hombres	97,3	1,6	0,2	0,2	0,1	0,2	0	0	0,5
· Mujeres	97,1	1,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4
Edad									
· 14 años	96,9	1,6	0	0	0,2	0	0,3	0	0,9
· 15 años	98,2	1,2	0,1	0,3	0	0	0	0,1	0,1
· 16 años	97,2	1,3	0,3	0,1	0,1	0,3	0	0	0,7
· 17 años	96,4	1,9	0,2	0,2	0,4	0,6	0,4	0	0
· 18 años	96	1,7	0,6	0,6	0	0	0	0	1,2

TABLA 3.6.6.5 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO Y EDAD									
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20-39 días	40 días o más
Total	98,2	0,8	0,4	0	0,1	0,2	0	0,1	0,2
Sexo									
· Hombres	98,2	0,9	0,2	0	0,1	0,2	0	0,2	0,2
· Mujeres	98,1	0,7	0,6	0	0,1	0,2	0,1	0	0,3
Edad									
· 14 años	97,4	1,2	0	0	0,2	0,2	0,2	0	0,7
· 15 años	99,1	0,5	0,1	0	0	0,1	0	0	0,1
· 16 años	98	0,8	0,5	0	0,1	0,1	0	0,4	0
· 17 años	97,7	0,8	1,1	0	0	0,4	0	0	0
· 18 años	97,7	1,2	0	0	0	0	0	0	1,2

TABLA 3.6.6.6 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE COCAÍNA EN POLVO LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD

	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,1	0,4	0,1	0	0,2	0,1	0	0,2
Sexo								
· Hombres	99,1	0,3	0,2	0	0,3	0	0	0,2
· Mujeres	99,1	0,5	0	0	0	0,1	0,1	0,1
Edad								
· 14 años	98,6	0,7	0	0	0,2	0	0,2	0,2
· 15 años	99,5	0,4	0	0	0	0	0	0,1
· 16 años	98,8	0,4	0,3	0	0,4	0	0	0,1
· 17 años	99,4	0,2	0	0	0	0,4	0	0
· 18 años	99,4	0,6	0	0	0	0	0	0

La edad de inicio al consumo de cocaína es de 14,6 años; considerando la diferenciación entre cocaína base y cocaína en polvo, la edad de inicio al consumo de la primera variedad es de 14,3 años, y de 15,21 años para la segunda. En cualquier caso, los chicos se inician en el consumo de estas sustancias antes que las chicas.

TABLA 3.6.7 EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE COCAINA

	BASE	POLVO	BASE/POLVO
Total	14,3	15,21	14,6
Sexo			
Hombres	13,71	14,96	14,08
Mujeres	14,62	15,41	15,02

3.7.HEROÍNA

La prevalencia del consumo de heroína en Baleares oscila entre el 1% para el consumo alguna vez en la vida, y el 0,5% para el consumo en los últimos 30 días. Por sexos, el consumo es superior en los varones alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses, y se iguala con el de las mujeres en los últimos 30 días. Con respecto a la edad, encontramos las mayores prevalencias del consumo de heroína en los 14 años.

TABLA 3.7.1		PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
		Alguna vez	
		Baleares 2010	
Total		1	
Sexo			
Hombre		1,1	
Mujer		0,8	
Edad			
14 años		1,9	
15 años		1	
16 años		0,8	
17 años		0,7	
18 años		0	

TABLA 3.7.2		PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
		Últimos 12 meses	
		Baleares 2010	
Total		0,7	
Sexo			
Hombre		0,8	
Mujer		0,5	
Edad			
14 años		1,6	
15 años		0,5	
16 años		0,4	
17 años		0,6	
18 años		0	

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Baleares 2010	
Total	0,5
Sexo	
Hombre	0,5
Mujer	0,5
Edad	
14 años	1,2
15 años	0,4
16 años	0,4
17 años	0,6
18 años	0

Si atendemos al consumo de heroína por islas, encontramos que Menorca presenta menores prevalencias que el resto para todos los períodos estudiados:

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE HEROÍNA SEGÚN ISLA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	1
Isla	
Mallorca	0,7
Menorca	1,3
Eivissa	1
Formentera	1,5
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,6
Isla	
Mallorca	0,3
Menorca	0,6
Eivissa	0,6
Formentera	1,5
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,5
Isla	
Mallorca	0,3
Menorca	0,6
Eivissa	0,6
Formentera	0,8

La edad media de inicio al consumo de heroína se sitúa en los 13,98 años, con diferencias considerables entre hombres y mujeres, iniciándose ellas más tarde en el consumo de esta sustancia.

TABLA 3.7.4		EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE HEROÍNA
Total		13,98
Sexo		
Hombres		12,83
Mujeres		15,53

3.8. SPEED / ANFETAMINAS

Un 1,7% del alumnado balear de entre 14 y 18 años ha consumido alguna vez speed o anfetaminas, un consumo que es más común entre las chicas y que aumenta entre los 16 y los 18 años.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SPEED Y ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD	
Alguna vez	
Balears 2010	
Total	1,7
Sexo	
Hombre	1,6
Mujer	2
Edad	
14 años	2,1
15 años	1,2
16 años	1,2
17 años	2,2
18 años	4

La prevalencia del consumo en los últimos 12 meses se sitúa en un 1%, sin diferencias por razón de sexos en este período. En cuanto a la edad, el consumo de speed y anfetaminas aumenta únicamente en el paso de los 16 a los 17 años. Los datos se muestran en la tabla siguiente:

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SPEED Y ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 12 meses	
Balears 2010	
Total	1
Sexo	
Hombre	1
Mujer	1
Edad	
14 años	1,6
15 años	0,6
16 años	0,7
17 años	1,7
18 años	1,1

En los últimos 30 días un 0,6% del alumnado balear consumió speed / anfetaminas. Por sexos, de nuevo la tasa de consumidores supera a la de consumidoras, tal y como ocurría con el consumo alguna vez en la vida, y por edad encontramos el único incremento en el paso de los 16 a los 17 años.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SPEED Y ANFETAMINAS SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Baleares 2010	
Total	0,6
Sexo	
Hombre	0,8
Mujer	0,5
Edad	
14 años	1,2
15 años	0,4
16 años	0,5
17 años	0,9
18 años	0

La siguiente tabla presenta los resultados por islas:

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SPEED/ANFETAMINAS SEGÚN ISLA	
TABLA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	1,8
Isla	
Mallorca	0,9
Menorca	2,6
Eivissa	1,9
Formentera	4,5
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	1
Isla	
Mallorca	0,3
Menorca	1,7
Eivissa	1
Formentera	2,3
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,6
Isla	
Mallorca	0,3
Menorca	0,4
Eivissa	0,9
Formentera	1,5

La edad media de inicio al consumo de speed y anfetaminas se sitúa en los 14,89 años. Los chicos se inician a su consumo ligeramente antes que las chicas.

EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE SPEED Y ANFETAMINAS	
TABLA 3.8.4	
Total	14,89
Sexo	
Hombres	14,29
Mujeres	15,28

La tabla siguiente muestra las frecuencias en el consumo de speed / anfetaminas, en los últimos 30 días. La mayoría de quienes han dicho haber consumido estas sustancias alguna vez en este período lo han hecho con una frecuencia superior a 20 días. El consumo es más frecuente en los hombres y entre el alumnado de 14 años de edad.

TABLA 3.8.5 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE SPEED/ANFETAMINAS LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD								
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,4	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,3
Sexo								
· Hombres	99,2	0,2	0,2	0,0	0,0	0,1	0,0	0,4
· Mujeres	99,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,2
Edad								
· 14 años	98,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5
· 15 años	99,6	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
· 16 años	99,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1
· 17 años	99,1	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
· 18 años	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.9. ALUCINÓGENOS

Un 4,1% de las y los estudiantes baleares consumió alucinógenos alguna vez en la vida, un 2,6% lo hizo en los últimos 12 meses y un 1,3% en los últimos 30 días. También para esta sustancia se observan diferencias significativas en función del sexo, siendo superior la prevalencia del consumo entre los hombres. La edad resulta asimismo explicativa, puesto que el consumo aumenta proporcionalmente a ella, salvo en el paso de los 14 a los 15 años alguna vez en la vida y en los últimos 12 meses.

En relación a los últimos 30 días, encontramos el único incremento positivo en el paso de los 15 a los 16 años.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.9.1	
Alguna vez	
Baleares 2010	
Total	4,1
Sexo	
Hombre	4,5
Mujer	3,6
Edad	
14 años	3,5
15 años	1,7
16 años	4,2
17 años	5,4
18 años	11,4

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.9.2	
Últimos 12 meses	
Baleares 2010	
Total	2,6
Sexo	
Hombre	2,9
Mujer	2,3
Edad	
14 años	2,3
15 años	1,2
16 años	3,1
17 años	3,3
18 años	5,1

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN SEXO Y EDAD	
Últimos 30 días	
Balears 2010	
Total	1,3
Sexo	
Hombre	1
Mujer	1,5
Edad	
14 años	1,4
15 años	0,6
16 años	1,7
17 años	1,5
18 años	1,1

Un 6,8% de jóvenes de Formentera consumió alucinógenos alguna vez, justamente el doble que la juventud mallorquina (3,4%).

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS SEGÚN ISLA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	4
Isla	
Mallorca	3,4
Menorca	5,3
Eivissa	3,5
Formentera	6,8
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	2,6
Isla	
Mallorca	1,8
Menorca	3,8
Eivissa	2,8
Formentera	2,3
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	1,3
Isla	
Mallorca	0,9
Menorca	1,7
Eivissa	1,4
Formentera	1,5

La edad media de inicio al consumo de alucinógenos se muestra en la siguiente tabla (3.9.4.) y se sitúa en los 15,54 años, sin que existan para estas sustancias diferencias significativas por razón de sexo.

TABLA 3.9.4 EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS	
Total	15,54
Sexo	
Hombres	15,55
Mujeres	15,54

La tabla siguiente muestra las frecuencias en el consumo de alucinógenos, en los últimos 30 días. La mayoría de quienes han dicho haber consumido estas sustancias lo han hecho un único día (0,7%) en el último mes, y un 0,3% reconoció haber consumido alucinógenos 20 días o más en este período.

TABLA 3.9.5 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE ALUCINÓGENOS LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD								
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	98,7	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2	0,3
Sexo								
· Hombres	99	0,4	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,4
· Mujeres	98,5	0,9	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1
Edad								
· 14 años	98,6	0,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5
· 15 años	99,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
· 16 años	98,1	1,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,0	0,3
· 17 años	98,7	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,2
· 18 años	98,9	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.10. INHALABLES VOLÁTILES

En esta edición, un 1,8% de los jóvenes de Baleares reconoció haber consumido inhalables volátiles alguna vez, un 1,1% en los últimos 12 meses y un 0,8% en los últimos 30 días, siendo las prevalencias del consumo superiores en las mujeres y en los extremos de edad (14 y 18 años).

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.10.1	
Alguna vez	
Baleares 2010	
Total	1,8
Sexo	
Hombre	1,6
Mujer	2,1
Edad	
14 años	2,8
15 años	2,2
16 años	1
17 años	0,9
18 años	3,4

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.10.2	
Últimos 12 meses	
Baleares 2010	
Total	1,1
Sexo	
Hombre	0,8
Mujer	1,4
Edad	
14 años	2,1
15 años	1,4
16 años	0,7
17 años	0,6
18 años	1,1

TABLA 3.10.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS VOLÁTILES SEGÚN SEXO Y EDAD

Últimos 30 días	
Baleares 2010	
Total	0,8
Sexo	
Hombre	0,5
Mujer	1,1
Edad	
14 años	1,9
15 años	0,9
16 años	0,4
17 años	0,6
18 años	1,1

El consumo de inhalables volátiles es muy superior en Formentera que el resto de islas baleares, independientemente del período analizado, y tal y como refleja la siguiente tabla:

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE INHALABLES VOLÁTILES SEGÚN ISLA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	1,8
Isla	
Mallorca	1
Menorca	2,6
Eivissa	2
Formentera	3,8
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	1,1
Isla	
Mallorca	0,7
Menorca	1,7
Eivissa	1,1
Formentera	2,3
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,8
Isla	
Mallorca	0,6
Menorca	0,9
Eivissa	1
Formentera	1,5

La edad media de inicio al consumo de inhalables volátiles es de 13,81 años, y el inicio es más tardío en las chicas que en los chicos.

TABLA 3.10.4 EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE INHALABLES VOLÁTILES	
Total	13,81
Sexo	
Hombres	13,45
Mujeres	14,04

La tabla siguiente muestra las frecuencias en el consumo de inhalables volátiles en los últimos 30 días. La mayoría de quienes han dicho haber consumido estas sustancias lo han hecho un día o dos. Como se ha mencionado ya, el consumo es más frecuente en las mujeres y en los extremos de edad.

TABLA 3.10.5 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE INHALABLES VOLÁTILES LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD								
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1
Sexo								
· Hombres	99,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
· Mujeres	98,8	0,4	0,2	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1
Edad								
· 14 años	98,1	0,5	0,2	0,2	0,5	0,0	0,2	0,2
· 15 años	99,2	0,1	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
· 16 años	99,6	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
· 17 años	99,4	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,0	0,0
· 18 años	98,9	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0

3.11.ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

El éxtasis y otras drogas de diseño han sido consumidas en alguna ocasión por un 2,6% del alumnado de Baleares, en los últimos 12 meses por un 1,7% y en los últimos 30 días por un 0,9%. Por sexos, las mujeres presentan mayor prevalencia de consumo que los hombres, mientras que si atendemos a la edad, el consumo de éxtasis y otras drogas de diseño aumenta proporcionalmente a la misma, excepto en el paso de los 14 a los 15 años para alguna vez en la vida y para el último año, y entre los 14 y los 15 y los 17 y los 18 para el último mes.

TABLA 3.11.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO SEGÚN SEXO Y EDAD

Alguna vez	
Baleares 2010	
Total	2,6
Sexo	
Hombre	2,2
Mujer	2,9
Edad	
14 años	3
15 años	1,4
16 años	2,3
17 años	3,1
18 años	5,7

TABLA 3.11.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO SEGÚN SEXO Y EDAD

Últimos 12 meses	
Baleares 2010	
Total	1,7
Sexo	
Hombre	1,8
Mujer	1,6
Edad	
14 años	2,3
15 años	0,7
16 años	1,6
17 años	1,9
18 años	4,5

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO SEGÚN SEXO Y EDAD	
TABLA 3.11.3	
Últimos 30 días	
Balears 2010	
Total	0,9
Sexo	
Hombre	0,8
Mujer	1,1
Edad	
14 años	1,6
15 años	0,4
16 años	0,8
17 años	1,5
18 años	0,6

El consumo de éxtasis alguna vez o en los últimos 12 meses es especialmente significativo en Formentera, mientras que si nos referimos a los últimos 30 días es Eivissa la isla en la que la prevalencia del consumo de esta sustancia es mayor.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ÉXTASIS SEGÚN ISLA	
TABLA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	2,5
Isla	
Mallorca	1,3
Menorca	2,8
Eivissa	3,2
Formentera	6
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	1,7
Isla	
Mallorca	0,8
Menorca	1,3
Eivissa	2,5
Formentera	4,5
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,9
Isla	
Mallorca	0,3
Menorca	0,4
Eivissa	1,6
Formentera	1,5

La tabla 3.11.4. muestra la edad de inicio al consumo, total y por sexos. La edad de inicio global se sitúa en 15,43 años y, como ocurre con otras sustancias analizadas, los chicos se inician al consumo antes que las chicas.

TABLA 3.11.4		EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE ÉXTASIS
Total		15,43
Sexo		
Hombres		15,12
Mujeres		15,63

La tabla siguiente muestra las frecuencias en el consumo de éxtasis en los últimos 30 días, un consumo que es más habitual entre las mujeres, y que se limita mayoritariamente a un único día en el último mes.

TABLA 3.11.5 FRECUENCIA EN EL CONSUMO DE EXTASIS LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS SEGÚN SEXO Y EDAD								
	Ningún día	1 día	2 días	3 días	4-5 días	6-9 días	10-19 días	20 días o más
Total	99,0	0,5	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,3
Sexo								
· Hombres	99,1	0,3	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,4
· Mujeres	98,9	0,7	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Edad								
· 14 años	98,6	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,7
· 15 años	99,6	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
· 16 años	99,2	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
· 17 años	98,5	0,9	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
· 18 años	99,4	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3.12.GHB

En la tabla 3.12.1 se analizan las prevalencias del consumo por sexo y por edad para el GHB. Los datos indican que el consumo de GHB alguna vez en la vida es mayor entre los hombres que entre las mujeres, se iguala en los últimos 12 meses y se invierte en los últimos 30 días. Además se aprecia una tendencia de consumo creciente según aumenta la edad entre los 16 y los 18 años, aunque la mayor prevalencia se encuentra en los 14.

TABLA 3.12.1 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE GHB SEGÚN SEXO Y EDAD			
	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
	Baleares 2010	Baleares 2010	Baleares 2010
Total	1,2	0,8	0,5
Sexo			
· Hombres	1,2	0,8	0,4
· Mujeres	1,1	0,8	0,6
Edad			
· 14 años	2,3	1,9	1,2
· 15 años	1	0,5	0,4
· 16 años	0,5	0,3	0,3
· 17 años	1,3	0,6	0,4
· 18 años	1,7	1,7	0,6

La tabla 3.12.2 presenta la prevalencia en el consumo de GHB por sexo y edad conjuntamente:

	TABLA 3.12.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE GHB SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE									
	GHB									
	HOMBRES					MUJERES				
	14	15	16	17	18	14	15	16	17	18
Consumo alguna vez	3,3	1,4	0,8	0,4	0	1,4	0,4	0,3	2	3,9
Consumo últimos 12 meses	2,8	0,2	0,5	0,4	0	1	0,4	0	0,9	3,9
Consumo últimos 30 días	1,3	0,3	0,5	0	0	1	0,6	0	0,9	1,2

Las chicas de 18 años son las mayores consumidoras de GHB en el indicador temporal de consumo alguna vez en la vida. El mayor incremento en el consumo de GHB se produce para ellas en el paso de los 17 a los 18 años en el consumo alguna vez y en los últimos 12 meses, y de los 16 a los 17 en los últimos 30 días. En el caso de los chicos, su mayor su mayor prevalencia del consumo la encontramos en los 14 años para todos los períodos temporales, y

sólo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días se observa un ligero incremento entre los 15 y los 16.

El consumo de GHB en función de la isla se presenta en la siguiente tabla:

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE GHB SEGÚN ISLA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	1,1
Isla	
Mallorca	0,7
Menorca	1,9
Eivissa	0,9
Formentera	2,3
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,7
Isla	
Mallorca	0,2
Menorca	1,1
Eivissa	0,8
Formentera	2,3
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,5
Isla	
Mallorca	0,2
Menorca	0,4
Eivissa	0,8
Formentera	1,5

La edad de inicio al consumo de GHB, para esta edición de la Encuesta ESTUDES entre las y los jóvenes baleares se sitúa en 13,86 años, y de nuevo es inferior en los hombres que en las mujeres.

EDAD MEDIA DE INICIO AL CONSUMO DE GHB	
Total	13,86
Sexo	
Hombres	12,6
Mujeres	14,86

3.13. POLICONSUMO

En las tablas 3.13.1-3.13.3 se muestran las relaciones entre los consumos de las diferentes sustancias para los tres momentos estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los últimos 30 días.

La lectura de las tablas se realiza por filas. Es decir, y a modo de ejemplo, si queremos conocer el consumo conjunto de tabaco y alcohol alguna vez en la vida, tenemos que irnos a la casilla en la que se cruzan la fila del tabaco con la columna del alcohol, y así encontramos que el 96,4% de las y los jóvenes baleares que han consumido tabaco en ese período también han consumido alcohol.

En un análisis puramente descriptivo, hemos resaltado las relaciones de consumo que superan el 50% en color oro. Las casillas de la diagonal, con el porcentaje lógico del 100%, han sido marcadas en verde.

El consumo de cualquiera de las sustancias estudiadas está asociado al de alcohol, tabaco y cannabis como sustancias principales, sustancias éstas que presentan además una relación mutua entre ellas, de manera que el consumo de cualquiera de las tres lleva aparejado en gran medida el consumo de las dos restantes.

RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS <i>ALGUNA VEZ EN LA VIDA</i>														
TABLA 3.13.1	(% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])													
	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin
Tabaco	100,0	96,4	72,5	5,6	8,7	3,7	4,0	5,3	6,5	1,8	2,9	2,2	25,1	15,7
Alcohol	54,5	100,0	49,8	3,6	5,7	2,4	3,0	3,8	4,8	1,2	2,3	1,5	20,7	12,7
Hachís	81,8	98,5	100,0	6,3	10,1	4,5	5,3	7,2	8,9	2,3	3,4	2,7	25,9	17,7
Éxtasis	87,5	100,0	87,8	100,0	64,6	52,4	43,7	56,0	58,8	27,8	28,8	34,4	55,8	50,6
Alucinógenos	85,7	100,0	89,2	40,6	100,0	33,3	26,6	35,8	39,1	16,6	18,3	18,3	47,4	33,1
Speed	84,8	100,0	91,9	75,6	76,4	100,0	55,0	57,7	63,8	39,6	38,1	41,5	57,4	53,4
Coca. Base	76,4	100,0	90,3	53,0	51,4	46,2	100,0	66,7	100,0	33,3	33,2	41,0	49,2	47,5
Coca. Polvo	78,8	100,0	96,0	52,8	53,8	37,7	51,9	100,0	100,0	23,6	25,5	33,7	43,6	38,2
Coca (B/P)	76,9	100,0	94,0	44,1	46,6	33,1	61,8	79,4	100,0	20,6	22,1	27,8	39,6	34,3
Heroína	78,3	100,0	92,0	78,5	74,4	77,3	77,4	70,6	77,4	100,0	62,6	62,7	77,4	69,6
S. Volátiles	64,6	96,2	66,0	40,2	40,7	36,8	38,3	37,7	41,1	31,0	100,0	29,0	49,4	42,2
Ghb	79,8	100,0	88,0	79,2	67,2	66,3	78	82,4	85,5	51,3	47,8	100,0	62,0	58,7
Tranq.	54,9	83,9	50,4	7,7	10,4	5,5	5,6	6,4	7,3	3,8	4,9	3,7	100,0	51,7
Tranq. Sin	56,9	86,4	57,1	11,6	12,1	8,5	9,0	9,3	10,5	5,7	6,9	5,9	85,7	100,0

RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS ÚLTIMOS 12 MESES														
TABLA 3.13.2 (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])														
	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin
Tabaco	100,0	97,6	69,2	4,2	6,3	2,0	2,8	3,7	4,5	1,1	1,5	1,3	14,6	9,0
Alcohol	45,9	100,0	42,7	2,4	3,8	1,3	1,9	2,5	3,2	0,7	1,3	0,9	11,9	7,6
Hachís	76,1	98,4	100,0	4,6	7,4	2,8	4,0	5,2	6,5	1,8	2,1	1,9	15,6	10,8
Éxtasis	80,6	100,0	81,1	100,0	60,9	41,1	34,2	45,4	47,5	27,8	31,5	34,9	39,3	37,3
Alucinógenos	79,0	100,0	84,1	39,7	100,0	29,6	32,9	35,6	39,8	20,5	20,5	18,1	38	32,7
Speed	65,5	100,0	85,6	70,7	77,9	100,0	63,6	75,7	79,4	46,7	44,2	52,6	43,1	55,3
Coca. Base	66,3	100,0	86,0	42,5	62,6	46,0	100,0	67,9	100,0	31,9	33,8	39,8	41,7	43,4
Coca. Polvo	67,5	100,0	87,2	43,6	52,4	42,3	52,5	100,0	100,0	24,7	26,1	37,5	30,7	31,5
Coca (B/P)	65,8	100,0	88,1	36,6	46,9	35,5	62,0	80,1	100,0	19,8	22,1	30,1	29,0	28,5
Heroína	60,9	100,0	87,9	79,1	89,5	77,4	73,2	73,2	73,2	100,0	67,1	73,2	65,5	65,5
S. Volátiles	44,6	93,4	55,9	48,1	48,1	39,3	41,5	41,5	43,9	36,0	100,0	35,9	51,2	42,4
Ghb	62,4	100,0	80,6	85,9	68,4	75,4	78,9	96,2	96,2	63,3	57,9	100,0	52,8	52,8
Tranq.	46,7	86,0	45,3	6,5	9,7	4,2	5,6	5,3	6,3	3,8	5,6	3,6	100,0	54,6
Tranq. Sin	47,2	87,7	51,2	10,1	13,6	8,7	9,5	8,9	10,0	6,2	7,5	5,8	89,1	100,0

RELACIÓN DE CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS ÚLTIMOS 30 DÍAS														
TABLA 3.13.3 (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])														
	Tabaco	Alcohol	Hachís	Éxtasis	Alucinóg.	Speed	Coca Base	Coca Polvo	Coca (B/P)	Heroína	Sust. Volát.	Ghb	Tranq.	Tranq. Sin
Tabaco	100,0	87,2	57,7	2,3	3,2	1,1	1,8	2,0	2,6	1,1	1,1	1,1	8,7	4,1
Alcohol	37,2	100,0	31,2	1,5	1,9	0,9	1,4	1,4	1,9	0,8	1,0	0,8	6,5	4,0
Hachís	70,6	89,6	100,0	4,1	4,4	2,7	3,3	3,5	4,6	2,2	2,2	2,2	8,3	5,4
Éxtasis	60,7	95,8	89,1	100,0	57,7	50,9	43,0	47,0	47,0	46,9	45,9	43,0	46,9	43,0
Alucinógenos	61,5	89,0	69,1	41,6	100,0	36,7	43,4	43,4	49,1	35,9	35,9	31,1	43,8	41,0
Speed	41,8	87,5	83,0	73,2	73,1	100,0	61,9	67,5	73,2	61,7	61,9	56,2	60,3	66,1
Coca. Base	50,1	95,5	77	46,9	65,6	46,9	100,0	65,6	100,0	46,9	51,1	55,5	55,5	55,6
Coca. Polvo	55,4	95,5	81,7	50,3	64,3	50,2	64,3	100,0	100,0	46,0	45,9	54,4	46,0	46,0
Coca (B/P)	54,1	96,7	80,0	37,6	54,4	40,7	73,3	74,8	100,0	34,4	37,5	40,7	40,7	40,8
Heroína	49,5	92,4	85,9	82,8	87,9	75,7	75,9	75,9	75,9	100,0	68,9	75,9	75,9	75,9
S. Volátiles	31,3	74,7	50,4	49,4	53,6	46,3	50,5	46,2	50,5	42,0	100,0	46,2	54,7	50,5
Ghb	54,9	92,2	85,5	78,4	78,4	71,1	92,7	92,7	92,7	78,4	78,2	100,0	78,4	78,4
Tranq.	40,1	75,0	31,4	8,2	10,5	7,3	8,8	7,5	8,8	7,5	8,8	7,5	100,0	49,4
Tranq. Sin	33,2	78,7	35,8	13,1	17,3	14,0	15,5	13,1	15,5	13,1	14,3	13,1	86,5	100,0

Como hemos mencionado más arriba, alcohol, tabaco y cannabis, parecen presentar una relación mutua, en el sentido de que el consumo de cualquiera de ellas tres implica, en gran medida, el consumo de las otras dos, siendo el consumo conjunto de alcohol y hachís el que menor relación tiene.

La heroína, el GHB y el speed son las sustancias que más relación de policonsumo tienen con las restantes sustancias analizadas, aunque también el consumo de éxtasis, especialmente alguna vez en la vida, y de base y cocaína en polvo, sobre todo en los últimos 30 días, guarda relación directa con los consumos de otras sustancias.

Por su parte, los tranquilizantes no parecen guardar ninguna relación de policonsumo con el resto de las sustancias analizadas, salvo con alcohol, tabaco y cannabis para alguna vez en la vida, con alcohol y cannabis en los últimos 12 meses, y únicamente con alcohol en los últimos 30 días.

En los apartados que siguen a continuación se hace un análisis del consumo conjunto de alcohol y cannabis, y de alcohol y cocaína.

3.14. CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS

La tabla 3.14.1 presenta las prevalencias de consumo concomitante de alcohol y cannabis estimadas para las Islas Baleares, por sexo y edad. En los últimos 12 meses, un 26,5% del alumnado balear encuestado consumió conjuntamente las dos sustancias en alguna ocasión.

Por sexos, se observa que el consumo conjunto de alcohol y cannabis es superior en los hombres, con 2,3 puntos porcentuales de diferencia con respecto a las mujeres. El consumo analizado está además muy ligado a la edad, de manera que aumenta conforme lo hace ésta, pasando de un 14,9% en las y los jóvenes de 14 años al 36,4% entre el alumnado de 18.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Baleares 2010	
Total	26,5
Sexo	
· Hombres	27,7
· Mujeres	25,4
Edad	
· 14 años	14,9
· 15 años	21,2
· 16 años	29,9
· 17 años	35,5
· 18 años	36,4

A continuación se analiza el consumo concomitante de estas dos sustancias por sexo y edad conjuntamente.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Balears 2010	
Hombres	
· 14 años	16,2
· 15 años	22,1
· 16 años	34
· 17 años	32
· 18 años	35,3
Mujeres	
· 14 años	14
· 15 años	20,3
· 16 años	25,7
· 17 años	38,9
· 18 años	37,1

Los 18 años son la edad en la que el consumo conjunto de alcohol y cannabis es más habitual entre los hombres, y los 17 en el caso de las chicas. La mayor prevalencia del consumo concomitante de alcohol y cannabis se encuentra en las chicas de 17 años, con un 38,9% que reconocen haber consumido dichas sustancias de manera conjunta en los últimos 12 meses.

En relación al tipo de enseñanza, encontramos las mayores prevalencias en el alumnado de FP de Grado Medio.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS SEGÚN TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
Balears 2010	
Total	26,5
Titularidad	
· Pública	27,1
· Privada	25,3
Tipo de Enseñanza	
· E.S.O.	21,8
· Bachillerato	32,9
· FP Grado Medio	34,2
· FP Grado Superior	-

3.15. CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA

En los 12 meses anteriores a la Encuesta, un 2,7% del alumnado de entre 14 y 18 años de las Islas Baleares consumió conjuntamente alcohol y cocaína, un dato ligeramente inferior al obtenido para el conjunto del alumnado español de la misma edad.

También en este caso, la prevalencia del consumo es ligeramente superior entre las mujeres. Con respecto a la edad, los datos de la tabla 3.15.1 muestran cómo el consumo simultáneo de alcohol y cocaína, en general, aumenta con los años, a excepción del paso de los 14 a los 15 años, momento en que disminuye, y de los 16 a los 17, en que se mantiene estable.

PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Baleares 2010	
Total	2,7
Sexo	
· Hombres	2,5
· Mujeres	2,8
Edad	
· 14 años	3
· 15 años	2
· 16 años	3
· 17 años	2,8
· 18 años	3,4

Analizando el consumo concomitante de las dos sustancias por sexo y edad conjuntamente, encontramos que los chicos baleares presentan un consumo superior al de las chicas a los 14 y a los 16 años, e inferior en el resto de edades. La mayor diferencia entre mujeres y hombres está en los 18 años, momento en que el consumo de ellas supera en 5,7 puntos al de ellos.

TABLA 3.15.2 PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA SEGÚN SEXO Y EDAD SIMULTÁNEAMENTE

ÚLTIMOS 12 MESES

Balears 2010	
Hombres	
· 14 años	3,2
· 15 años	1,7
· 16 años	3,8
· 17 años	1,8
· 18 años	1
Mujeres	
· 14 años	3
· 15 años	2,1
· 16 años	2
· 17 años	3,6
· 18 años	6,7

En cuanto a la titularidad del centro educativo, el consumo es superior entre el alumnado de centros públicos. Por su parte, los resultados por tipo de enseñanza indican que el mayor incremento en el consumo se produce en el paso de Bachillerato a FP de Grado Medio, y es ahí donde alcanza su valor máximo.

TABLA 3.15.3 PREVALENCIAS DEL CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA SEGÚN TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA

ÚLTIMOS 12 MESES


Balears 2010	
Total	2,7
Titularidad	
· Pública	3,1
· Privada	1,9
Tipo de Enseñanza	
· E.S.O.	2,8
· Bachillerato	2,2
· FP Grado Medio	3,8
· Fp Grado Superior	-

3.16. CANNABIS: PATRONES DE CONSUMO RELEVANTES

En la Encuesta de la presente edición figuraba un apartado específico sobre patrones relevantes de consumo de cannabis en los últimos 12 meses. En dicho apartado y a través de diferentes escalas, se dimensionan diversos comportamientos y conductas de consumo de cannabis.


En el gráfico 3.16.1. se recogen algunos de dichos patrones y comportamientos acontecidos en los últimos 12 meses. De acuerdo con esto, un 8,3% de las y los jóvenes baleares entrevistados fumaron cannabis antes del mediodía de manera muy o bastante frecuente. De la misma manera, un 9,1% fumaron cannabis estando solos/as en los últimos 12 meses. También conviene destacar que un 9,3% de los y las estudiantes entre 14 y 18 años que han fumado cannabis en los últimos 12 meses, han tratado de reducir o dejar el consumo de cannabis sin conseguirlo de forma bastante o muy frecuente. Por último señalamos que un 3,3% del alumnado entrevistado ha tenido problemas (peleas, accidentes, malos resultados...) debido al consumo de cannabis de manera muy o bastante frecuente en los últimos 12 meses.

GRÁFICO 3.16.1. PATRONES RELEVANTES Y COMPORTAMIENTOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE CANNABIS




El gráfico 3.16.2 continúa en la misma línea, mostrando la frecuencia de ocurrencia de diversos hechos asociados al consumo de cannabis. Lo más destacado es que un 10,8% de las y los estudiantes baleares que han consumido cannabis en los últimos 12 meses han deseado poder dejarlo siempre o casi siempre; destacable es también el hecho de que un 5,3% de jóvenes que han consumido cannabis hayan pensado que no podían controlar su consumo.

GRÁFICO 3.16.2. FRECUENCIA DE DIVERSOS HECHOS RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE CANNABIS



Profundamente relacionado con esto, el gráfico siguiente muestra las dificultades que han tenido las y los jóvenes baleares entrevistados para dejar o estar sin consumir cannabis en los últimos 12 meses. De acuerdo con los datos, a un 2,3% de jóvenes de entre 14 y 18 años que consumieron cannabis en el último año les resultó “imposible” dejar o estar sin consumir dicha droga en este período; por el contrario, un 85,3% declaró que el hecho de dejar o de estar sin consumir cannabis en el último año les resultó “nada difícil”.

GRÁFICO 3.16.3. DIFICULTAD PARA DEJAR O ESTAR SIN CONSUMIR CANNABIS LOS ÚLTIMOS 12 MESES



4.OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS

4.1. RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE CONSUMO

Para medir la opinión del estudiantado acerca del riesgo del consumo de drogas de forma esporádica se les ha consultado acerca de la percepción que tienen sobre los problemas que puede acarrear, de salud, o de cualquier otro tipo, el consumo esporádico de drogas.

La tabla que figura a continuación recoge la proporción de estudiantes que considera que consumir determinadas sustancias puede acarrear **bastantes o muchos problemas** (de salud o de otro tipo).

RIESGO PERCIBIDO ANTE EL CONSUMO ESPORÁDICO DE DROGAS (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)	
Balears 2010	
Cannabis	42,7
Tranquilizantes	33,6
Éxtasis	81,2
Cocaína (polvo)	77,2
Heroína	83,6

El alumnado balear de entre 14 y 18 años asocia al **consumo esporádico** de heroína (83,6%), éxtasis (81,2%) y cocaína en polvo (77,2%) los mayores riesgos, mientras que menos de la mitad (42,7%) considera que el consumo de cannabis les pueda causar problemas. Las opiniones de las y los jóvenes de entre 14 y 18 años sobre el consumo esporádico de estas drogas siguen siendo preocupantes, ya que se observa desde la pasada edición un alarmante descenso en la percepción de riesgo que tienen los jóvenes sobre los problemas que puede significar el consumo esporádico de este tipo de drogas.

Que sólo un poco más de la población entrevistada de 14 a 18 años considere que el consumo esporádico puede ser perjudicial (es decir suponer un riesgo para la salud o de otro tipo) puede indicarnos que se está “normalizando” el consumo, por lo menos en el imaginario colectivo de los estudiantes de secundaria y que, por otra parte, no hay mensajes que calen entre este colectivo en cuanto a los problemas que acarrea el consumo de estas sustancias.

En cuanto a las drogas socialmente más aceptadas, observamos que son las que, por ende, presentan menores índices de preocupación. Es el caso del cannabis, con un ya mencionado riesgo de preocupación de un 42,7%.

En la siguiente tabla observamos la **percepción del riesgo**, esta vez ante el **consumo habitual** de diversas sustancias:

RIESGO PERCIBIDO ANTE EL <u>CONSUMO HABITUAL</u> DE DROGAS (proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar bastantes o muchos problemas)	
Baleares 2010	
Tabaco (un paquete diario)	91,5
Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana)	47,9
Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día)	59,8
Cannabis	86,8
Tranquilizantes	83,2
Éxtasis	95,3
Cocaína (polvo)	95,5
Heroína	95,7

Si tenemos en cuenta las opiniones vertidas en cuanto al consumo habitual, el mayor riesgo percibido es para la heroína (95,7%), seguida de cerca por la cocaína en polvo (95,5%) y el éxtasis (95,3%). Al igual que ocurría con el consumo esporádico, se observa un ligero descenso en la percepción de riesgo que tiene el alumnado de entre 14 y 18 años sobre las drogas “más duras”.

El alcohol, una de las drogas más aceptada socialmente, es la que obtiene menores valores para este indicador: 5 ó 6 copas de alcohol en un fin de semana (47,9%) y 1 ó 2 copas de alcohol cada día (59,8%).

La tendencia que se ha venido apuntando desde el inicio de estas campañas es que el consumo habitual tiene mayores problemas asociados que el consumo esporádico.

La siguiente tabla nos muestra el porcentaje de riesgo percibido para el consumo habitual de sustancias desagregado por sexo y edad. En ella observamos, tal y como ocurría en otras ediciones de la Encuesta ESTUDES, que las mujeres perciben un mayor riesgo que los hombres para todas las sustancias, exceptuando los tranquilizantes.

TABLA 4.1.3 RIESGO PERCIBIDO EN CONSUMO HABITUAL POR SEXO Y EDAD

	SEXO		EDAD					Total
	Hombre	Mujer	14	15	16	17	18	
Tabaco (un paquete diario)	90,5	92,5	90,3	91,8	91,5	91,3	94,2	91,5
Alcohol (5 ó 6 cañas fin de semana)	45,9	49,6	56,8	51,7	46,9	36,8	48,7	47,9
Alcohol (1 ó 2 cañas cada día)	57,8	61,5	63,9	62,1	59,8	54,7	56,3	59,8
Cannabis	84,4	89	89,1	88	87,4	84,5	83	86,8
Tranquilizantes	83,4	83	81,6	82,8	82,6	84,5	88,7	83,2
Éxtasis	94,5	96,1	95,9	94	96,1	95,1	97,8	95,3
Cocaína (polvo)	94,5	96,2	96,3	94,3	96	95,1	97,9	95,5
Heroína	94,2	97,1	95,2	94,1	96,7	96	97,8	95,7

Si tenemos en cuenta la edad, observamos que a pesar de que el riesgo percibido de fumar tabaco se mantiene casi constante en todas las edades, la percepción de riesgo que conlleva el consumo de cannabis, sustancia estrechamente relacionada con el tabaco, disminuye conforme aumenta la edad. La valoración más acusada la encontramos entre los 14 y los 15 años.

En las tablas siguientes, se observan las percepciones, por sexo y por edad, de las y los estudiantes baleares de entre 14 y 18 años que estiman que consumir las sustancias por las que se les ha consultado de forma puntual o habitual, puede causar muchos problemas.

TABLA 4.1.4 PREVALENCIA DE CONSUMO ESPORÁDICO SEGÚN SEXO Y EDAD (prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas)

	SEXO		EDAD					Total
	Hombre	Mujer	14	15	16	17	18	
Tabaco	10	5	6,1	8,3	5,5	6,8	15,9	7,4
Tranquilizantes	14,8	15,1	13,3	18,1	13,3	10,5	24,5	15
Cannabis	18,9	22,2	25,4	23,8	16,9	15,5	27,3	20,6
Cocaína (base)	47,7	42,7	42,5	47,7	40,9	44,1	58	45,1
Cocaína (polvo)	43,3	37,2	38,1	40,5	39,3	36,5	55,3	40,1
Éxtasis	48,7	42,3	42,5	46,2	44,4	43,9	56,2	45,4
Heroína	50,7	50	45,4	50,3	50,7	50,1	59,7	50,3

PREVALENCIA DE CONSUMO HABITUAL SEGÚN SEXO Y EDAD
 (prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo puede causar muchos problemas)

TABLA 4.1.5

	SEXO		EDAD					Total
	Hombre	Mujer	14	15	16	17	18	
Tabaco	50,7	54,4	50,6	53,5	52,6	53,4	52,6	52,7
Alcohol (5 o 6 cañas fin de semana)	12,6	10,5	11,6	14,3	11,2	7,2	14,6	11,5
Alcohol (5 o 6 cañas cada día)	64,1	62	64,9	63,7	65	59,7	58	63
Tranquilizantes	39,4	38,1	36,1	43	37,1	34	47,5	38,7
Cannabis	52,8	60,7	64,8	60,1	54,3	51	56,2	56,9
Cocaína (base)	83	82,7	81,8	82,7	83,5	80,7	89,5	82,9
Cocaína (polvo)	81,5	80,4	81,1	80	82,3	77,3	91,4	81
Éxtasis	81,8	81,6	79	80,3	83,9	80,2	88,4	81,7
Heroína	81,9	81,1	79,4	80,1	80,8	82,4	91,1	81,5

El riesgo percibido en el consumo habitual es superior al percibido en el consumo esporádico. Y para ambos tipo de comportamientos, la percepción del consumo de drogas como la cocaína (base y polvo), el éxtasis y la heroína, es mucho mayor que la de las drogas legales como el tabaco o el alcohol.

Si tenemos en cuenta los resultados por sexos en la percepción del riesgo por el consumo esporádico de estas sustancias, observamos que los chicos balares perciben mayor riesgo que las chicas en el consumo de todas las sustancias consideradas, excepto los tranquilizantes y el cannabis. Si analizamos el consumo habitual, los chicos siguen percibiendo unos mayores problemas derivados del consumo de estas sustancias, excepto para el tabaco, los tranquilizantes y el cannabis.

En cuanto a la edad, observamos que es el alumnado de 18 años el más preocupado por los riesgos del consumo de tranquilizantes, cocaína (base y polvo), éxtasis y heroína, y el de 14 el que en mayor medida piensa que el consumo de cannabis puede causar muchos problemas. En relación al tabaco, la tasa de riesgo se mantiene bastante constante, y en cuanto al alcohol, encontramos las mayores prevalencias de riesgo derivado del consumo entre el alumnado de 15 y 16 años.

4.2. DISPONIBILIDAD PERCIBIDA

¿Cómo analizamos la accesibilidad a las diferentes sustancias incluidas en la Encuesta?

La accesibilidad a las diferentes sustancias que se incluyen en la Encuesta se mide a través de la dificultad que observan los escolares para conseguirlas en caso de querer hacerlo.

Si observamos la siguiente tabla, vemos la comparación de la percepción que tienen los estudiantes de 14 a 18 años sobre la dificultad de acceder a diferentes sustancias, incluidas en la Encuesta, medida como el porcentaje de alumnos y alumnas que consideran que les resulta o resultaría muy fácil o relativamente fácil conseguirlas.

DISPONIBILIDAD PERCIBIDA PARA LAS DROGAS (proporción de estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada droga)	
Baleares 2010	
Alcohol	94,3
Tranquilizantes	63,8
Cannabis	72
Cocaína (polvo)	33,1
Heroína	25,2
Anfetaminas	25
Éxtasis	25,8
Alucinógenos	32,8
Sustancias Volátiles	-

Tal y como ocurría en anteriores ediciones el alcohol y el cannabis siguen siendo las sustancias más accesibles, con un 94,3% y 72% respectivamente, de estudiantes que consideran que son sustancias que se pueden conseguir de forma relativamente fácil o muy fácil.

Se observa más acusadamente en esta edición el cambio en la tendencia para la disponibilidad observado en el 2006 y en el 2008 en que disminuía la percepción de la facilidad para hacerse con determinadas sustancias, observándose ahora un repunte de la opinión según la cual, existen menos dificultades que anteriormente para conseguir drogas.

5. INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS

¿Se sienten las y los jóvenes suficientemente informados en relación con el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados a ellas?

Tal y como se aprecia en la siguiente tabla, las y los jóvenes de las Islas Baleares se sienten suficientemente informados en relación con el consumo de drogas y los efectos y problemas asociados: un 43,6% declara sentirse suficientemente informado y un 32,1% perfectamente informado.

TABLA 5.1		INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS
		Baleares 2010
· Perfectamente informado		32,1
· Suficientemente informado		43,6
· Informado a medias		19,9
· Mal informado		4,4

Si nos fijamos en la información recibida sobre el consumo de drogas teniendo en cuenta el sexo y la edad, observamos que los hombres se sienten mejor informados que las mujeres. Por edad, a medida que las y los estudiantes se “hacen mayores” se van sintiendo mejor informados.

No se observan diferencias significativas en cuanto a titularidad del centro, mientras que por tipo de enseñanza, y en coherencia con las conclusiones del análisis por edad, el alumnado que se siente mejor informado corresponde a los tipos de enseñanza más avanzados.

TABLA 5.2 INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS


	MAL INFORMADO	PERFECTAMENTE INFORMADO	SUFICIENTEM. INFORMADO	INFORMADO A MEDIAS
Total	4,4	32,1	43,6	19,9
Sexo				
· Hombres	3,7	40,7	40,3	15,3
· Mujeres	5,1	24,4	46,5	24,1
Edad				
· 14 años	4,1	29,6	42,9	23,3
· 15 años	6,4	29,7	44,5	19,4
· 16 años	2,8	30,8	45,5	20,8
· 17 años	3,9	34,9	41,7	19,5
· 18 años	5,2	45,1	38,6	11
Titularidad				
· Público	4,9	33,7	42,7	18,7
· Privado	3,6	29,3	45	22,1
Tipo de Enseñanza				
· ESO	5,2	32,7	42,1	20,1
· Bachillerato	3,1	28,3	47	21,5
· CF Grado Medio	5,2	46,8	37,7	10,4
· CF Grado Superior	0	0	0	0

Si observamos el siguiente gráfico que refleja las principales vías por las que la juventud balear ha recibido información sobre drogas, así como otras vías por las que podrían recibir información, concluimos que casi todas las propuestas tienen relevancia.

Las vías más habituales para recibir información son las madres (65,7%), las charlas o cursos (61,7%) y el profesorado (61,6%). A este respecto cabe también destacar que sólo un 0,1% señalan no haber recibido nunca información. Se observa también que parientes tan cercanos como son los hermanos y hermanas, tan sólo son citados por un 19,8% del alumnado.

En cuanto a las vías preferidas por las y los jóvenes baleares para recibir información sobre drogas, el 52% considera que podría recibir una información mejor y más objetiva a través de profesionales sanitarios, y un 48,6% a través de charlas o cursos.

GRÁFICO 5.1: PRINCIPALES VÍAS DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS Y OTRAS VÍAS POR LAS QUE PODRÍAN RECIBIR INFORMACIÓN



6. ENTORNO SOCIAL

Si tenemos en cuenta el entorno social del alumnado, observamos los resultados que se presentan a continuación.

Respecto al consumo de drogas en el entorno social de las y los estudiantes y en su grupo de iguales, en esta edición de la Encuesta ESTUDES para las Islas Baleares, los resultados que muestran el consumo en los últimos 30 días, nos indican que el 77,2% afirma que en su entorno se ha consumido tabaco.

El alcohol sigue siendo la sustancia más generalizada, y así, el 83,7% de las y los jóvenes baleares declaran que en su grupo de amistades se ha consumido alcohol en los últimos 30 días.

Si tenemos en cuenta otras drogas como el hachís, el 49,6% de las amistades de las y los jóvenes encuestados han consumido esta sustancia, lo que la sitúa como la tercera más consumida en el grupo de iguales del alumnado que compone la muestra.

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos según sexo para el consumo de drogas en el grupo de iguales y para todas las sustancias, entendiendo por grupo de iguales, las y los amigos y compañeros con quienes el/la joven se relaciona habitualmente. En este sentido, cabe destacar que la brecha más amplia entre hombres y mujeres corresponde al consumo de hachís, sustancia cuyo consumo es 7,3 puntos porcentuales superior en el grupo de iguales de los hombres que en el de las mujeres.

TABLA 6.1 CONSUMO DE DROGAS EN EL GRUPO DE IGUALES POR SEXO			
	HOMBRE	MUJER	TOTAL
· Tabaco	76,5	77,9	77,2
· Bebidas alcohólicas	82	85,3	83,7
· Tranquilizantes	8,5	12,1	10,4
· Hachís	53,4	46,1	49,6
· Cocaína (polvo)	7,7	8,6	8,1
· Heroína	3,7	3,9	3,8
· Speed	4,8	5,5	5,2
· Éxtasis	4,7	4,7	4,7
· Alucinógenos	7,2	7,4	7,3
· Sustancias volátiles	3,1	2,4	2,7

La siguiente tabla hace referencia a diversos accidentes que ha sufrido el alumnado, causas que los motivaron e implicación de distintas drogas en ellos.

Un 11,2% de las y los alumnos de secundaria de Baleares reconocen haber intervenido en alguna pelea. De ellos, el 27,4% declaró haber consumido alcohol en las 2 horas previas a producirse la misma.

Un 5% fue detenido por la policía o la guardia civil en los últimos 12 meses, de los cuales un 34% expresó haber consumido alcohol y un 33,6% hachís durante las dos horas anteriores a haberse producido la detención.

TABLA 6.2 PORCENTAJE DE JÓVENES INVOLUCRADOS EN ALGUNA INCIDENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE LAS SUSTANCIAS CONSUMIDAS DURANTE LAS 2 HORAS ANTERIORES A ÉSTA

	Alumnos implicados	Alcohol	Hachis	Cocaína	Anfetam. Extasis	Tranquil.	Otras
. Accidente que requirió asistencia médica	6	7,9	9,7	2,6	-	-	-
. Interviniste en alguna pelea	11,2	27,4	16,7	3,2	-	-	-
. Precisaste asistencia sanitaria urgente	11,7	7,2	5,4	1,6	-	-	-
. Fuiste detenido por la policía o guardia civil	5	34	33,6	8	-	-	-

Si tenemos en cuenta las relaciones que los chavales y chavalas mantienen con sus padres, éstas son mejores con la madre que con el padre, tal y como se refleja en la siguiente tabla: el 81,2% considera que son muy o bastantes buenas con su padre, y el 85,9% opina lo mismo de las relaciones con su madre.

TABLA 6.4 ¿CÓMO SON LAS RELACIONES QUE MANTIENES CON TUS PADRES?

	PADRE					MADRE				
	MUY MALAS	BASTANTE MALAS	REGULAR	BASTANTE BUENAS	MUY BUENAS	MUY MALAS	BASTANTE MALAS	REGULAR	BASTANTE BUENAS	MUY BUENAS
Total	2,7	3,2	13	38,4	42,8	0,8	1,9	11,3	35,6	50,3
Sexo										
· Hombre	1,7	3	11,7	39,1	44,5	0,9	1	10,9	38	49,1
· Mujer	3,5	3,3	14,1	37,8	41,2	0,7	2,7	11,7	33,5	51,4
Edad										
· 14 años	2,8	2,7	13,1	38,2	43,1	0,6	1,6	11,2	38,2	48,4
· 15 años	2,3	2,5	13,1	36,1	46	0,9	2,3	11,5	33,5	51,8
· 16 años	2,5	3	12,7	39,7	42,1	0,9	1,4	11,1	39,4	47,2
· 17 años	3,4	2,8	10,4	43,3	40	0,8	2,5	10,5	33	53,1
· 18 años	2,2	8,8	20,8	28,9	39,2	1,1	1,1	14	30,5	53,3
Titularidad										
· Público	2,8	3,5	13,3	38,9	41,6	0,7	1,4	11,5	36,8	49,6
· Privado	2,4	2,6	12,4	37,6	44,9	1	2,7	11	33,5	51,7
Tipo Enseñanza										
· ESO	2,7	2,8	13,7	36,8	44,1	0,9	1,7	12,4	35,1	49,9
· Bachillerato	2,7	2,8	11,1	41,2	42,2	0,9	2,5	9,6	36	51
· CFGM	2,6	7,8	16,9	37,7	35,1	0	0	11,4	38	50,6
· CFGS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Otra cuestión acerca de la cual se consultaba al alumnado era sobre la experimentación de diversas situaciones como discusiones con padres y hermanos o hermanas, robos, escapadas de casa o expulsiones del centro de estudios en los últimos 12 meses. Los resultados para estas cuestiones se observan en la tabla 6.5.

TABLA 6.5 SITUACIONES EXPERIMENTADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO				
	CONFLICTO O DISCUSIÓN IMPORTANTE CON PADRES O HERMANOS	SUFRIR UN ROBO O UN ATRACO	ESCAPARSE DE CASA MÁS DE UN DÍA	HABER SIDO EXPULSADO DEL CENTRO EDUCATIVO UN DÍA O MÁS
Total	33,3	6,1	2,6	2,9
Sexo				
· Hombres	30,7	7,2	3,2	4,7
· Mujeres	35,6	5,1	2	1,3
Edad				
· 14 años	29	4,1	3,6	2,9
· 15 años	30,1	6,6	2,1	2,1
· 16 años	35,9	6	1,4	3,2
· 17 años	35,1	5,8	3,7	3,5
· 18 años	41	8,7	3,4	3,5
Titularidad				
· Público	33,5	5,5	2,8	3,4
· Privado	32,9	7,1	2,1	2,1

Los conflictos con padres o hermanos/as resultan ser la situación más común, con un 33,3% de jóvenes baleares que han afirmado haber experimentado esta situación en el último año, con diferencias importantes en función del sexo. Tan solo un 2,6% ha reconocido haberse escapado de su casa durante más de un día, y un 2,9% ha sido expulsado de su centro educativo durante un día o más, situación ésta más común entre los hombres que entre las mujeres.

Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos acerca de la aplicación de distintas normas fijadas por los padres, en función del sexo, la edad y titularidad del centro en el que el alumnado que respondió a la Encuesta está matriculado:

TABLA 6.6 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
MIS PADRES FIJAN NORMAS CLARAS DE LO QUE PUEDO HACER EN CASA					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
Total	8	9,3	17,5	24,1	41,1
Sexo					
· Hombres	7,6	8,7	18	25,9	39,6
· Mujeres	8,3	9,8	17	22,4	42,5
Edad					
· 14 años	6,3	10,4	16,7	24,5	41,7
· 15 años	5,7	7,7	15,7	25,9	45
· 16 años	10,5	8,8	16,4	24,3	40,1
· 17 años	8,1	9,8	20,5	23,4	38,3
· 18 años	10,4	13,8	22,7	17	36,1
Titularidad					
· Público	9,1	9,8	18	24,8	38,2
· Privado	5,9	8,4	16,5	22,9	46,3

TABLA 6.7 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
MIS PADRES FIJAN NORMAS CLARAS DE LO QUE PUEDO HACER FUERA DE CASA					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
Total	16,2	18,5	22,7	22,2	20,3
Sexo					
· Hombres	16,7	18,8	22,8	21,9	19,8
· Mujeres	15,8	18,3	22,6	22,6	20,8
Edad					
· 14 años	11,3	16,1	19,4	26,4	26,6
· 15 años	11,7	16,1	23,6	24,2	24,5
· 16 años	15,2	18,9	23,8	24,7	17,4
· 17 años	22,7	20,8	22,5	16,7	17,4
· 18 años	32,6	26,5	22,6	9,8	8,5
Titularidad					
· Público	18	19,5	23,5	21,1	17,9
· Privado	13,1	16,9	21,1	24,3	24,6

TABLA 6.8 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
MIS PADRES SABEN <u>CON QUIÉN ESTOY</u> CUANDO SALGO POR LAS NOCHES					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
Total	5,1	3,9	12,3	17,5	61,2
Sexo					
· Hombres	5,8	4,6	14,1	20,7	54,8
· Mujeres	4,6	3,2	10,6	14,5	67,1
Edad					
· 14 años	5,6	3,5	12,4	17,7	60,5
· 15 años	4,5	4	11,9	17,6	62
· 16 años	5,9	2,4	13,1	16,2	62,3
· 17 años	5,1	5,4	11,9	17,3	60,3
· 18 años	3,5	6,5	10,8	21,8	57,4
Titularidad					
· Público	5,6	4,2	12,2	17,5	60,5
· Privado	4,3	3,3	12,4	17,4	62,5

TABLA 6.9 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
MIS PADRES SABEN <u>DÓNDE ESTOY</u> CUANDO SALGO POR LAS NOCHES					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
Total	7,5	8	16,3	19,8	48,3
Sexo					
· Hombres	8,6	9,9	17	19,5	44,9
· Mujeres	6,4	6,3	15,7	20,1	51,6
Edad					
· 14 años	7,6	6,9	18,2	20	47
· 15 años	7,2	7,8	14,2	19,7	51,1
· 16 años	8,7	8,2	16,2	20,4	46,5
· 17 años	5,6	9,5	18,1	18,5	48,3
· 18 años	8,5	6,9	15,9	21	47,7
Titularidad					
· Público	8	8,5	16,4	19,7	47,4
· Privado	6,5	7,3	16,3	19,9	50

TABLA 6.10 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
PUEDO FÁCILMENTE RECIBIR CARIÑO Y CUIDADO DE <u>MI MADRE Y/O MI PADRE</u>					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
	2,1	2,8	8,4	17,5	69,2
Sexo					
· Hombres	2,1	2,9	10	22	63
· Mujeres	2,2	2,7	6,9	13,4	74,8
Edad					
· 14 años	2,2	2,2	8,7	14,2	72,4
· 15 años	1,9	2,4	5,9	18,1	71,7
· 16 años	2,4	2,4	8,7	18,3	68,2
· 17 años	1,5	4,4	10	16,3	67,8
· 18 años	3,2	2,4	12,3	23,1	58,9
Titularidad					
· Público	2,5	2,7	8,8	18,2	67,7
· Privado	1,4	2,9	7,7	16,2	71,7

TABLA 6.11 NORMAS EDUCATIVAS SEGÚN SEXO, EDAD Y TITULARIDAD DEL CENTRO					
PUEDO FÁCILMENTE RECIBIR CARIÑO Y CUIDADO DE <u>MI MEJOR AMIGO/A</u>					
	CASI NUNCA	RARAMENTE	ALGUNAS VECES	A MENUDO	CASI SIEMPRE
Total	2,3	2,3	8,8	21,7	64,9
Sexo					
· Hombres	3,2	3,1	12,5	28,1	53
· Mujeres	1,6	1,5	5,4	15,9	75,6
Edad					
· 14 años	2,5	2,1	8,9	21	65,3
· 15 años	2,9	1,9	7,8	19,7	67,8
· 16 años	2,5	3,1	8,5	22,8	63,1
· 17 años	1,7	1,8	9,8	21,3	65,4
· 18 años	0,6	2,4	10,8	28,8	57,5
Titularidad					
· Público	2,4	2,2	8,8	22,6	63,9
· Privado	2,1	2,5	8,8	20,1	66,5

En las tablas presentadas se observa cómo a la hora de fijar normas fuera de casa los padres son menos estrictos que cuando se trata de fijar las normas sobre lo que las y los jóvenes pueden hacer en casa.

Según el 61,2% del alumnado encuestado, sus padres casi siempre saben con quién están cuando salen por las noches, y según el 48,3%, casi siempre saben dónde se encuentran.

Un 69,2% considera que casi siempre puede recibir fácilmente cariño y cuidado de su padre o de su madre, y un 64,9% afirma lo mismo con respecto a su mejor amigo o amiga. En ambos casos, las percepciones acerca de la facilidad para recibir cariño y cuidado son mucho más comunes en las mujeres.



7. ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS PADRES

Con el objetivo de estudiar un perfil más detallado de las y los jóvenes con consumos intensos de distintas sustancias, se ha analizado de forma conjunta algunas de las situaciones. El resultado de dicho análisis son las siguientes tablas. La primera de ellas refleja las relaciones del alumnado con sus padres según el tipo de consumo diario de tabaco (consumidores y no consumidores):

¿CÓMO SON LAS RELACIONES QUE MANTIENES CON TUS PADRES?		
TABLA 7.1.1 (según consumo de tabaco)		
	No consume	Consume
PADRE		
· Muy malas	2,4	3,6
· Bastante malas	2,5	6
· Regulares	11,4	20,1
· Bastante buenas	39,4	34,5
· Muy buenas	44,3	35,9
MADRE		
· Muy malas	0,7	1
· Bastante malas	1,8	2,4
· Regulares	9,7	18,2
· Bastante buenas	36,5	32,6
· Muy buenas	51,4	45,8

Si tenemos en cuenta las respuestas, parece que existe relación entre el consumo diario de tabaco y las relaciones del alumnado con sus padres, en el sentido de que las relaciones con ambos progenitores son calificadas como mejores por quienes no consumen dicha sustancia.

Realizando un test χ^2 para cada uno de los progenitores, no se obtienen valores significativos, por lo que no se puede inferir una relación entre el consumo diario de tabaco y las relaciones de los jóvenes con sus padres.

En la siguiente tabla se observan los porcentajes obtenidos para el consumo diario de tabaco según el tipo de relación con los progenitores:

¿CÓMO SON LAS RELACIONES QUE MANTIENES CON TUS PADRES?		
TABLA 7.1.2 (según tipo de relación)		
	No consume	Consume
PADRE		
· Muy malas	74,8	25,2
· Bastante malas	64,4	35,6
· Regulares	71,2	28,8
· Bastante buenas	83,2	16,8
· Muy buenas	84,3	15,7
MADRE		
· Muy malas	75	25
· Bastante malas	76,6	23,4
· Regulares	70,2	29,8
· Bastante buenas	83,1	16,9
· Muy buenas	83,2	16,8

Si observamos los resultados en este sentido, es decir según el tipo de relación que mantienen bien con la madre o bien con el padre, vemos con mayor claridad este tipo de relación entre el consumo diario de tabaco y la relación con los padres. Si tenemos en cuenta las relaciones con el padre, observamos como entre quienes las consideran muy buenas, el 84,3% no consumen tabaco a diario, porcentaje que cae drásticamente hasta un 15,7% entre quienes sí reconocen consumir tabaco. La misma tendencia se observa en la relación con la madre.

Si analizamos ahora si existe o no correspondencia entre el hecho de que fume alguna de las personas con las convive la persona encuestada y el comportamiento del consumo diario de tabaco que ésta presenta, observamos que cuando ninguna de las personas con las que se convive fuma, el 85,9% no fuma a diario, y solo lo hace el 14,1%. Si se convive con personas fumadoras, este último porcentaje se incrementa hasta un 24,6%, tal y como se presenta en la siguiente tabla:

TABLA 7.2			¿ALGUNA DE LAS PERSONAS CON LAS QUE CONVIVES FUMA DIARIAMENTE?	
	No consume		Consumo	
· No	85,9		14,1	
· Sí	75,4		24,6	
· Vives en un centro educativo	100		0	
· Vives solo/a	77,2		22,8	

Un análisis de *residuos corregidos* permite establecer con claridad el sentido de las relaciones entre ambas variables. Cuando ninguna de las personas con las que se convive fuma, existe una relación inversa, es decir, convivir con gente no fumadora aumenta las probabilidades de no fumar diariamente, mientras que convivir con gente fumadora es determinante para que el o la joven termine fumando diariamente. Para los casos de residencia en un centro educativo o para quienes viven solos, el reducido número de casos hace inadecuado contrastar estas situaciones.

Si tenemos en cuenta la relación entre el consumo diario de tabaco y el permiso paterno y/o materno para fumar, parece que esta variable influye también en el hecho de que las y los jóvenes decidan hacerlo o no, tal y como se refleja en la siguiente tabla:

TABLA 7.3			PERMISO PATERNO Y MATERNO PARA FUMAR	
	No consume		Consumo	
PADRE				
· Me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	45,4		54,6	
· Me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa	52,6		47,4	
· No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto	88		12	
· No sabe	83,6		16,4	
MADRE				
· Me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	46,9		53,1	
· Me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa	49,2		50,8	
· No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto	88,5		11,5	
· No sabe	86		14	

Analizando los resultados obtenidos (porcentajes y residuos) vemos que tanto el padre como la madre presentan patrones idénticos, y no existe una clara relación entre el permiso de los progenitores y el comportamiento de las y los chavales respecto al consumo de tabaco. Observamos que un 54,6% del alumnado que cuenta con el permiso paterno para fumar en

cualquier sitio, y un 53,1% de quienes tienen permiso de su madre para hacerlo, consume tabaco habitualmente.

Siguiendo con este análisis, se ha querido comprobar si existe relación entre el hecho de repetir algún curso y el consumo de tabaco, tal y como refleja la tabla que se presenta a continuación:

TABLA 7.4		
¿HAS REPETIDO CURSO ALGUNA VEZ?		
	No consume	Consume
· No	13,9	83,1
· Sí, un curso	30,8	69,2
· Sí, dos o más cursos	23,2	76,8

Tres son las posibles respuestas que obtenemos y que pueden tener una relación con el hecho de fumar diariamente. La mayor tasa de consumo de tabaco corresponde a quienes nunca han repetido curso, de manera que no parece que las probabilidades de que el alumno o alumna fume a diario tengan que ver con este criterio. El análisis de los *residuos corregidos* permite corroborar que el sentido de esta relación es el mencionado.

Paralelamente al análisis realizado para el consumo diario de tabaco, se ha realizado un análisis para el consumo intenso de alcohol.

La tabla que sigue a continuación nos permite confirmar cómo son las relaciones con los progenitores según si durante los 30 días anteriores a la realización de la Encuesta se ha consumido o no alcohol.

TABLA 7.5		
RELACIONES CON LOS PADRES EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS		
	No consume	Consume
PADRE		
· Muy malas o Bastante malas	32,6	67,4
· Regulares	31,4	68,6
· Bastante buenas o Muy buenas	40,3	59,7
MADRE		
· Muy malas o Bastante malas	27,1	72,9
· Regulares	31,8	68,2
· Bastante buenas o Muy buenas	40	60

A la vista de los datos, encontramos las menores tasas de consumo de alcohol entre quienes califican de bastante o muy buenas las relaciones con sus padres. Si analizamos esta situación, vemos que ambos contrastes χ^2 no son significativos, que los resultados de los coeficientes Tau-b, Tau-c y Gamma implican una relación inversa y que del análisis de residuos no se puede señalar una relación estadísticamente significativa. Por ello, no se puede concluir de manera categórica que cuanto mejores sean las relaciones de las y los jóvenes con sus padres, menores serán las probabilidades de que se hayan emborrachado, al menos una vez, durante el mes anterior a la realización de la Encuesta.

La tabla 7.6 presenta la relación entre el permiso de los padres para tomar bebidas alcohólicas y el hecho de haberse emborrachado en alguna ocasión.

Si observamos los resultados obtenidos mediante el análisis de los porcentajes y de los *residuos corregidos* vemos que la relación existente es en el mismo sentido para ambos padres. Cuando no permiten que sus hijos e hijas consuman alcohol, se establece una mayor probabilidad de que éstos no lo hagan, mientras que si sí les permiten beber, ya sea en cualquier sitio o sólo fuera de casa, aumentan las probabilidades de que se hayan emborrachado alguna vez durante los últimos 30 días.

TABLA 7.6 PERMISO PATERNO Y MATERNO PARA TOMAR BEBIDAS ALCOHÓLICAS		
	No consume	Consume
PADRE		
· Me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	19,6	80,4
· Me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa	24,9	75,1
· No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto	53,6	46,4
· No sabe	40,9	59,1
MADRE		
· Me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio	17,7	82,3
· Me lo permitiría (o me lo permite) pero no en casa	24,3	75,7
· No me lo permitiría (o no me lo permite) en absoluto	53,6	46,4
· No sabe	42	58

Hasta el momento observamos que el comportamiento del consumo intenso de alcohol es prácticamente igual al del consumo diario de tabaco. Nos planteamos ahora conocer si el haber repetido curso alguna vez influye en las borracheras de las y los chavales durante los últimos 30 días. Los datos se presentan en la siguiente tabla:

TABLA 7.7	¿HAS REPETIDO CURSO ALGUNA VEZ?	
	No consume	Consume
· No	39,3	60,7
· Sí, un curso	34,3	65,7
· Sí, dos o más cursos	43,4	56,6

Para esta variable, encontramos que la tasa más baja en cuanto a consumo intenso de alcohol corresponde a quienes han repetido dos cursos o más. El contraste χ^2 revela que la relación entre ambas variables no es estadísticamente significativa, con lo que no se puede concluir que el haber repetido curso influya en las posibilidades de que el alumno o la alumna se haya emborrachado, al menos una vez, durante el mes previo a la realización de la Encuesta.

Siguiendo la misma tendencia, se han construido las siguientes tablas (7.8.1 y 7.8.2), en las que se analiza el estado de las relaciones que las y los jóvenes mantienen con su padre y su madre respectivamente, en función del consumo diario de las distintas sustancias que se han venido analizando a lo largo de la Encuesta.

TABLA 7.8.1

RELACIONES CON EL PADRE EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

		MUY MALAS	BASTANTE MALAS	REGULARES	BASTANTE BUENAS	MUY BUENAS
TABACO	NO CONSUME	2,3	2,6	11,5	38,2	45,4
	CONSUME	3,9	5,1	17,5	39,3	34,1
ALCOHOL	NO CONSUME	2,0	3,1	10,3	38,3	46,3
	CONSUME	3,2	3,5	14,2	38,6	40,5
ALCOHOL INTENSO (borracheras)	NO CONSUME	2,5	2,2	10,8	39,3	45,1
	CONSUME	3,5	4,7	15,5	37,3	38,9
TRANQUILIZANTES (con y sin receta)	NO CONSUME	2,4	3,1	12,8	38,2	43,5
	CONSUME	7,4	5,2	15,3	42,7	29,4
TRANQUILIZANTES (sin receta)	NO CONSUME	2,6	3,1	12,9	38,2	43,3
	CONSUME	5,4	5,1	16,4	46,7	26,4
HACHIS	NO CONSUME	2,5	2,6	11,9	38,1	45,0
	CONSUME	3,3	5,6	17,5	39,9	33,7
COCAÍNA (base)	NO CONSUME	2,6	3,2	12,9	38,4	43,0
	CONSUME	16,5	5,0	23,3	38,1	17,1
COCAÍNA (polvo)	NO CONSUME	2,6	3,2	12,9	38,4	42,9
	CONSUME	10,9	4,7	20,5	40,0	24,0
COCAÍNA (base o polvo)	NO CONSUME	2,6	3,2	12,9	38,4	43,0
	CONSUME	11,7	3,5	22,4	40,7	21,7
GHB	NO CONSUME	2,7	3,2	12,9	38,4	42,9
	CONSUME	0,0	8,5	22,9	48,0	20,6
ÉXTASIS	NO CONSUME	2,7	3,2	13,0	38,4	42,7
	CONSUME	0,0	4,2	7,2	35,8	52,9
SPEED	NO CONSUME	2,7	3,2	13,0	38,3	42,9
	CONSUME	0,0	5,7	9,9	53,6	30,7
ALUCINÓGENOS	NO CONSUME	2,5	3,2	12,9	38,4	43,0
	CONSUME	13,6	3,1	18,6	42,3	22,3
HEROÍNA	NO CONSUME	2,7	3,2	12,9	38,4	42,8
	CONSUME	0,0	7,6	20,6	40,7	31,1
SUSTANCIAS VOLÁTILES	NO CONSUME	2,7	3,1	12,9	38,3	42,9
	CONSUME	0,0	9,0	16,6	50,7	23,8

TABLA 7.8.2

RELACIONES CON LA MADRE EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

		MUY MALAS	BASTANTE MALAS	REGULARES	BASTANTE BUENAS	MUY BUENAS
TABACO	NO CONSUME	0,7	1,6	10,1	34,5	53,1
	CONSUME	1,4	2,6	15,1	39,0	41,8
ALCOHOL	NO CONSUME	0,5	1,5	9,1	35,7	53,2
	CONSUME	1,1	2,3	12,3	36,4	47,8
ALCOHOL INTENSO (borracheras)	NO CONSUME	0,4	1,7	9,6	35,5	52,8
	CONSUME	1,7	2,6	13,4	36,1	46,2
TRANQUILIZANTES (con y sin receta)	NO CONSUME	0,8	1,7	11,0	35,8	50,7
	CONSUME	1,3	5,8	17,4	32,5	42,9
TRANQUILIZANTES (sin receta)	NO CONSUME	0,8	1,7	11,0	35,9	50,5
	CONSUME	1,3	7,0	20,5	27,1	44,1
HACHIS	NO CONSUME	0,7	1,6	10,2	34,8	52,8
	CONSUME	1,5	3,2	16,1	39,3	39,9
COCAÍNA (base)	NO CONSUME	0,8	1,9	11,2	35,8	50,3
	CONSUME	4,8	5,0	20,3	18,3	51,5
COCAÍNA (polvo)	NO CONSUME	0,8	1,9	11,3	35,7	50,3
	CONSUME	3,5	4,9	15,0	27,7	48,9
COCAÍNA (base o polvo)	NO CONSUME	0,8	1,9	11,3	35,7	50,4
	CONSUME	6,0	3,5	14,3	30,3	45,9
GHB	NO CONSUME	0,8	1,9	11,3	35,8	50,2
	CONSUME	0,0	9,3	6,7	6,7	77,2
ÉXTASIS	NO CONSUME	0,8	1,9	11,4	35,8	50,2
	CONSUME	0,0	4,3	7,5	19,2	69,0
SPEED	NO CONSUME	0,8	1,9	11,3	35,7	50,3
	CONSUME	0,0	6,1	10,5	26,9	56,5
ALUCINÓGENOS	NO CONSUME	0,7	1,8	11,2	35,8	50,5
	CONSUME	10,1	10,9	20,4	23,1	35,5
HEROÍNA	NO CONSUME	0,8	1,9	11,3	35,7	50,3
	CONSUME	0,0	8,2	11,9	20,1	59,9
SUSTANCIAS VOLÁTILES	NO CONSUME	0,8	1,8	11,3	35,7	50,3
	CONSUME	0,0	9,4	8,1	28,7	53,9

Para finalizar, se han querido analizar algunos de los problemas y situaciones que el alumnado haya podido experimentar durante los 12 meses anteriores a la realización de la Encuesta, dependiendo de si consume o no las sustancias que se han ido estudiando hasta ahora. Dichos resultados se reflejan en las siguientes tablas, en las que se han descrito las sustancias por filas, y las situaciones propuestas por columnas. El porcentaje representa la distribución de jóvenes involucrados en cada una de las situaciones en función de su consumo o no de cada una de las sustancias.

TABLA 7.9.1 EXPERIMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES EN FUNCIÓN DEL CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE LAS DISTINTAS SUSTANCIAS

		ACCIDENTE CON ASISTENCIA	PELEA O AGRESIÓN	ASISTENCIA MÉDICA URGENTE	DETENCIÓN POLICÍA O GUARDIA CIVIL
TABACO	NO CONSUME	4,3	7,9	10,1	2,9
	CONSUME	9,5	18,1	15,1	9,4
ALCOHOL	NO CONSUME	0,9	6,9	8,8	1,0
	CONSUME	8,1	13,4	13,0	6,7
ALCOHOL INTENSO (borracheras)	NO CONSUME	2,2	6,9	9,6	2,0
	CONSUME	10,1	16,4	14,1	8,7
TRANQUILIZANTES (con y sin receta)	NO CONSUME	5,7	10,4	10,1	4,6
	CONSUME	9,0	18,4	25,4	8,2
TRANQUILIZANTES (sin receta)	NO CONSUME	5,8	10,6	11,3	4,6
	CONSUME	9,3	19,2	16,7	11,2
HACHIS	NO CONSUME	3,7	7,0	10,2	2,3
	CONSUME	11,6	21,2	15,2	11,3
COCAÍNA (base)	NO CONSUME	5,8	10,7	11,5	4,4
	CONSUME	21,5	43,5	25,5	47,5
COCAÍNA (polvo)	NO CONSUME	5,8	10,6	11,4	4,1
	CONSUME	19,4	42,1	23,2	51,1
COCAÍNA (base o polvo)	NO CONSUME	5,7	10,4	11,4	4,1
	CONSUME	21,6	43,0	24,7	43,7
GHB	NO CONSUME	5,9	11,0	11,5	4,7
	CONSUME	23,0	35,4	27,8	51,9
ÉXTASIS	NO CONSUME	5,7	10,9	11,4	4,4
	CONSUME	21,3	25,5	26,1	40,9
SPEED	NO CONSUME	5,8	10,8	11,5	4,5
	CONSUME	23,3	44,3	26,6	55,8
ALUCINÓGENOS	NO CONSUME	5,5	10,6	11,3	4,2
	CONSUME	24,6	32,4	25,1	34,3
HEROÍNA	NO CONSUME	5,9	11,0	11,6	4,7
	CONSUME	26,6	32,9	24,1	60,0
SUSTANCIAS VOLÁTILES	NO CONSUME	6,0	11,0	11,6	4,6
	CONSUME	11,1	26,2	16,2	37,5

TABLA 7.9.2 EXPERIMENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SITUACIONES EN FUNCIÓN DEL CONSUMO EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES DE LAS DISTINTAS SUSTANCIAS

		CONFLICTO CON PADRE O HERMANO	SUFRIR ROBO O ATRACO	ESCAPARSE DE CASA MAS DE 1 DÍA	EXPULSIÓN DEL CENTRO 1 DÍA O MÁS
TABACO	NO CONSUME	27,7	4,9	1,6	1,9
	CONSUME	45,2	8,6	4,7	5,1
ALCOHOL	NO CONSUME	22,6	3,4	0,5	1,4
	CONSUME	38,2	6,9	3,5	3,6
ALCOHOL INTENSO (borracheras)	NO CONSUME	25,0	3,2	1,0	1,8
	CONSUME	40,6	8,8	4,4	4,3
TRANQUILIZANTES (con y sin receta)	NO CONSUME	31,6	5,9	2,1	2,8
	CONSUME	48,4	7,9	6,1	3,8
TRANQUILIZANTES (sin receta)	NO CONSUME	32,0	5,9	2,2	2,9
	CONSUME	52,7	9,3	7,3	2,7
HACHIS	NO CONSUME	28,1	4,4	1,6	1,8
	CONSUME	45,6	10,0	4,9	5,7
COCAÍNA (base)	NO CONSUME	33,2	5,9	2,4	2,7
	CONSUME	43,1	18,4	15,8	16,9
COCAÍNA (polvo)	NO CONSUME	33,1	6,0	2,4	2,7
	CONSUME	41,9	11,1	9,7	14,6
COCAÍNA (base o polvo)	NO CONSUME	32,9	5,9	2,3	2,6
	CONSUME	49,4	15,4	11,0	16,5
GHB	NO CONSUME	33,3	6,0	2,5	2,8
	CONSUME	36,9	10,5	10,5	18,1
ÉXTASIS	NO CONSUME	33,2	6,0	2,4	2,7
	CONSUME	40,0	10,3	13,1	16,1
SPEED	NO CONSUME	33,2	6,0	2,5	2,8
	CONSUME	39,3	10,9	7,3	9,0
ALUCINÓGENOS	NO CONSUME	32,8	5,9	2,4	2,6
	CONSUME	52,0	11,1	9,3	13,9
HEROÍNA	NO CONSUME	33,3	6,0	2,5	2,8
	CONSUME	37,5	12,1	12,1	20,9
SUSTANCIAS VOLÁTILES	NO CONSUME	33,1	6,1	2,4	2,8
	CONSUME	47,9	5,8	12,5	10,7

8. NUEVAS SUSTANCIAS

A pesar de que no existen datos sobre la prevalencia de drogas emergentes en el ámbito internacional, salvo en grupos y entornos de riesgo, la introducción, en la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de 14 a 18 años de Enseñanzas Secundarias en España (2010) de un módulo específico sobre este grupo de sustancias, permite una aproximación a las prevalencias de consumo de las mismas y a la percepción del riesgo que este grupo de población asocia a su consumo, así como a su disponibilidad.

Las nueve sustancias incluidas en el módulo específico de drogas emergentes son: ketamina, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, *research chemicals* y *legal highs*.

El 4,2 % del alumnado balear de entre 14 y 18 años admitió haber consumido, alguna vez en su vida, una o más de las drogas antes mencionadas e incluidas en el grupo de drogas emergentes. De ellos, el 56% fueron chicos y el 44% chicas. Los datos, desagregados por edad mostraron las mayores prevalencias de consumo en las y los jóvenes de 17 y 16 años.

De la misma manera, un 2,9% de estudiantes de las Islas Baleares de la misma franja de edad admitieron haber consumido, alguna vez en los últimos 12 meses, una o más de las drogas antes mencionadas e incluidas en el grupo de drogas emergentes. De ellos, el 55,3% fueron chicos y el 44,7% chicas. Con esta referencia temporal, encontramos de nuevo las mayores prevalencias de consumo entre las y los jóvenes de 17 y 16 años.

Finalmente, un 1,5% del estudiantado de 14 a 18 años admitió haber consumido, alguna vez en el último mes, una o más de las drogas antes mencionadas e incluidas en el grupo de drogas emergentes. De ellos, el 53,2% fueron chicos y el 46,8% chicas. También en este período temporal se producen mayores prevalencias de consumo entre las y los jóvenes de 17 y 16 años.

La tabla siguiente (8.1.) nos muestra las prevalencias de consumo de cada una de las nuevas sustancias consideradas, y teniendo en cuenta los mismos períodos de tiempo que se han venido manejando a lo largo de este informe para el resto de sustancias.

TABLA 8.1

PREVALENCIAS DEL CONSUMO DE NUEVAS SUSTANCIAS

	ALGUNA VEZ	ÚLTIMOS 12 MESES	ÚLTIMOS 30 DÍAS
Ketamina	1	0,6	0,3
Spice	0,8	0,5	0,3
Piperazinas	0,2	0,1	0,1
Mefedrona	0,4	0,3	0,3
Nexus	0,5	0,3	0,1
Metanfetamina	0,6	0,3	0,1
Setas Mágicas	2,3	1,4	0,5
Research Chemicals	0,3	0,2	0,2
Legal Highs	1	0,5	0,5

La escasa diferencia de las cifras de prevalencia de consumo para los indicadores “alguna vez en la vida” y “último año” en muchas de las sustancias estudiadas podría explicarse tanto por la corta edad de las y los jóvenes encuestados a quienes, por tanto, se les presupone un historial de abuso de sustancias relativamente limitado, como por lo reciente de la aparición de estas sustancias en el mercado.

Las prevalencias de consumo en el último mes muestran cifras muy bajas que confirman el carácter esporádico y experimental del consumo de estas sustancias entre el alumnado.

8.1. KETAMINA

El 1% del alumnado balear ha tomado *ketamina* alguna vez en su vida, un consumo que es más habitual entre los hombres, y que aumenta entre los 16 y los 18 años. La mayor prevalencia del consumo se sitúa en los 18 años.

TABLA 8.1.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE KETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
ALGUNA VEZ EN LA VIDA		
Total		1
Sexo		
Hombre		1,1
Mujer		1
Edad		
14 años		1,4
15 años		0,9
16 años		0,7
17 años		1,5
18 años		1,7
Titularidad		
Pública		1
Privada		1,2
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,9
Bachillerato		1,3
CFGM		1,1
CFGS		0

En los últimos 12 meses, consumieron *ketamina* un 0,6% de las y los estudiantes encuestados. En este período, el consumo es más frecuente en las mujeres, y desaparece entre el alumnado de 18 años, encontrándose la mayor prevalencia entre las y los jóvenes de 17.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE KETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,6
Sexo	
Hombre	0,5
Mujer	0,6
Edad	
14 años	0,7
15 años	0,4
16 años	0,5
17 años	1,3
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,4
Privada	1,1
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,4
Bachillerato	1,1
CFGM	0
CFGS	0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *ketamina* cae hasta un 0,3%. En este período, el consumo de los hombres vuelve a ser superior al de las mujeres, y es inexistente entre las y los estudiantes de 17 y 18 años. La mayor prevalencia del consumo de ketamina en los últimos 30 días corresponde al alumnado de 14 años.

TABLA 8.1.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE KETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ÚLTIMOS 30 DÍAS
Total		0,3
Sexo		
Hombre		0,4
Mujer		0,1
Edad		
14 años		0,5
15 años		0,2
16 años		0,4
17 años		0
18 años		0
Titularidad		
Pública		0,2
Privada		0,4
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,3
Bachillerato		0,2
CFGM		0
CFGS		0

8.2. SPICE

El 0,8% del alumnado de las Islas Baleares ha consumido *spice* alguna vez en su vida, un consumo que es más habitual entre los hombres, y cuya mayor prevalencia corresponde a las y los jóvenes de 18 años.

TABLA 8.2.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SPICE SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ALGUNA VEZ EN LA VIDA
Total		0,8
Sexo		
Hombre		1,1
Mujer		0,6
Edad		
14 años		1,2
15 años		0,5
16 años		0,5
17 años		1,3
18 años		1,7
Titularidad		
Pública		0,6
Privada		1,3
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,9
Bachillerato		0,7
CFGM		1,1
CFGS		0

En los últimos 12 meses, consumieron *spice* un 0,5% de las y los estudiantes baleares encuestados. En este período, el consumo de las mujeres supera al de los hombres, y la mayor prevalencia corresponde a las y los estudiantes de 14 años.

TABLA 8.2.2		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SPICE SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ÚLTIMOS 12 MESES
Total		0,5
Sexo		
Hombre		0,4
Mujer		0,5
Edad		
14 años		0,7
15 años		0,2
16 años		0,4
17 años		0,6
18 años		0,6
Titularidad		
Pública		0,2
Privada		1
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,5
Bachillerato		0,4
CFGM		0
CFGS		0

El análisis del consumo de spice durante los 30 días previos a la realización de la Encuesta revela una caída del mismo, que se sitúa en un 0,3%. De nuevo, el consumo es superior entre los hombres, tal y como ocurría para el período “alguna vez en la vida”, y los 17 y 18 años son la edad en la que la prevalencia del consumo es mayor.

TABLA 8.2.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SPICE SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ÚLTIMOS 30 DÍAS
Total		0,3
Sexo		
Hombre		0,4
Mujer		0,3
Edad		
14 años		0,2
15 años		0,1
16 años		0,3
17 años		0,6
18 años		0,6
Titularidad		
Pública		0,1
Privada		0,7
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,3
Bachillerato		0,4
CFGM		0
CFGS		0

8.3. PIPERAZINAS

El 0,2% del alumnado balear ha tomado *piperazinas* alguna vez en su vida, un consumo que es ligeramente superior en las mujeres, y mayor entre las y los estudiantes de 14 años.

TABLA 8.3.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE PIPERAZINAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ALGUNA VEZ EN LA VIDA
Total		0,2
Sexo		
Hombre		0,2
Mujer		0,3
Edad		
14 años		0,7
15 años		0,1
16 años		0
17 años		0,4
18 años		0
Titularidad		
Pública		0,1
Privada		0,5
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,3
Bachillerato		0,2
CFGM		0
CFGS		0

En cuanto a los últimos 12 meses, la tasa de consumo es de un 0,1%, y el consumo de hombres y mujeres se iguala. Los 14 años siguen siendo la edad en la que prevalencia de consumo es mayor y, junto con los 15, la única en la que existe consumo de esta sustancia.

El consumo de piperazinas en los últimos 12 meses corresponde a estudiantes de ESO matriculados en centros de titularidad privada.

TABLA 8.3.2		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE PIPERAZINAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES			
Total			0,1
Sexo			
Hombre			0,1
Mujer			0,1
Edad			
14 años			0,5
15 años			0,1
16 años			0
17 años			0
18 años			0
Titularidad			
Pública			0
Privada			0,3
Tipo de Enseñanza			
ESO			0,2
Bachillerato			0
CFGM			0
CFGS			0

Durante los últimos 30 días, el consumo de piperazinas se mantiene en el mismo porcentaje que en los últimos 12 meses, repitiéndose los comportamientos observados en ese período.

TABLA 8.3.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE PIPERAZINAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
ÚLTIMOS 30 DÍAS		
Total		0,1
Sexo		
Hombre		0,1
Mujer		0,1
Edad		
14 años		0,2
15 años		0,1
16 años		0
17 años		0
18 años		0
Titularidad		
Pública		0
Privada		0,2
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,1
Bachillerato		0
CFGM		0
CFGS		0

8.4. MEFEDRONA

El 0,4% del alumnado de las Islas Baleares ha tomado *mefedrona* alguna vez en su vida, más las mujeres que los hombres, y en mayor medida las y los jóvenes de 14 años que el resto.

TABLA 8.4.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE MEFEDRONA SEGÚN SEXO, EDAD, TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ALGUNA VEZ EN LA VIDA
Total		0,4
Sexo		
Hombre		0,3
Mujer		0,4
Edad		
14 años		1,2
15 años		0,1
16 años		0,1
17 años		0,6
18 años		0
Titularidad		
Pública		0,2
Privada		0,6
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,4
Bachillerato		0,4
CFGM		0
CFGS		0

En los últimos 12 meses, el consumo de *mefedrona* se sitúa en un 0,3%. Los comportamientos en función del sexo se repiten, aunque la brecha de género se agranda, mientras que en el análisis del consumo en función de la edad encontramos de nuevo la mayor prevalencia en el consumo entre el alumnado de 14 años.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE MEFEDRONA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,3
Sexo	
Hombre	0,2
Mujer	0,4
Edad	
14 años	0,9
15 años	0,1
16 años	0,1
17 años	0,6
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,2
Privada	0,6
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,3
Bachillerato	0,4
CFGM	0
CFGS	0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *mefedrona* entre el estudiantado balear en dicho período temporal se mantiene en un 0,3%.

TABLA 8.4.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE MEFEDRONA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 30 DÍAS			
Total			0,3
Sexo			
Hombre			0,2
Mujer			0,3
Edad			
14 años			0,7
15 años			0,1
16 años			0,1
17 años			0,4
18 años			0
Titularidad			
Pública			0,1
Privada			0,5
Tipo de Enseñanza			
ESO			0,3
Bachillerato			0,3
CFGM			0
CFGS			0

8.5. NEXUS

El 0,5% del alumnado balear ha tomado *nexus* alguna vez en su vida, un consumo que es superior entre los hombres y que aumenta entre los 16 y los 17 años. La mayor prevalencia del consumo (0,9%) corresponde al alumnado de 14 años de edad.

TABLA 8.5.1		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE NEXUS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ALGUNA VEZ EN LA VIDA
Total		0,5
Sexo		
Hombre		0,6
Mujer		0,4
Edad		
14 años		0,9
15 años		0,4
16 años		0,3
17 años		0,7
18 años		0
Titularidad		
Pública		0,4
Privada		0,6
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,5
Bachillerato		0,5
CFGM		0
CFGS		0

En los últimos 12 meses, consumieron *nexus* un 0,3% de las y los estudiantes baleares encuestados. El consumo de las mujeres duplica en este período al de los hombres, y los 17 años son la edad en la que la prevalencia del consumo es mayor.

TABLA 8.5.2		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE NEXUS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA
		ÚLTIMOS 12 MESES
Total		0,3
Sexo		
Hombre		0,2
Mujer		0,4
Edad		
14 años		0,2
15 años		0,2
16 años		0,3
17 años		0,6
18 años		0
Titularidad		
Pública		0,2
Privada		0,5
Tipo de Enseñanza		
ESO		0,2
Bachillerato		0,5
CFGM		0
CFGS		0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *nexus* entre el estudiantado balear de entre 14 y 18 años es de un 0,1%, siendo en este caso superior en los hombres, y encontrándose la mayor prevalencia en los 17 años, igual que sucedía en el período anterior.

TABLA 8.5.3		PREVALENCIA DEL CONSUMO DE NEXUS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 30 DÍAS			
Total			0,1
Sexo			
Hombre			0,2
Mujer			0,1
Edad			
14 años			0,2
15 años			0,1
16 años			0,1
17 años			0
18 años			0
Titularidad			
Pública			0,1
Privada			0,2
Tipo de Enseñanza			
ESO			0,1
Bachillerato			0,1
CFGM			0
CFGS			0

8.6. METANFETAMINAS

El 0,6% del alumnado balear ha tomado *metanfetaminas* alguna vez en su vida. El consumo de los hombres duplica al de las mujeres, y la mayor prevalencia corresponde a las y los jóvenes de 14 años.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE METANFETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
TABLA 8.6.1	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	0,6
Sexo	
Hombre	0,8
Mujer	0,4
Edad	
14 años	0,9
15 años	0,6
16 años	0,4
17 años	0,6
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,5
Privada	0,7
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,7
Bachillerato	0,4
CFGM	0
CFGS	0

En los últimos 12 meses, consumieron *metanfetaminas* un 0,3% de las y los estudiantes de Baleares que respondieron a la Encuesta. El comportamiento en función del sexo se mantiene, agrandándose las diferencias, mientras que en función de la edad, el consumo de dicha sustancia disminuye a medida que ésta aumenta hasta ser inexistente entre el alumnado de 18 años.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE METANFETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,3
Sexo	
Hombre	0,5
Mujer	0,1
Edad	
14 años	0,7
15 años	0,5
16 años	0,3
17 años	0,2
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,3
Privada	0,4
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,4
Bachillerato	0,2
CFGM	0
CFGS	0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *metanfetaminas* cae hasta un 0,1%. Los hombres siguen consumiendo esta droga en mayor medida que las mujeres, aunque las distancias entre unos y otras se hacen ahora más cortas. En cuanto a la edad, el consumo se limita a jóvenes de 14 y 16 años, en mayor medida a los primeros.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE METANFETAMINA SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,1
Sexo	
Hombre	0,2
Mujer	0,1
Edad	
14 años	0,5
15 años	0
16 años	0,1
17 años	0
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,1
Privada	0,2
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,1
Bachillerato	0,1
CFGM	0
CFGS	0

8.7. SETAS MÁGICAS

El 2,3% del alumnado de las Islas Baleares ha tomado *setas mágicas* alguna vez en su vida, un consumo que es más habitual entre los hombres y que aumenta a medida que lo hace la edad, excepto en el paso de los 14 a los 15 años, y con especial incidencia entre los 17 y los 18. Se trata, pues, de la sustancia emergente con mayor prevalencia de consumo de todas las estudiadas.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SETAS MÁGICAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
TABLA 8.7.1	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	2,3
Sexo	
Hombre	2,5
Mujer	2,1
Edad	
14 años	2,3
15 años	1
16 años	1,7
17 años	3,5
18 años	6,8
Titularidad	
Pública	2,7
Privada	1,6
Tipo de Enseñanza	
ESO	1,9
Bachillerato	1,9
CFGM	7,7
CFGS	0

En los últimos 12 meses, consumieron *setas mágicas* un 1,4% de las y los estudiantes baleares encuestados. Los comportamientos en función del sexo y la edad se repiten.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SETAS MÁGICAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	1,4
Sexo	
Hombre	1,7
Mujer	1,1
Edad	
14 años	1,6
15 años	0,6
16 años	1,3
17 años	2,2
18 años	3,4
Titularidad	
Pública	1,6
Privada	1,1
Tipo de Enseñanza	
ESO	1,3
Bachillerato	1,3
CFGM	3,9
CFGS	0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *setas mágicas* se reduce hasta un 0,5%. En esta ocasión, el consumo de hombres y mujeres obtiene el mismo valor, y se reduce en el paso de los 14 a los 15 y de los 16 a los 17 años.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE SETAS MÁGICAS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,5
Sexo	
Hombre	0,5
Mujer	0,5
Edad	
14 años	1,2
15 años	0,2
16 años	0,5
17 años	0,4
18 años	0,6
Titularidad	
Pública	0,5
Privada	0,5
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,5
Bachillerato	0,6
CFGM	0
CFGS	0

8.8. RESEARCH CHEMICALS

El 0,3% del alumnado de Baleares ha tomado *research chemicals* alguna vez en su vida. El consumo es superior entre las mujeres, y alcanza su mayor intensidad en el grupo de jóvenes de 14 años, cayendo a partir de esta edad, y despuntando en el paso de los 16 a los 17, para volver de nuevo a caer, hasta el punto de ser inexistente entre el alumnado de 18 años.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE RESEARCH CHEMICALS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	0,3
Sexo	
Hombre	0,3
Mujer	0,4
Edad	
14 años	0,5
15 años	0,4
16 años	0,1
17 años	0,4
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,1
Privada	0,7
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,4
Bachillerato	0,2
CFGM	0
CFGS	0

En los últimos 12 meses, consumieron *research chemicals* un 0,2% de las y los estudiantes encuestados, de nuevo en mayor medida las mujeres que los hombres. No existe en este espacio temporal consumo entre el alumnado de 16 y 18 años, ni tampoco entre quienes cursan estudios en centros públicos.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE RESEARCH CHEMICALS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,2
Sexo	
Hombre	0,1
Mujer	0,4
Edad	
14 años	0,2
15 años	0,1
16 años	0
17 años	0,4
18 años	0
Titularidad	
Pública	0
Privada	0,5
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,2
Bachillerato	0,2
CFGM	0
CFGS	0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *research chemicals* entre el alumnado que respondió a la Encuesta es del 0,2%, y las diferencias en función del sexo se mantienen. La mayor prevalencia del consumo se encuentra entre las y los estudiantes de 14 años, y es exclusivo del alumnado matriculado en centros de titularidad privada.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE RESEARCH CHEMICALS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,2
Sexo	
Hombre	0,1
Mujer	0,3
Edad	
14 años	0,5
15 años	0,1
16 años	0
17 años	0,4
18 años	0
Titularidad	
Pública	0
Privada	0,5
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,2
Bachillerato	0,2
CFGM	0
CFGS	0

8.9. LEGAL HIGHS

El 1% del alumnado balear ha tomado *legal highs* alguna vez en su vida, consumo que es más habitual entre los hombres y que aumenta entre los 14 y los 15 años y entre los 16 y los 17, alcanzando en esta edad el máximo valor.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE LEGAL HIGHS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ALGUNA VEZ EN LA VIDA	
Total	1
Sexo	
Hombre	1,2
Mujer	0,8
Edad	
14 años	0,7
15 años	0,9
16 años	0,8
17 años	1,5
18 años	1,1
Titularidad	
Pública	0,6
Privada	1,6
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,8
Bachillerato	1,1
CFGM	2,8
CFGS	0

En los últimos 12 meses, consumieron *legal highs* un 0,5% de las y los estudiantes baleares encuestados. Los comportamientos en función del sexo y la edad se repiten, aunque para este período observamos la mayor prevalencia entre las y los jóvenes de 15 años.

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE LEGAL HIGHS SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA	
ÚLTIMOS 12 MESES	
Total	0,5
Sexo	
Hombre	0,6
Mujer	0,4
Edad	
14 años	0,5
15 años	0,7
16 años	0,5
17 años	0,6
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,4
Privada	0,6
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,6
Bachillerato	0,3
CFGM	1,1
CFGS	0

Refiriéndonos a los últimos 30 días, el consumo de *legal highs* se mantiene en un 0,5%. En este período, aumenta la brecha entre hombres y mujeres, y encontramos la mayor prevalencia entre la población de 17 años.

TABLA 8.9.3 PREVALENCIA DEL CONSUMO DE LEGAL HIGHs SEGÚN SEXO, EDAD , TITULARIDAD Y TIPO DE ENSEÑANZA

ÚLTIMOS 30 DÍAS	
Total	0,5
Sexo	
Hombre	0,8
Mujer	0,2
Edad	
14 años	0,2
15 años	0,5
16 años	0,4
17 años	1,1
18 años	0
Titularidad	
Pública	0,3
Privada	0,7
Tipo de Enseñanza	
ESO	0,4
Bachillerato	0,4
CFGM	1,1
CFGS	0