

CATÀLEG BALEAR D'ESPÈCIES AMENÇADES I D'ESPECIAL PROTECCIÓ
(Decret 75/2005)

Hieraetus fasciatus (Vieillot 1822)

Categoria proposada
EXTINGIDA

Nom vulgar	Català Àguila coabarrada Castellà Aguila-azor perdicera
Situació legal	- Directiva Aus: Considerada prioritària pel comitè Ornis. - Convenio de Berna: Annex II - CITES: Apendix II
Catàleg Nacional d'Espècies Amençades. Categoria	Categoria: VULNERABLE Norma: Orden MAM 5826/2000
Llibres Vermells	<u>Mundial</u> : No amenaçada a nivell global. <u>Estat</u> : EN segons SEO-BirdLife (Veure referències) <u>Balear</u> : extingida
Àrea de distribució. Extensió i evolució	- <u>Mundial</u> : Indoafricana, disjunta. La població més important de la conca mediterrània és l'ibero-magribina. La població europea està estimada per BirdLife en 860-1100 parelles (any 2000) - <u>Espanya</u> : Població estimada en 650-800 parelles per SEO-BirdLife (anys 2000-2002), bàsicament a Andalusia-Extremadura-Pais Valencià i Catalunya. Rara al N i NW. Absent a Canàries. S'avalua que la disminució pot haver estat del 20 al 35% en vint anys. - <u>Balears</u> : Documentada com a reproductora fins als anys 50 del segle XX, a Mallorca i tal vegada a Menorca. Hi ha dades molt esporàdiques posteriors (la darrera publicada, de 1999), atribuïdes a exemplars divagants a les tres illes majors.
Tamany de la població. Efectius i evolució	No hi ha població balear a quantificar. Sembla ser que la població havia estat sempre modesta.
Biologia reproductora	Rapinyaire territorial i rupícola. Juvenils dispersius, adults pràcticament sedentaris. S'alimenta exclusivament de presa viva, en general aus i mamífers de talla mitja i es considera adaptable a distintes preses. 1 o 2 polls per parella i any, cria a partir dels tres anys d'edat, i la longevitat coneguda en captivitat arriba als 20 anys.
Informació genètica	No hi ha cap estudi genètic de les poblacions insulars. Totes les poblacions europees pertanyen a la subspècie nominal.
Descripció de l'hàbitat	L'espècie nidifica a penyalars abruptes, i sol caçar en zones de garriga oberta i de conreu de secà principalment.

Factors d'amenaçaSobre l'espècie:

La disminució de la població ibèrica es deu a persecució directa, electrocució, disminució del conill, molèsties per activitats recreatives i competència amb l'Àguila reial i el Voltor lleonat. Probablement l'extinció a les Balears degué ser efecte de la persecució directa i, probablement, la crisi tròfica per l'arribada de la mixomatosi.

Sobre l'hàbitat:

L'espècie sol caçar en terrenys oberts, de forma que la forestació o l'increment de densitat arbustiva i arbòria li és perjudicial.

**Mesures de conservació
(in situ i ex situ)**

Existents: No n'hi ha d'específiques. Les ZEPA i ENP existents a les Balears tenen una extensió d'hàbitat que podria ser suficient.

Proposades: **Estudi de viabilitat de reintroducció.**

Bibliografia

Del Hoyo et al. (Eds) (1994) *Handbook of the birds of the World* (Vol 2). Lynx Eds. Barcelona.

Jurado, Jesús (Inèdit) Recopilació de dades ornitològiques de les Balears. *Treball en curs d'edició.*

Madroño et al. (Eds) 2004 *Libro Rojo de las aves de España*. DG Conservación de la Naturaleza & SEO. Madrid.

Martí, R. & del Moral, JC (Eds) 2003 *Atlas de las aves reproductoras de España*. DG Conservación de la Naturaleza & SEO. Madrid.

Viada, C. 2006 *Libro Rojo de los Vertebrados de las Baleares* (3ª Ed). D.G.C.PE. i EA. CMA. (pàgina WEB).

Autor de la fitxa Joan Mayol. SPE.
Han aportat dades: Jesús R. Jurado. GOB.
Data Juny 2007

Informe preceptiu del Consell Balear de Fauna i Flora

Data d'avaluació

 Comissió de Plenari

Informe:

 Favorable Desfavorable Amb recomanacions:

El Secretari del Consell

La Presidenta: