

DADES DE L'EXPLOTACIÓ

Polígon: _____ **Parcel·la:** _____

Data de construcció o modificació de les instal·lacions o data d'entrada en funcionament de l'explotació per primer cop: _____ (Només si és una explotació donada d'alta en el REGA.)

Règim d'explotació: EXTENSIU - INTENSIU - MIXT

Classificació zootècnica: ENGREIXADOR - MULTIPLICACIÓ - PRODUCCIÓ EN CICLE TANCAT - PRODUCCIÓ DE PORCELLS - PRODUCCIÓ MIXTA - ALTRES

Assessorament: PERTANY A UNA ADS - RECORRE A ALGUN TIPUS D'ASSESSORIA TÈCNICA O VETERINÀRIA

Amb quina freqüència la consulta?

Sobre quins assumptes?

Està subjecte a algun sistema d'assegurament de la qualitat de les produccions?

SÍ: DOP - MARCA DE QUALITAT - RAMADERIA ECOLÒGICA - RAMADERIA INTEGRADA - UN ALTRE: _____

No

TIPUS D'EXPLOTACIÓ SEGONS LA CAPACITAT PRODUCTIVA

- Grup I: explotacions amb una capacitat màxima de 120 UBG, que dediquin com a màxim 37 UBG als reproductors.
- Grup II: explotacions amb una capacitat de més de 120 i menys de 360 UBG, que dediquin com a màxim 112 UBG als reproductors.
- Grup III: explotacions amb una capacitat de més de 360 i menys de 720 UBG, que dediquin com a màxim 225 UBG als reproductors.
- Reduïda: explotacions que poden allotjar fins a 4 truges reproductores o mantenir fins a 25 places d'engreix. No poden allotjar una quantitat de porcs superior a 4,8 UBG.
- Autoconsum: explotacions que es destinen exclusivament al consum familiar, amb una producció màxima de 5 porcs d'engreix per any. No hi ha cap truja.

IDENTIFICACIÓ

Animals presents

<i>Categories</i>						
<i>Truges</i>	<i>Verros</i>	<i>Recria/Transició</i>	<i>Reposició</i>	<i>Engreix</i>	<i>Porcells</i>	<i>Total</i>

Animals que formen part de la mostra

<i>Espècie</i>	<i>Mostra A</i>	<i>Mostra B</i>
Bestiar porcí		

Identificació

<i>Espècie</i>	<i>Nombre d'animals no identificats correctament</i>	
Bestiar porcí	<i>Mascles</i>	<i>Femelles</i>

Llibre de registre (des del dia de la inspecció fins a tres anys enrere)

<i>Cens d'animals (darrer apunt)</i>							<i>Total</i>	
<i>Any</i>	<i>Truges</i>	<i>Verros</i>	<i>Recria/Transició</i>	<i>Reposició</i>	<i>Engreix</i>	<i>Porcells</i>		
<i>Balanç de reproductors</i>				<i>Moviments d'altres categories</i>				
<i>Espècie</i>	<i>Apunts</i>	<i>Altes</i>	<i>Baixes</i>	<i>Total</i>	<i>Apunts</i>	<i>Altes</i>	<i>Baixes</i>	<i>Total</i>
Bestiar porcí								

Guies d'origen i sanitat pecuàries (des del dia de la inspecció fins a tres anys enrere)

	<i>Reproductors</i>	<i>Altres categories</i>	<i>Total</i>
Nombre d'animals que han entrat a l'explotació o n'han sortit, d'acord amb el llibre de registre			
Nombre d'animals de l'anterior grup no emparats per guies d'origen i sanitat pecuàries			

Resultats dels controls

	<i>Mascles</i>	<i>Femelles</i>
1. Nre. d'animals no identificats correctament		
2. Nre. de discrepàncies en el llibre de registre		
3. Nre. d'anomalies en els documents de trasllat		
4. Nre. d'animals amb un sol tipus d'infracció de les recollides en els punts 1 a 3		
5. Nre. d'animals amb més de un tipus d'infracció de les recollides en els punts 1 a 3		
6. Nre. d'animals amb infraccions (4+5)		

Benestar

	<i>Condicions generals</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>	<i>NP*</i>	<i>Observacions</i>
<i>Personal</i>	1 Hi ha personal suficient, amb els coneixements necessaris, per guardar els animals.				
	2 El personal inspecciona els animals diàriament.				
	3 El cuidador o el responsable de l'explotació ha assistit a cursos de benestar porcí (com a mínim de 20 h)				
<i>Inspecció</i>	4 Els animals s'inspeccionen almenys un cop al dia.				
	5 Hi ha il·luminació apropiada per veure els animals en qualsevol moment.				
	6 Hi ha llatzeret per aïllar els animals malalts.				
	7 Els animals malalts o ferits estan aïllats.				
<i>Constància documental</i>	8 Els animals que pareixen malalts o ferits reben immediatament els tractaments adequats.				
	9 Es registra el nombre d'animals morts trobats en cada inspecció.				
	10 El registre d'animals morts és correcte i està actualitzat.				
	11 Es registren els tractaments veterinaris que s'apliquen als animals (Llibre de medicaments).				
<i>Llibertat de moviments</i>	12 El registre de tractaments es manté 3 anys com a mínim.				
	13 El registre d'animals morts es manté 3 anys com a mínim.				
	14 No es limita la llibertat de moviments pròpia dels animals ni se'ls causa sofriment ni danys innecessaris.				
<i>Equips automàtics o mecànics</i>	15 Si els animals estan fermats, disposen d'espai suficient per ajeure's alhora.				
	16 No hi ha truges ni porcastres fermades.				
	17 El manteniment dels equips és continu i sistemàtic.				
	18 Els equips automàtics que permeten un adequat nivell de benestar s'inspeccionen un cop al dia.				
	19 Si la ventilació és artificial, disposa d'un sistema d'emergència que garanteixi la renovació de l'aire.				
<i>Edificis</i>	20 Si la ventilació és artificial, els equips automàtics disposen d'una alarma que avisi en cas d'avaria.				
	21 L'alarma es comprova amb regularitat.				
	22 Els materials utilitzats per a la construcció de les instal·lacions i els equips que poden tenir contacte amb els animals són innocus.				
	23 Els materials en contacte amb els animals són fàcils de netejar i desinfectar.				
	24 El terra és llis; no rellisca ni causa danys ni sofriment als animals.				
	25 El terra sense jaç de palla forma una superfície rígida, plana i estable.				
	26 Els corrals estan construïts de manera que els animals tinguin accés a una àrea de repòs confortable, drenada i neta que permet a tots els animals ajeure's al mateix temps, descansar, aixecar-se amb normalitat i veure altres porcs (excepte per a les truges una setmana abans del part, que es poden mantenir fora de la vista dels altres porcs).				
	27 Per als porcells, s'utilitza un terra de formigó d'engraellat amb l'amplada de les obertures d'11 mm com a màxim i l'amplada de les biguetes de 50 mm com a mínim.				

Benestar

	<i>Condicions generals</i>	<i>Sí</i>	<i>No</i>	<i>NP*</i>	<i>Observacions</i>
<i>Edificis</i>	28 Per als porcells desmamats, s'utilitza un terra de formigó d'engraellat amb l'amplada de les obertures de 14 mm com a màxim i l'amplada de les biguetes de 50 mm com a mínim.				
	29 Per als porcs d'engreix, s'utilitza un terra de formigó d'engraellat amb l'amplada de les obertures de 18 mm com a màxim i l'amplada de les biguetes de 80 mm com a mínim.				
	30 Per a les truges i les porcastres, s'utilitza un terra de formigó d'engraellat amb l'amplada de les obertures de 20 mm com a màxim i l'amplada de les biguetes de 80 mm com a mínim.				
	31 Hi ha il·luminació suficient per satisfer les necessitats fisiològiques i etològiques (40 lux durant un mínim de 8 h al dia).				
	32 En la part de l'edifici on hi ha els porcs, el nivell de renou és inferior a 85 dB i no hi ha renous sobtats.				
	33 La circulació de l'aire és suficient perquè el nivell de pols, la temperatura, la humitat relativa i la concentració de gasos es mantinguin dins dels límits no perjudicials per als animals.				
	34 Els animals a l'aire lliure disposen de protecció contra les inclemències del temps i els depredadors.				
<i>Alimentació, aigua i altres substàncies</i>	35 L'estat de nutrició dels animals és adequat.				
	36 No se subministra als animals cap substància que pugui ser perjudicial per a la salut, el benestar o el tractament zootècnic.				
	37 Es disposa de recepta veterinària, si cal, per als tractaments que s'apliquen als animals.				
	38 Els animals tenen accés als aliments a voluntat, o un cop al dia com a mínim.				
	39 Si els animals estan en grup i no estan alimentats a voluntat, poden menjar tots al mateix temps.				
	40 Els equips de subministrament estan ubicats i construïts de forma que es redueixi al màxim el risc de contaminació dels aliments i l'aigua i la rivalitat.				
	41 L'aigua per beure és d'una qualitat adequada.				
	42 Els animals de més de dues setmanes tenen accés permanent a l'aigua per beure.				
	43 Totes les porcastres, les truges en els períodes de deslletament i les truges gestants reben: <ul style="list-style-type: none"> — En el cas que segueixin una dieta exclusivament a base de pinso, un pinso amb un _____ % de fibra bruta. — En el cas que segueixin una dieta mixta, una combinació d'aliments rics en fibra (pastura, farratges, garroves, etc.) i aliments amb un alt contingut energètic (pinso, gra i lleguminoses). 				

*NP: No pertoca

Benestar					
	Condicions específiques	Sí	No	NP*	Observacions
Verros	44 Poden girar-se i sentir, ensumar i veure els altres porcs.				
	45 La zona de terra lliure d'obstacles a disposició del verros adults és com a mínim de 6 m ² per verro, i de 10 m ² per verro si el recinte també s'utilitza per al cobriment.				
Truges i porcastres gestants	46 Es crien en grup durant el període comprès entre les quatre setmanes posteriors al cobriment i els set dies anteriors a la data prevista de part (aquest punt no és aplicable a les explotacions que tinguin menys de deu truges).				
	47 Els costats del corral del recinte en què es manté el grup fa més de 2,8 metres, o més de 2,4 metres en el cas que es criïn en grups de menys de sis individus (aquest punt no és aplicable a les explotacions que tinguin menys de deu truges).				
	48 Si l'explotació té menys de deu truges aïllades en corrals individuals, aquestes poden girar-se.				
	49 La superfície total de terra lliure de què disposa cada truja després del cobriment, quan es cria en grup, és de 2,25 m ² com a mínim (més un 10 % quan es criïn en grups inferiors a 6 indiv. i menys un 10 % quan es criïn en grups de 40 individus o més).				
	50 La superfície total de terra lliure de què disposa cada porcastra després del cobriment, quan es cria en grup, és d'1,64 m ² com a mínim (més un 10 % quan es criïn en grups inferiors a 6 individus i menys un 10 % quan es criïn en grups de 40 individus o més).				
	51 Disposen d'una superfície, amb revestiment de sòl continu compacte, de 0,95 m ² per porcastra i 1,3 m ² per truja com a mínim. Com a màxim el 15% del sòl es reserva a les obertures de drenatge.				
	52 Si és necessari, es tracten contra els paràsits interns i externs.				
	53 Si s'acomoden en paridores, estan netes.				
	54 La setmana anterior al moment previst del part, disposen de material adequat per fer el niu en quantitat suficient llevat que sigui tècnicament inviable respecte al sistema de fems líquid utilitzat en l'establiment.				
55 Disposen d'espai lliure per permetre un part de manera natural o assistida.					
Porcells a la paridora	56 Disposen d'espai suficient per poder ser alletats sense dificultat.				
	57 La lactació és de tres setmanes com a mínim i es traslladen a instal·lacions especialitzades que es netegen i desinfecten abans d'introduir un nou grup.				
	58 La lactació habitual és de quatre setmanes com a mínim.				
	59 La superfície és sòlida, o bé coberta de palla, i suficient perquè els animals estiguin ajaguts tots al mateix temps.				
	60 Disposen d'una font de calor separada de la mare o bé d'un llit adequat.				
	61 Si la truja es pot moure, hi ha dispositius per protegir els porcells.				
	62 Si la truja es pot moure, hi ha un llit de palla per protegir els porcells.				

		<i>Sí</i>	<i>No</i>	<i>NP*</i>	<i>Observacions</i>
<i>Porcells deslletats o porcs d'engreix</i>	63 La superfície de terra lliure de què disposa cada animal és, com a mínim, dels metres quadrats per al pes en viu en quilograms que s'indiquen a continuació: 0,15 m ² per a porcells de menys de 10 kg; 0,20 m ² per a porcells de 10 a 20 kg; 0,30 m ² per a porcells de 20 a 30 kg; 0,40 m ² per a porcells de 30 a 50 kg; 0,55 m ² per a porcells de 50 a 85 kg; 0,65 m ² per a porcells de 85 a 110 kg, i 1,00 m ² per a porcells de més de 110 kg.				
	64 Els animals particularment agressius, que hagin estat atacats per altres porcs o que estiguin malalts o ferits es mantenen temporalment en recintes individuals on poden girar-se.				
	65 Els porcells deslletats es mantenen en grups estables amb la mínima mescla possible.				
	66 L'ús de tranquil·litzants per facilitar la mescla de grups es limita a condicions excepcionals i únicament amb la consulta prèvia a un veterinari.				
	67 Els porcs tenen accés permanent a una quantitat suficient de materials que els permet unes activitats adequades d'investigació i manipulació, com ara palla, fenc, fusta, serradures, etc., que no els compromet la salut.				
<i>Intervencions traumàtiques (reducció de les dents, escuament parcial, castració i d'altres)</i>	68 La reducció de les dents dels animals, si n'és el cas, es fa en els set primers dies de vida.				
	69 La reducció de les dents dels animals, si n'és el cas, la fa un veterinari o una persona formada.				
	70 L'escuament parcial, si n'és el cas, es fa en els set primers dies de vida.				
	71 L'escuament parcial, si n'és el cas, el fa un veterinari o una persona formada.				
	72 L'escuament parcial després dels set dies de vida, si n'és el cas, el fa un veterinari amb anestèsics i analgèsics.				
	73 La castració abans dels set dies de vida, si n'és el cas, la fa un veterinari o una persona formada.				
	74 La castració després dels set dies de vida, si n'és el cas, la fa un veterinari amb anestèsics i analgèsics.				
75 Només es fan altres intervencions traumàtiques justificades per a identificació, per tractament o per diagnòstic.					
<i>Maneig de reproducció</i>	1 Es realitzen pràctiques d'inseminació artificial.				
	En cas afirmatiu, de quina procedència? _____				

*NP: No pertoca

L'inspector / La inspectora [Rúbrica]	La persona titular de l'explotació o qui la representa [Rúbrica]
--	---