



Text: Luis Núñez. Cap del Servei de Sanitat Forestal

Cronograma de actuaciones sobre *Thaumetopoea pityocampa* (Procesionaria del pino).

Especie que en su fase larvaria defolia las acículas de los pinos y puede producir urticaria.

Produce bolsones para refugiarse del frío invernal.

Actuaciones a realizar:

Colocación de cajas trampa con feromona (1 por ha aproximadamente). Es un tratamiento biológico. Se consigue capturar a los machos. Es un tratamiento muy efectivo cuando el nivel de población es bajo.

Pulverización del árbol, dependiendo del estado larvario (inicial o avanzado), se aplicará diferentes productos mediante un cañón nebulizador.

No se detallan los productos por que se debe de comprobar si están autorizados en el momento de su aplicación.

En el momento de decidir aplicarlos hay multitud de formas de conseguir seleccionar el producto más adecuado.

Tiros con escopeta a los bolsones para agujerear los bolsones y matar las orugas por frío, daños y enfermedades. El plomo ha de ser del 13, calibre 12/70.



Corta de los bolsones y eliminación, mediante tijeras o serrucho con barra telescópica.

| ACTUACIÓN | MES |
|--|--|
| • Colocación de cajas trampa con feromona 1 por ha aprox.) es un tratamiento biológico. | junio y julio (antes del 15). |
| • Pulverización del árbol con producto biológico. en estadios larvarios iniciales (L1 y L2). (Aplicación terrestre con cañón). | septiembre hasta mediados octubre. |
| • Pulverización del árbol con otros productos. Fitosanitarios con efecto inhibidor de producción de quitina, en estadios larvarios más avanzados (L2, L3 y L4).(Aplicación terrestre con cañón). | octubre, noviembre y diciembre. |
| • Pulverización del árbol con otros productos. Fitosanitarios con acción de ingestión y contacto, efecto de choque, en estadios larvarios más avanzados (L4 y L5).(Aplicación terrestre con cañón). | noviembre, diciembre y enero. |
| • Tiros con escopeta a bolsones calibre 12/70 plomo del 13. Para agujerear los bolsones y matar las orugas por frío, daños y enfermedades | noviembre, diciembre y mediados enero. |
| • Corta de los bolsones y eliminación. Mediante tijeras o serrucho con barra telescópica. | noviembre, diciembre y mediados enero. |

NOTA: Los productos son orientativos y SIEMPRE se ha de comprobar antes de su utilización, que esté autorizada la materia activa a aplicar en el vegetal correspondiente.