



Text: Luis Núñez. Cap del Servei de Sanitat Forestal

Cronograma de actuaciones sobre *Lymantria dispar* (lagarta peluda)

| ACTUACIÓN | MES |
|---|------------|
| <ul style="list-style-type: none">• Colocación de cajas trampa con feromona (1 por ha aprox.) es un tratamiento biológico. | Julio |
| <ul style="list-style-type: none">• Pulverización del árbol con producto biológico. (<i>Bacillus thuringiensis</i> var. <i>kurstaki</i>) en estadios larvarios iniciales (L1 y L2). (Aplicación aérea con avioneta o helicóptero y terrestre con cañón nebulizador). | Abril-mayo |
| <ul style="list-style-type: none">• Pulverización del árbol con otros productos. Fitosanitarios con efecto inhibidor de producción de quitina. En estadios larvarios más avanzados (L2, L3 y L4). (Aplicación aérea con avioneta o helicóptero y terrestre con cañón nebulizador). | Mayo-junio |
| <ul style="list-style-type: none">• Pulverización del árbol con otros productos. Fitosanitarios con acción de ingestión y contacto, efecto de choque. En estadios larvarios más avanzados (L4, L5 y L6 hembras). (Aplicación aérea con avioneta o helicóptero y terrestre con cañón nebulizador). | Junio |

NOTA: Los productos son orientativos y SIEMPRE se ha de comprobar antes de su utilización, que esté autorizada la materia activa a aplicar en el vegetal correspondiente.