



CONTROL DE LA PROCESSIONÀRIA DEL PI MITJANÇANT DISPOSITIUS DE CAPTURA (CONTROL BIOTECNOLÒGIC)

A partir del 15 de juny ja es poden començar a instal·lar les trampes per a la captura de les papallones de la processionària del pi (*Thaumetopoea pityocampa*). L'emergència de les papallones és produeix generalment a principis d'agost, però és recomanable que les trampes estiguin instal·lades abans del 15 de juliol, per assegurar la captura de les primeres emergències. Retirada de les trampes a la fi d'octubre.

Les trampes es poden guardar d'un any per l'altre, mentre que la feromona s'ha de substituir i comprar cada any. Cal mantenir-la en la nevera fins a la seva instal·lació.



Podeu consultar les instruccions per a la instal·lació de les trampes a la nostra pàgina web (sanitatforestal.caib.es).

Les trampes permeten el monitoratge de l'espècie i la captura de papallones.

Si durant el primer trimestre d'aquest any vareu tenir un nivell d'alt d'afectació, caldria complementar el trampeig amb una actuació més contundent, com la endoteràpia o el tractament amb productes fitosanitaris, actuacions que es recomanen realitzar durant el mes d'octubre.

Tant les trampes com les feromones es podran adquirir en algun dels establiments inscrits en el Registre Oficial de Productors i Operadors de Mitjans de Defensa Fitosanitària (ROPO). Caldrà que les feromones estiguin registrades i autoritzades per aquest ús.

La situació d'aquest any és la mostrada en els següents mapes d'afectació de la processionària del pi a Mallorca i Menorca:





G
O
I
B
/

Per a més informació visitar la pàgina web sanitatforestal.caib.es

Servei de Sanitat Forestal

Juny 2023.