






Grip i covid es poden administrar el mateix dia a llocs anatòmics diferents

Nom comercial	Població objectiu	Dosi	Característiques	Contraindicacions Precaucions
 FLUCELVAX suspensió injectable en jeringa precarregada Vacuna antigripal (de superfície, inactivada, produïda en oïdies) 0,5 ml 1 jeringa precarregada (1 dosi) Via intramuscular	De 6 a 23 mesos	0,5 ml IM Cuixa o deltoide, segons l'edat	Vacuna inactivada · cultiu cel·lular (des de 6 mesos)	 Hipersensibilitat greu a la vacuna.  Malaltia febril aguda moderada o greu.
 Fluenz Vacuna antigripal viva atenuada, preparada per a administració intranasal Suspensió per a pulverització nasal (0,2 ml (0,1 ml en cada fossa nasal)) Via intranasal	De 24 mesos a 10 anys (ús preferent en aquest grup i escolars)	0,2 ml intranasal (0,1 ml a cada nariu)	Vacuna viva atenuada intranasal (de 24 mesos a 18 anys)	 Immunosupressió greu.  Tractament amb salicilats. Embaràs i lactància. Asma greu, sibil·làncies actives.
 Vaxigrip suspensió injectable en jeringa precarregada Vacuna antigripal trivalent (virus fraccionats i inactivats) 0,5 ml 1 jeringa precarregada (1 dosi) Via intramuscular (IM) o subcutània (SC)	Població general d'11 a 64 anys, embarassades, personal essencial	0,5 ml IM	Vacuna inactivada (des de 6 mesos)	 Anafilaxi a dosi prèvia o components.  Malaltia febril aguda moderada o greu.
 Fluad suspensió injectable en jeringa precarregada Vacuna antigripal (de superfície, inactivada, amb adjuvant) 0,5 ml 1 jeringa precarregada (1 dosi) Via intramuscular	Persones ≥ 65 anys NO INSTITUCIONALITZADES	0,5 ml IM	Vacuna inactivada adjuvada (a partir dels 50 anys)	 Anafilaxi a dosi prèvia o components.  Trastorns de coagulació i malaltia febril aguda moderada o greu.
 Efludaa suspensió injectable en jeringa precarregada Vacuna antigripal (de superfície, inactivada, de alta càrrega antigènica) 0,5 ml 1 jeringa precarregada (1 dosi) Via intramuscular	Persones ≥ 60 anys INSTITUCIONALITZADES	0,5 ml IM	Vacuna inactivada Alta càrrega antigènica (a partir de 60 anys)	 Anafilaxi a dosi prèvia o components.  Malaltia febril aguda moderada o greu.
 Primera vacunació antigripal a menors de 9 anys amb afeccions de risc: 2 dosis separades per ≥ 4 setmanes.				
 COMIRNATY XFG Pediatric 10 µg concentrat per a suspensió injectable vacuna de ARNm contra el COVID-19 10 µg/0,5 ml Via intramuscular 0,5 ml 1 jeringa precarregada (1 dosi)	De 6 mesos a 11 anys amb afeccions de risc	• 1 dosi IM • 6-59 mesos sense vacunació o infecció prèvia: 2 dosis, separades 8 setmanes.	• Vacuna ARNm	 Al·lèrgia greu a components:  Trasplantament de progenitors hematopoètics (TPH), teràpia CAR-T o immunosupressió greu.
 COMIRNATY XFG 30 µg concentrat per a suspensió injectable vacuna de ARNm contra el COVID-19 30 µg/0,5 ml Via intramuscular 0,5 ml 1 jeringa precarregada (1 dosi)	≥ 12 anys amb indicació. Embarassades.	1 dosi IM	• Vacuna ARNm	 Al·lèrgia greu a components.  Miocarditis o pericarditis després de la vacuna ARNm. Immunosupressió greu, TPH o teràpia CAR-T.
 BIMERVAX XFG1.1 suspensió injectable Vacuna contra el COVID-19 (antigen recombinant) Via intramuscular 12-18 jeringues precarregades (12-18 dosis) HIPRA	≥ 12 anys Alternativa si hi ha contraindicació o rebuig d'ARNm. INSTITUCIONALITZATS I VACUNACIÓ DOMICILIÀRIA	1 dosi IM	• Vacuna de proteïna recombinant • Alternativa a les vacunes ARNm	 Al·lèrgia greu a components.  Immunosupressió greu: consultau la pauta.



COVID-19 · Interval mínim: ≥ 3 mesos des de la darrera dosi o infecció documentada.

Setembre-2026