Conselleria de Salut
Direcció General de Salut Pública

VACUNACIÓ DE L'EMBARASSADA



Durant l'embaràs, la salut de la mare i la del bebè van plegades.
Les vacunes protegeixen l'embarassada i, a més, els anticossos passen a través de la placenta i ajuden a defensar el nounat durant els seus primers mesos.



Objectius

Protegir l'embarassada i el fetus durant l'embaràs: infeccions com la grip o la COVID poden causar complicacions greus.

Protegir el futur del nounat durant els primers mesos de vida: els anticossos que la mare genera amb les vacunes durant l'embaràs passen al nadó (també amb la lactància) i l'ajuden a defensar-se d'infeccions més greus en aquesta etapa.



Vacunes recomanades

Tos ferina: a partir de la setmana 27 (preferentment, entre la 27 i 28). S'ha d'administrar en cada embaràs, independentment de vacunacions prèvies.

Grip: durant la campanya anual (habitualment, d'octubre a març), en qualsevol trimestre.

COVID-19: en qualsevol trimestre de l'embaràs.



Vacunes contraindicades

Triple vírica
Varicel·la
Febre groga
Febre tifoidal

1. Protegeix la mare durant l'embaràs contra infeccions que poden produir complicacions.
2. És segura en l'embaràs i recomanada pels organismes sanitaris.
3. Redueix el risc d'infeccions greus els primers mesos de vida del nounat.
4. Contribueix a la protecció de l'entorn familiar.

Juliol 2026

Conselleria de Salut
Direcció General de Salut Pública

VACUNACIÓN DE LA EMBARAZADA



Durante el embarazo, la salud de la madre y la del bebé van de la mano.
Las vacunas protegen a la mujer embarazada y, además, los anticuerpos pasan a través de la placenta y ayudan a defender al bebé durante sus primeros meses.



Objetivos

Proteger a la mujer embarazada y al feto durante el embarazo: infecciones como la gripe o el COVID pueden causar complicaciones graves.

Proteger el futuro del recién nacido durante los primeros meses de vida: los anticuerpos que la madre genera con las vacunas durante el embarazo pasan al bebé (también con la lactancia), ayudándolo a defenderse de infecciones más graves en esta etapa.



Vacunas recomendadas

Tosferina: a partir de la semana 27 (preferiblemente, entre la 27 y 28).
Se debe administrar en cada embarazo, independientemente de las vacunas previas.

Gripe: durante la campaña anual (habitualmente, de octubre a marzo), en cualquier trimestre.

COVID-19: en cualquier trimestre durante el embarazo.



Vacunas contraindicadas

Triple vírica
Varicela
Febre amarilla
Febre tifoide

1. Protege a la madre durante el embarazo contra infecciones que pueden producir complicaciones.
2. Es segura en el embarazo y recomendada por los organismos sanitarios.
3. Reduce el riesgo de infecciones graves en los primeros meses de vida del recién nacido.
4. Contribuye a la protección del entorno familiar.

Julio 2026