





Gripe y COVID pueden administrarse el mismo día en lugares anatómicos diferentes

Nombre comercial	Población diana	Dosis	Características	Contraindicaciones Precauciones
	De 6 a 23 meses	0,5 ml IM Muslo o deltoides, según la edad	Vacuna inactivada · cultivo celular (desde los 6 meses)	 Hipersensibilidad grave a la vacuna.  Enfermedad febril aguda moderada o grave.
	De 24 meses a 10 años (uso preferente en este grupo y escolares)	0,2 ml intranasal (0,1 ml en cada narina)	Vacuna viva atenuada intranasal (de 24 meses a 18 años)	 Inmunosupresión grave.  Tratamiento con salicilatos. Embarazo y lactancia. Asma grave, sibilancias activas.
	Población general de 11 a 64 años, embarazadas, personal esencial	0,5 ml IM	Vacuna inactivada (desde los 6 meses)	 Anafilaxia a dosis previa o componentes.  Enfermedad febril aguda moderada o grave.
	Personas ≥ 65 años NO INSTITUCIONALIZADAS	0,5 ml IM	Vacuna inactivada adyuvada (a partir de los 50 años)	 Anafilaxia a dosis previa o componentes.  Trastornos de coagulación y enfermedad febril aguda moderada o grave.
	Personas ≥ 60 años INSTITUCIONALIZADAS	0,5 ml IM	Vacuna inactivada Alta carga antigénica (a partir de los 60 años)	 Anafilaxia a dosis previa o componentes.  Enfermedad febril aguda moderada o grave.
 Primera vacunación antigripal a menores de 9 años con condiciones de riesgo: 2 dosis separadas por ≥ 4 semanas.				
	De 6 meses a 11 años con condiciones de riesgo	• 1 dosis IM • 6-59 meses sin vacunación o infección previa: 2 dosis, separadas 8 semanas.	• Vacuna ARNm	 Alergia grave a componentes.  Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH), terapia CAR-T o inmunosupresión grave.
	≥ 12 años con indicación. Embarazadas.	1 dosis IM	• Vacuna ARNm	 Alergia grave a componentes.  Miocarditis o pericarditis tras vacuna ARNm. Inmunosupresión grave, TPH o terapia CAR-T.
	≥ 12 años Alternativa si hay contraindicación o rechazo a ARNm. INSTITUCIONALIZADOS Y VACUNACIÓN DOMICILIARIA	1 dosis · IM	• Vacuna de proteína recombinante • Alternativa a las vacunas ARNm	 Alergia grave a componentes.  Inmunosupresión grave: consultar pauta.



COVID-19 · Intervalo mínimo: ≥ 3 meses desde la última dosis o infección documentada.

Septiembre-2026