



Vacunació enfront a l'hepatitis A a persones de grups de risc

La situació de desabastiment de la vacuna enfront a l'hepatitis A (HA) ha obligat a fer una revisió de les recomanacions i a organitzar la distribució de les dosis disponibles per garantir la vacunació d'aquelles persones amb un major risc de contagi o de patir complicacions per la malaltia. La Direcció General de Salut Pública i Participació (DGSPiP) proporcionarà la vacuna segons s'especifica a aquest document.

A. Es consideren grups de risc, amb el següent ordre de prioritat:

1. Pacients amb risc de complicacions:
 - Hepatopatia crònica (per major risc d'hepatitis fulminant)
 - Receptors de trasplantament hepàtic (preferiblement abans de la intervenció).
 - Immunodeprimits.
2. Persones amb conductes sexuals de risc:
 - Homes que tenen sexe amb homes (HSH) amb múltiples parelles.
 - Professionals del sexe.
3. Persones que s'injecten drogues.
4. Risc ocupacional: persones que treballen amb primats no humans o a un laboratori amb el virus de l'HA.
5. Viatgers que es desplacen a zones d'alta o moderada endemicitat d'hepatitis A. En la situació actual s'ha de restringir la vacunació a viatgers amb estades superiors a 4 setmanes.

❖ **Control de contactes i brots d'HA:** La DGSPiP ha d'indicar la vacunació. Els casos s'han de notificar al Sistema de Vigilància Epidemiològica tan aviat com es tinguí el diagnòstic de sospita, per les vies establertes i amb tota la informació possible per identificar els contactes.

❖ **Qualsevol situació altra específica** que no estigui prevista a aquest document s'ha de consultar a la unitat de vacunes de l'illa corresponent.

B. Procediment a seguir:

1. Revisió d'antecedents:
 - Revisió dels antecedents de vacunació i de malaltia.
 - Sol·licitud de serologia en tots els casos. Excepcions a la sol·licitud de serologia: persones que tinguin documentada una dosi de vacuna o l'antecedent d'haver patit la malaltia.
2. Vacunació:
 - Vacunar a persones dels grups de risc descrits sense antecedents de la malaltia, de vacunació prèvia amb 1 dosi (2 si són immunodeprimits) o amb serologia negativa.
 - L'edat mínima de vacunació és d'un any.
 - Posposar dosis de record mentre no estigui completament restablert el subministrament.
 - Vacuna **monovalent enfront a l'HA:**

Vacuna	Edat	Posologia
Havrix 720	1 - 18 anys	720 U/0,5 ml
Havrix 1440	19 anys o més	1440 U/1 ml
Vaqta 25	12 mesos - 17 anys	25 U/0,5 ml
Vaqta 50	18 anys o més	50 U/1 ml

- Pauta general: 1 sola dosi. S'haurà de valorar l'administració d'una dosi de record en estar normalitzada la situació de subministrament.
 - Immunodeprimits: 2 dosis amb un interval mínim de 6 mesos entre elles.
 - Vacuna **combinada HA+HB** (no proporcionada per la DGSPiP):
 - S'utilitza en persones no immunes enfront a l'HB. A Espanya la vacunació sistemàtica enfront a l'HB inclou els nascuts a partir de 1986. En qualsevol cas, no hi ha inconvenient en vacunar adults susceptibles a HA vacunats a la infància o adolescència contra l'HB.
 - Pauta: 3 dosis amb els intervals següents: segona dosi 1 mes després de la primera i tercera 6 mesos després de la primera (pauta 0, 1, 6).
3. Ús d'immunoglobulina (inespecífica):
- S'ha d'utilitzar quan es prevegi un període de temps (setmanes o mesos) amb risc elevat d'exposició, com viatges internacionals, control de contactes o brots en els següent supòsits:
 - Quan es tracti d'infants menors d'un any.
 - Quan la vacuna estigui contraïndicada.
 - En persones majors de 50 anys, immunodeprimides o hepatòpates crònics s'ha d'administrar juntament amb la vacuna.
 - Pautes:
 - En profilaxi postexposició: 0,02 mL/kg de pes corporal, dins les 2 setmanes després del contacte.
 - Profilaxi preexposició (viatgers d'alt risc a zones endèmiques):
 - a. Estadades menors de 3 mesos: 0,02 mL/kg de pes corporal.
 - b. Estadades més llargues (fins 6-7 mesos): 0,06 mL/kg de pes corporal.

B. Distribució de la vacuna:

1. La DGSPiP ha assumit la compra i distribució de les dosis disponibles de vacuna monovalent enfront a l'hepatitis A.
2. La vacuna es proporcionarà:
 - Als centres hospitalaris, exclusivament a través del Servei de Farmàcia Hospitalària,
 - Als centres de salut d'Atenció Primària de l'IBSALUT
 - *Per evitar retards en els casos en què la vacunació hagi de fer en un termini curt, els centres disposaran de 2 dosis de vacuna, que hauran de justificar immediatament després de l'administració.*
3. Les peticions de dosis de vacuna hauran de ser nominals, amb informe clínic (especialista que indica la vacunació) o justificació de l'exposició (Salut Laboral, Sanitat Exterior). Contactes DGSPiP:
 - Mallorca: tel. 971 17 73 32. Carrer de Jesús 38A - 07010 Palma. VACUNES.
 - Menorca: tel. 971 36 04 26. Avda. Josep Maria Quadrado 17- 07703, Maó. VACUNES
 - Eivissa i Formentera: tel. 971 30 67 00. Via Romana 81, 07800 Eivissa. VACUNES
4. Registre de les vacunes administrades a través dels procediments establerts (eSIAP a Atenció Primària). Els centres que no tinguin un procediment establert per declarar les vacunacions l'han d'acordar prèviament la forma de notificar les vacunes. **Aquesta condició és indispensable per rebre vacunes.**

Palma, 4 de setembre de 2017

Coordinació de Vacunes