




RECOMENDACIONES 
'NO HACER' EN VACUNAS

¿ANTISEPSIA DE LA PIEL CON **ALCOHOL**?

¿USO DE **GUANTES** A LA HORA DE VACUNAR?

¿REINICIAR **PAUTAS DE VACUNACIÓN INCOMPLETAS**?

¿USO DE **ANTIPIRÉTICOS O ANALGÉSICOS**?

¿RETRASAR LA VACUNACIÓN POR **ENFERMEDAD LEVE**?

Asociación Española de Vacunología

SECA
Sociedad Española de Calidad Asistencial

No cal fer antisèpsia de la pell amb alcohol abans d'administrar una vacuna — sempre que la zona d'injecció sigui visiblement neta—, una pràctica que no ha demostrat reduir el risc d'infecció en aquest context.

No és recomanable l'ús rutinari de guants durant tot el procediment de vacunació, excepte en els casos en què el professional presenti lesions obertes a les mans.

No cal reiniciar pautes de vacunació incompletes quan s'han respectat els intervals mínims que s'estableixen en la fitxa tècnica.

No es recomana l'administració sistemàtica d'antipirètics o analgèsics de manera profilàctica, ni abans ni després de la vacunació, ja que no hi ha evidència suficient que en justifiqui l'ús generalitzat en absència de símptomes.

En la majoria dels esquemes vacunals **no s'ha de posposar l'administració de vacunes en persones amb malalties agudes lleus**, amb febre baixa o sense, ni per haver rebut recentment tractament antibiòtic, excepte en les vacunes orals de febre tifoide i còlera, o en la BCG si es prenen fàrmacs antituberculosos.

Grup de treball «No Hacer en Vacunas»

Associació Espanyola de Vacunologia i Societat Espanyola de Qualitat Assistencial
guiasalud.es (Biblioteca de GPC de l'SNS)